

NL

***BIJLAGE***

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

Solo Blox

**Productsoort(en)**

PT14: Rodenticiden

**Toelatingsnummer:** BE2017-0018

**Toelatingsnummer in R4BP:** BE-0015064-0000

---

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Solo Blox Jaguar Blox Solo Super Size Blox Jaguar Super Size Blox Final Blox Final Super Size Blox
----------------------	---

### 1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Bell Laboratories Netherlands B.V.
	Adres	De Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam overig: Netherlands
Toelatingsnummer		BE2017-0018
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0015064-0000
Toelatingsdatum		24/07/2013
Vervaldatum		03/01/2025

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Bell Laboratories Inc
Adres van de fabrikant	6551 N Towne Rd WI 53598 Windsor Verenigde Staten
Productielocaties	Bell Laboratories Inc site 1 6501 N Towne Rd WI 53598 Windsor Verenigde Staten

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Brodifacum
Naam van de fabrikant	Activa
Adres van de fabrikant	Via Feltre, 32 20132 Milano Italië
Productielocaties	Activa site 1 Tezza s.r.l. Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Italy 37050 Maria di Zevio Italië

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	werkzame stof	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (m/m)

### 2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

---

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H360D: Kan het ongeboren kind schaden.  H373: Kan schade aan organen blood veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ..
Veiligheidsaanbevelingen	P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.  P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.  P280: Draag Beschermende handschoenen.  P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.  P405: Achter slot bewaren.  P501: Inhoud afvoeren naar afvoeren in overeenstemming met van toepassing zijnde nationale/regionale voorschriften.  P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.  P501: verpakking afvoeren afvoeren naar in overeenstemming met van toepassing zijnde nationale/regionale voorschriften.

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1. Huismuizen en ratten – professionals – binnen**

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p>
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Lokaas toepassing</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Bait formulations: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in verzegelde lokaasdozen</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: .</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Ratten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grote plaag: tot 60g lokaas per lokaaskist om de 5 meters.</li><li>- Geringe plaag: tot 60g lokaas per lokaaskist om de 10 meters</li></ul> <p>Muizen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grote plaag: tot 20g lokaas per lokaaskist om de 2 meters.</li><li>- Geringe plaag: tot 20g lokaas per lokaaskist om de 5 meters.</li></ul>
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker

---

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Minimum verpakkingsgrootte 3kg: Losse 5g, 10g, 15g, 20g, 28g, 50g, 100g, 150g en 200g blokken in High Density Poly Ethylene (HDPE) emmer, kartonnen doos, spaanplaat doos, of polyethyleen plastic zakje met ziploc afdichting - 3 tot 25 kg.
---	---

#### **4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

- Voor muizen : De aasstations dienen aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.
- Voor ratten : De aasstations dienen pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

#### **4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Zie sectie 5.2.

#### **4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

- Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### **4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie sectie 5.4.

#### **4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie sectie 5.5.

### **4.2. Beschrijving van het gebruik**

**Tabel 2. Muizen en ratten – gereserveerd voor professionele gebruiker met aangetoonde**

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus  Triviale naam: overig: Bruine rat  Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus  Triviale naam: overig: Bruine rat  Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus  Triviale naam: overig: Zwarte rat  Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus  Triviale naam: overig: Zwarte rat  Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus  Triviale naam: overig: Huismuis  Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus  Triviale naam: overig: Huismuis  Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p>
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Lokaas toepassing</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in verzegelde lokaaskisten of overdekte lokaaspunten</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: .</p> <p>Verdunning (%): -</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Ratten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grote plaag: tot 60g lokaas per lokaaskist om de 5 meters.</li> <li>- Geringe plaag: tot 60g lokaas per lokaaskist om de 10 meters</li> </ul> <p>Muizen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grote plaag: tot 20g lokaas per lokaaskist om de 2 meters.</li> <li>- Geringe plaag: tot 20g lokaas per lokaaskist om de 5 meters.</li> </ul>
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Minimum verpakkingsgrootte 3kg: Losse 5g, 10g, 15g, 20g, 28g, 50g, 100g, 150g en 200g blokken in High Density Poly Ethylene

---

(HDPE) emmer, kartonnen doos, spaanplaat doos, of polyethyleen plastic zakje met ziploc afdichting - 3 tot 25 kg.
---

#### **4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

#### **4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en

de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne.

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om

inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te

voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.

- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

#### **4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

- Wanneer lokaasdozendicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### **4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**



Zie sectie 5.4.

#### 4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5.

### 4.3. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 3. Huismuizen en ratten – professionals – buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen**

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren  Wetenschappelijke naam: <i>Rattus rattus</i> Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: <i>Rattus rattus</i> Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren  Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten  Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing

	Gedetailleerde beschrijving: Lokaas toepassing - Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in verzegelde lokaasdozen
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: .</p> <p>Verdunning (%): -</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Ratten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grote plaag: tot 60g lokaas per lokaaskist om de 5 meters.</li> <li>- Geringe plaag: tot 60g lokaas per lokaaskist om de 10 meters</li> </ul> <p>Muizen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grote plaag: tot 20g lokaas per lokaaskist om de 2 meters.</li> <li>- Geringe plaag: tot 20g lokaas per lokaaskist om de 5 meters.</li> </ul>
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Minimum verpakkingsgrootte 3kg: Losse 5g, 10g, 15g, 20g, 28g, 50g, 100g, 150g en 200g blokken in High Density Poly Ethylene (HDPE) emmer, kartonnen doos, spaanplaat doos, of polyethyleen plastic zakje met ziploc afdichting - 3 tot 25 kg.

#### 4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden (bijv. regen, sneeuw enz.). Plaats de lokaasdozen in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- Voor muizen : De aasstations dienen aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.
- Voor ratten : De aasstations dienen pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.
- Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.
- Indien beschikbaar, volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

#### 4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Dit product niet direct in de holen toepassen.

#### 4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer aasstations dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssysteem worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### 4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4.

#### 4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5.

### 4.4. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 4. Muizen en ratten – gereserveerd voor professionele gebruiker met aangetoonde - buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen**

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus            Triviale naam: overig: Bruine rat            Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus            Triviale naam: overig: Bruine rat            Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus            Triviale naam: overig: Zwarte rat            Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus            Triviale naam: overig: Zwarte rat            Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus            Triviale naam: overig: Huismuis            Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus            Triviale naam: overig: Huismuis            Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p>
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten

	Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing  Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in verzegelde lokaaskisten of overdekte lokaaspunten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: .  Verdunning (%): -  Aantal en timing van de toepassing:  Ratten: - Grote plaag: tot 60g lokaas per lokaaskist om de 5 meters. - Geringe plaag: tot 60g lokaas per lokaaskist om de 10 meters  Muizen: - Grote plaag: tot 20g lokaas per lokaaskist om de 2 meters. - Geringe plaag: tot 20g lokaas per lokaaskist om de 5 meters.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Minimum verpakkingsgrootte 3kg: Losse 5g, 10g, 15g, 20g, 28g, 50g, 100g, 150g en 200g blokken in High Density Poly Ethylene (HDPE) emmer, kartonnen doos, spaanplaat doos, of polyethyleen plastic zakje met ziploc afdichting - 3 tot 25 kg.

#### 4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

- Vervang lokaas in lokaaskisten waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.

- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode

- Voor gebruik buitenshuis, moeten lokvogels worden bedekt en op strategische locaties worden geplaatst om de blootstelling aan niet-doelsoorten tot een minimum te beperken

#### 4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en

---

de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne.

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om

inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te

voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.

- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

- Dit product niet direct in de holen toepassen.

#### **4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

- Wanneer aaspunten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### **4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie sectie 5.4.

#### **4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie sectie 5.5.

#### 4.5. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 5. Ratten – gereserveerd voor professionele gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – riolen**

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren
Toepassingsgebied(en)	overig: Other  Riolen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing  Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas om vast te leggen of toe te passen in lokaaskisten om te voorkomen dat het lokaas in contact komt met afvalwater. - Overdekte en beschermde lokpunten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: .  Aantal en timing van de toepassing:  Tot 200g lokaasproduct per mangat
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Minimum verpakkingsgrootte 3kg: Losse 5g, 10g, 15g, 20g, 28g, 50g, 100g, 150g en 200g blokken in High Density Poly Ethylene (HDPE) emmer, kartonnen doos, spaanplaat doos, of polyethyleen plastic zakje met ziploc afdichting - 3 tot 25 kg.

##### 4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Lokaas moet zodanig worden aangebracht dat het niet in contact komt met water en niet wordt weggespoeld.

---

#### **4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

#### **4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie sectie 5.3.

#### **4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie sectie 5.4.

#### **4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie sectie 5.5.

---

## Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>

### 5.1. Gebruiksaanwijzingen

Professionals:

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
  
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
  
- Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
  
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.
  
- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
  
- Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).
  
- Waar mogelijk moeten Lokaasdozen aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.
  
- Lokaasdozen moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).
  
- Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.
  
- Het lokaas dient te worden vastgemaakt zodat het niet kan worden weggesleept van het aasstation.
  
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.



---

- Plaats het product uit de buurt van voedsel, drinken en diervoeder, en ook van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die daarmee in contact komen.

- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.

- Als de inname van het lokaas relatief laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van aasstations naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.

- Als het lokaas na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en er geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve bestrijdingsmaatregel.

- Verwijder het resterende lokaas of de aasstations aan het einde van de behandelperiode.

Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid :

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteeerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.

- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval).

Maak afgezien daarvan het geïnfesteeerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden

- Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.).

- Waar mogelijk moeten de lokaaskisten aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.

- Lokaaskisten moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).

- Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaaskist.

- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.

- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.

- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.

- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.

- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaaskisten naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.

- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en er geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.

---

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Professionals:

- Voorafgaand aan de behandeling, waar mogelijk, eventuele omstanders (b.v.. gebruikers van het behandelde gebied en hun omgeving) informeren over de bestrijding van knaagdieren.
  
- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.
  
- De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.
  
- Gebruik lokaas dat werkzame bloedverdunnende stoffen bevat niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
  
- De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat het product mag niet aan het algemene publiek worden geleverd (bijv. "uitsluitend voor professionals")
  
- Met behulp van dit product zouden knaagdieren binnen 35 dagen geëlimineerd moeten zijn. De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.
  
- Was de lokaasdozen niet met water tussen behandelingen door.
  
- Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid :

- Voorafgaand aan de behandeling, waar mogelijk, eventuele omstanders (b.v.. gebruikers van het behandelde gebied en hun omgeving) informeren over de bestrijding van knaagdieren.
  
- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan worden vermoed.
  
- Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling.

---

- Gebruik met het oog op resistentie management geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel.

- De lokaasstations of het gereedschap dat wordt gebruikt in overdekte en beschermde lokaaspunten niet met water wassen tussen toepassingen.

- Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Professioneel :

- Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk et enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

- Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

- In geval van:

- blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.

- blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.

- blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts

- Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "productnaam of toelatingsnummer"; "werkzame stof(fen)" en "in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum"[070/245245].

- Gevaarlijk voor dieren in het wild.

Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid :

---

- Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk et enige vertraging) symptomen optreden zoals een

bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de

ontlasting of urine.

- Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

- In geval van:

- blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
- blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.
- blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de

mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen.

Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenart

- Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide";

"productnaam of toelatingsnummer"; "werkzame stof(fen)" en "in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele

hulpverlener die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum"[070/245245].

- Gevaarlijk voor dieren in het wild.

#### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Professioneel :

- Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten [De verpakking en (ongegeeten) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming]

---

Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid :

- Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten [De verpakking en (ongegeten) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].
- Het gebruik van handschoenen wordt aanbevolen.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.

- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.

- Houdbaarheid: 24 maanden.

---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**

- Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.
- Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.
- Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.