

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Ferpasta Brodi 25 rágcsálóirtó pép

Terméktípus(ok)

PT14: Rágcsálóirtó szerek

Az engedély száma: HU-2023-SP-14-00483-0000

R4BP eszközszám: HU-0031863-0000

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	Ferpasta Brodi 25 rágcsálóirtó pép Aptirat Pasta rágcsálóirtó pép Brodifast Pasta rágcsálóirtó pép Enderat Pasta rágcsálóirtó pép Fighter Pasta rágcsálóirtó pép Ikurat Pasta rágcsálóirtó pép Biotox Extra rágcsálóirtó pép
------------------	--

1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	FERBI S.r.l.
	Cím	I Maggio 64023 Mosciano Sant' Angelo Olaszország
Az engedély száma		HU-2023-SP-14-00483-0000
<i>R4BP eszközszám</i>		HU-0031863-0000
Az engedély megadásának dátuma		05/02/2014
Az engedély lejáratának dátuma		31/12/2026

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	FERBI S.r.l.
A gyártó címe	Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant' Angelo (TE) Olaszország
Gyártási helyek	FERBI S.r.l. - Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant' Angelo (TE) Olaszország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Brodifakum
A gyártó neve	Activa S.r.l
A gyártó címe	via Feltre, 32 20132 Milano Olaszország
Gyártási helyek	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Olaszország

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	hatóanyag	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. A formuláció típusa(i)

RB Halcsalétek (felhasználásra kész)

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H373: Károsíthatja a szerveket (VER) ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén {1:meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt:}.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P102: Gyermektől elzárva tartandó. P301 + P310: LENYELÉS ESETÉN:: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat - felhasználás – házi egerek – foglalkozásszerű felhasználás – beltéri

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: egyéb: Házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 20 g - 40 g csalétek csalétekállomásonként. Hígítás (%): 0,0025 A kezelések száma és időzítése: Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10 vagy 20 g-os filtrpapír tasakok. Csomagolóanyag: PE/Aluminium/Polyesther. Legalább 1,5 kg , de legfeljebb 25kg össztömeggel.

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

a csalétekállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétket.

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.1.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha a csalétekállomásokat vízelvezető rendszerek közelébe helyezzük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.1.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2. A felhasználások leírása

2. táblázat - felhasználás – patkányok – foglalkozásszerű felhasználás – beltéri

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: Vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: Juveniles to adults
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 100 g - 200 g csalétek csalétekállomásonként. Hígítás (%): 0,0025 A kezelések száma és időzítése: Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10 vagy 20 g-os fiterpapírtasakok. Csomagolóanyag: PE/Aluminium/Polyesther. Legalább 1,5 kg , de legfeljebb 25kg össztömeggel.

4.2.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

a csalétekállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétket.

4.2.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.2.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.2.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha a csalétekállomásokat vízelvezető rendszerek közelébe helyezjük el, biztosítjuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.2.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.3. A felhasználások leírása

3. táblázat - felhasználás – házi egerek és/vagy patkányok – foglalkozásszerű felhasználás – kültéren épületek körül

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Mus musculus</i> Közhasználatú név: egyéb: Házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: egyéb: Vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	egyéb: Other kültéren épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása

	Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: egerek ellen: 20 – 40 g csalétek csalétekállomásonként; Patkányok ellen: 100 g - 200 g csalétek csalétekállomásonként Hígítás (%): 0,0025 A kezelések száma és időzítése: Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10 vagy 20 g-os filterpapír tasakok. Csomagolóanyag: PE/Alumínium/Polyesther Legalább 1,5 kg , de legfeljebb 25 kg össztömeggel.

4.3.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

védjük a csalétket az időjárás viszontagságaitól. A csalétekállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezzük ki.

a csalétekállomásoknál a kezelés megkezdését követően [egerek esetén - legalább 2-3 naponta] [patkányok esetén - csak 5-7 nap elteltével], majd később legalább hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétket.

cseréljük ki a csalétekállomásban minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.

4.3.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.3.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ne alkalmazzuk a terméket közvetlenül üregekben.

4.3.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- Ha a csalétekállomásokat felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízvezető rendszerek közelében helyezzük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.3.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.3.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.4. A felhasználások leírása

4. táblázat - felhasználás – házi egerek – lakossági felhasználás – beltéri

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: egyéb: Házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: Fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 20g - 40g csalétek csalétekállományonként Hígítás (%): 0,0025 A kezelések száma és időzítése: Ha több csalétekállományra van szükség, a csalétekállományok közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10 vagy 20 g-os fleterpapír tasakokban. Műanyag vagy alumínium és műanyag csomagolásban. (Csomagolóanyag: PE/ Alumínium/Polyester) Legfeljebb 150g össztömeggel.

4.4.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétek elfogyasztják-e, a csalétekállományok épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétek.

4.4.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.4.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.4.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.4.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.4.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.5. A felhasználások leírása

5. táblázat - felhasználás – patkányok – lakossági felhasználás – beltéri

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: egyéb: Vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 100 g - 150 g csalétek csalétekállományonként Hígítás (%): 0,0025 A kezelések száma és időzítése: Ha több csalétekállományra van szükség, a csalétekállományok közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10 vagy 20 g-os filterpapír tasakokban. Csomagolóanyag: PE/Aluminium/Polyesther. Legfeljebb 15g össztömeggel.

4.5.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A csalétekállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétket.

4.5.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.5.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.5.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.5.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.5.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.6. A felhasználások leírása

6. táblázat - felhasználás – patkányok – lakossági felhasználás – kültéren épületek körül

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: Fiala és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	egyéb: Other Kültéren épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 100 g - 150 g csalétek csalétekállomásonként. Hígítás (%): 0,0025 A kezelések száma és időzítése: Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10 vagy 20 g-os filterpapír tasakok. Csomagolóanyag:: PE/Aluminium/Polyesther. Lefeljebb 150g össztömeggel.

4.6.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

a csalétekállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezzük ki.

cseréljük ki a csalétekállomásban minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.

a csalétekállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétket.

4.6.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.6.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.6.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.6.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.6.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

Foglalkozásszerű felhasználók :

Használata előtt olvassa el és kövessük a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

- Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.

Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot).

Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

- A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, esetleges élelmiszer és ital eltávolítása, amennyire lehetséges) a termék elfogyasztásának elősegítése, valamint az ismételt elszaporodás valószínűségének csökkentése érdekében.

- A csalétekállomásokat azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsáló aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).

- Ahol lehetséges, a csalétekállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.

- A csalétekállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni (lásd az 5.3. pontot a címkén feltüntetendő információkkal kapcsolatban).

[...] Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a kezelt területeket meg kell jelölni a kezelés ideje alatt, és a csalétek mellett tájékoztatást kell feltüntetni, amely ismerteti a véralvadást okozó által okozott elsődleges vagy másodlagos mérgezés kockázatát, valamint az elsősegély-nyújtási intézkedéseket mérgezés esetén.

- A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elhurcolni a csalétekállomásról.

- A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célszervezet állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezjük el.

- A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezjük el.

[Ahol a kockázatértékelés alapján szükséges:

Viseljünk vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során (az engedélyesnek meg kell adni a kesztyű anyagát a termékinformációk között)

Amennyiben szükséges, írjon elő további egyéni védőfelszerelést (például szemüveget vagy maszkot) a termék alkalmazásához]

A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

A termék alkalmazása után mossunk kezet, és mossuk meg a termékkel közvetlenül érintkezésbe került bőrfelületet.

- Ha a csalétek fogyasztása a fertőzöttség nyilvánvaló mértékéhez képest alacsony, vegyük fontolóra a csalétekállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.

Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsáló aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot.

Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegyük fontolóra más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószer, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadást okozó hatóanyagú rágcsálóirtószer használatát.

Alternatív védekezési intézkedésként vegyük fontolóra csapdák alkalmazását.

- A kezelési időszak végén távolítsuk el a megmaradt csalétket vagy a csalétekállomásokat.

„Csalétek-specifikus” használati utasítások:

Csalétek tasakban: Ne bontsa fel a csalétket tartalmazó tasakot.

- Kiszerezésre vonatkozó külön előírás: filterpapír tasakos kiszerezések: A tasakokat ne nyissa fel, felnyitás nélkül kell kihelyezni.

Pép:

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

-
- a) [Ahol indokolt] **Megfelelő** hosszúságú applikátorral (spatulával) helyezzük el a pép állagú csalétket, hogy csökkentse a kéz expozícióját - ne nyúljon a vödörbe.
- b) [Ahol indokolt] Adja meg, hogyan kell megtisztítani az eszközt (például spatulát), és hogyan kerülhető el a csalétek maradékával való érintkezés.

Lakossági felhasználók

Használata **előtt** olvassa el és kövessük a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

- A mérgezett csalétek kihelyezése **előtt** mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóirtalom irtószer alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata **kismértékű** egérirtalom felszámolására).

- távolítsuk el a rágcsálók számára könnyen **elérhető** élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot).

Ettől eltekintve, közvetlenül a kezelés **előtt** ne bolygassuk a területet, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

- a csalétekállomásokat annak a helynek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol rágcsáló aktivitást figyeltek meg (például vonulási útvonalak, fészkek, lyukak, üregek stb.).

- Ahol lehetséges, a csalétekállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.

- [Ne nyissuk ki a csalétket tartalmazó tasakot - amennyiben releváns a termékben **lévő** csalétek formuláció tekintetében].

- a csalétekállomásokat gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célszervezet állatok számára nem **hozzáférhető** helyen helyezzük el.

- a csalétekállomásokat **élelmiszertől**, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő **edényektől** vagy **felületektől** távol helyezzük el.

- a csalétekállomásokat ne helyezzük el **vízvezető** rendszerek közelébe, ahol víz érheti azokat.

A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

A termék alkalmazása után mossunk kezet, és mossuk meg a termékkel közvetlenül érintkezésbe kerülő **bőrfelületet**.

- A kezelési időszak végén távolítsuk el a megmaradt csalétket vagy a csalétekállomásokat.

- Kiszerezésre vonatkozó külön **előírás**: filterpapír tasakos kiszerezések: A tasakokat ne nyissa fel, felnyitás nélkül kell kihelyezni.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Foglalkozásszerű felhasználók :

Ahol lehetséges, a kezelés **előtt** tájékoztassuk az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóirtásról [adott esetben a vonatkozó bevált gyakorlattal összhangban]”.

- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran (például hetente legalább kétszer) keressük meg és távolítsuk el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

- A termék 35 nap után kizárólag a **fertőzöttség** állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését **követően** használható tovább.

- A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadástgátlókat. Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert- ha **elérhető**-, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadástgátló hatóanyagot használjon.

Az eltakart és védett rágcsálóirtóú pontokon használt csapdákat vagy szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel. A szakképzet **foglalkozásszerű** felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015 (VIII.7.) Korm. Rendelet **előírásai** szerint köteles gondoskodni.

A termékinformációk között (azaz a címkén és/vagy tájékoztatón) **egyértelműen** figyelmeztet arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzési követelményeknek **megfelelő** tanúsítással rendelkeznek.

- a terméket megfelelő, zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban kell alkalmazni (pl. „kizárólag zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban használandó”).- a felhasználóknak az alkalmazási előírás 5.3. pontjában említett információknak megfelelően fel kell címkézniük a csalétekállomásokat (pl. „a csalétekállomások címkézését a termékajánlásokkal összhangban kell elvégezni”).

Lakossági felhasználók

vegyük fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

- A terméket megfelelő, zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban kell alkalmazni (pl. „kizárólag zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban használandó”).

- Folyamatosan ne használjunk véralvadásgátló rágcsálóirtó csalétket (például rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására).

A termékinformációknak (azaz a címkének és/vagy tájékoztatónak) egyértelműen jelezniük kell az alábbiakat: Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: "tilos elmozdítani vagy kinyitni"; "rágcsálóirtót tartalmaz"; "termék neve és engedélyszáma"; "hatóanyag(ok)" és "baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz". (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99). A terméknek 35 napon belül el kell pusztítania a rágcsálókat.

-Amennyiben a kezelés nem tűnik hatékonynak(azaz továbbra is rágcsálói aktivitás észlelhető), A felhasználónak a termék értékesítőjéhez vagy kártevőirtóhoz kell fordulnia.

-Legalább az etetőállomások ellenőrzésének megfelelő gyakorisággal távolítsa el a kezelés aéatt elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban lévő tetemet zárt hulladékártóló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz. A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtók a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltják ki hatásukat.

Lenyelés esetén- adott esetben késleltetve jelentkező - tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevérzés, véeres vizelet vagy széklet is előfordulhat

-Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1 -vitamon.

Továbbá:

-Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.

-Szembe kerülés esetén: ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány pecen át öblögesse a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.

Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Tilos hánytatni. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét. Ha háziállat nyeli le a terméket forduljon állatorvoshoz.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: "tilos elmozdítani vagy kinyitni"; "rágcsálóirtót tartalmaz"; "termék neve és engedélyszáma"; "hatoanyag(ok)"; és "baleset esetén forduljon a toxikológiai központhoz.

(Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99). - Veszélyes a vadon élő állatokra.

Eltávolításuk során az elpusztult rágcshalókat ne érintsük meg pusztá kézzel, használjunk kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

- A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és csalétekállomást veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre- pl. hulladékudvar- kell leadni.

Az irtószert összegyűjtésekor védőkesztyű viselése ajánlott.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Az irtószert tartalmazó csomagolás zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.

- Gyermek, madarak, háziállatok és használatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

- Szavatossági idő:

2 év

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtók a csaletek elfogyasztása után 4-10 nappal váltják ki hatásukat.

A rágcsálók betegséget hordozhatnak.

Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintsük meg pusztán kézzel, használjunk kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

- A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

Ferpasta Brodi 25 rágcsálóirtó pép* vagy Aptirat Pasta rágcsálóirtó pép* vagy Brodifast Pasta rágcsálóirtó pép* vagy Enderat Pasta rágcsálóirtó pép* vagy Fighter Pasta rágcsálóirtó pép* vagy Ikurat Pasta rágcsálóirtó pép* vagy Biotox Extra rágcsálóirtó pép*

Hatóanyaga: 0,0025% brodifakum

III. forgalmazású irtószer

Engedélytulajdonos: Ferbi S.r.l. (Olaszország)

Engedélyszám: HU-2023-SP-14-00483-0000

Valamint a jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében: lakossági felhasználók részére: 2.2, 3.1, 4.1-4.6, (kivéve a kiserlések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6. megfelelő részei

foglalkozásszerű felhasználók részére: 2.2, 3.1, 4.7-4.10 (kivéve a kiserlések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6. megfelelő részei

Továbbá a rágcsálóirtószer tartalmazó filterpapír és műanyag tasakokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Ferpasta Brodi 25 rágcsálóirtó pép* vagy Aptirat Pasta rágcsálóirtó pép* vagy Brodifast Pasta rágcsálóirtó pép* vagy Enderat Pasta rágcsálóirtó pép* vagy Fighter Pasta rágcsálóirtó pép* vagy Ikurat Pasta rágcsálóirtó pép* vagy Biotox Extra rágcsálóirtó pép*

Hatóanyaga: 0,0025% Brodifakum

Ellenszere: K1-vitamin

* csak az aktuális terméknevet kell szerepeltetni