

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 -3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID  
NR. RO/2019/0157/MRA / ES/APP(NA)-2018-14-00178**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 17.10.2019 și 18.11.2019, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

**I. TIPUL AUTORIZATIEI**

reînnoirea autorizației naționale eliberată în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012

- Nr. Autorizației naționale care a fost reînnoită: ES/AA-2013-14-00110 cu autorizația națională nr. ES/APP(NA)-2018-14-00178

II. Data emiterii autorizației : 19.11.2019

III. Data expirării autorizației : 01.01.2023

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: FOXIRAT

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: Laboratorios Agrochem S.L.  
ADRESA: C/Tres Rieres nr. 1008292- Esparrequera (Barcelona) Spania

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: Laboratorios Agrochem S.L.  
ADRESA: C/Tres Rieres nr. 1008292- Esparrequera (Barcelona) Spania

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : Laboratorios Agrochem S.L.  
ADRESA : C/Tres Rieres nr. 1008292- Esparrequera (Barcelona) Spania  
SC AGROSEM ZAHIU ECOFITOPLANT S.R.L.  
ADRESA: Buzău, Comuna Glodeanu Sărat, Sat Pitulicea, Nr. 200

NUMELE FABRICANTULUI fiecărei SUBSTANTE ACTIVE : Laboratorios Agrochem S.L.  
ADRESA : C/Tres Rieres nr. 1008292- Esparrequera (Barcelona) Spania

VI.

TIPUL DE PRODUS: 14 (Rodenticid)

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: profesioniști instruiți.

VIII.

TIPUL PREPARATULUI : Momeala rodenticida sub forma de boabe de cereale impregnate





**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID E**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leontie, Nr. 1- 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 748 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

COPIE

**IX. COMPOZITIA CALITATIVA SI CANTITATIVA**

1) Substanta activa

a) *substante chimice*

Denumire comuna	Bromadiolone
Denumirea IUPAC	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
Numar CAS	28772-56-7
Numar CE	249-205-9
Continut de substantă activă	0,005%

b) *microorganisme-nu exista*

2) Substanta nonactivă

Denumirea IUPAC	2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Numar CAS	128-37-0
Numar CE	204-881-4
Continut de substantă activă	0-0,25%

**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI**

A. Produs biocid cu substanțe active - *substante chimice*

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	GHS08 Pericol
Fraze de risc H	H360D – Poate dăuna fătului. H372 Provoacă leziuni ale organelor (sange) în caz de expunere prelungită sau repetată
Fraze de prudență P	P102 – A nu se lasa la indemana copiilor. P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare. P280 – Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P405 – A se depozita sub cheie. P501 Eliminati continutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deseurilor, conform regulamentelor.

B. Produs biocid cu substanțe active *microorganisme-nu exista*

**XI. AMBALAREA**

Capacitate:

Personalul profesional instruit in interior: marime ambalaj minim 3 kg.

Grau varsat: Pachete de grau în vrac până la 30 kg. Pachetul este limitat la pungi ambalate separat, cu un maxim de 10 kg pe sac ambalat.

Grau în plicuri: plicuri individuale de 10, 15, 20, 25, 50, 75, 90, 100, și 200 de grame în ambalaj închis de până la 30 kg.

Materialul de ambalare:

Hârtie sau plicuri din: PP sau PE sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE.





**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1- 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 311 86 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Sticle de plastic sau găleți: HDPE sau PE sau PP sau PET sau PVC.

Saci de carton de: PET sau LDPE sau hartie Kraft.

Cutii de carton.

Personalul profesional instruit in exterior in jurul cladirilor: marime ambalaj minim 3 kg. Grau varsat:

Pachete de grau în vrac până la 30 kg. Pachetul este limitat la pungi ambalate separat, cu un maxim de 10 kg pe sac ambalat.

Grau în plicuri: plicuri individuale de 10, 15, 20, 25, 50, 75, 90, 100, și 200 de grame în ambalaj închis de până la 30 kg.

Materialul de ambalare:

Hârtie sau plicuri din: PP sau PE sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE.

Sticle de plastic sau găleți: HDPE sau PE sau PP sau PET sau PVC.

Saci de carton de: PET sau LDPE sau hârtie Kraft.

Cutii de carton.

XII.

**INSTRUCTIUNI LE SI DOZELE DE APLICARE**

Poate fi utilizat in interior si exterior in jurul cladirilor, zone exterioare deschise si depozite de deseuri

Utilizatori profesionisti instruiti: - in interior

Soareci: 60 – 100 g momeala / in statie de intoxicare

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu): 100-200 g momeala / in statie de intoxicare

Instructiuni de utilizare:

- Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.
- Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesionisti instruiti: - in exterior in jurul cladirilor

Soareci: 60 – 100 g momeala / in statie de intoxicare

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu): 100-200 g momeala / in statie de intoxicare

Instructiuni de utilizare:

- Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

- Inlocuiti momelile deteriorate de apa sau contaminate cu pamant din interiorul capcanelor.

- Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.

- Respectati instructiunile suplimentare prevazute de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesionisti instruiti: - zone exterioare deschise si depozite de deseuri

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu): 100-200 g momeala/statie de intoxicare

Instructiuni de utilizare:

- Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

- Inlocuiti momelile deteriorate de apa sau contaminate cu pamant din interiorul capcanelor.

- Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.

- Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Instructiuni generale de utilizare:

- Inainte de utilizare, cititi si respectati informatiile despre produs si orice alte informatii care il insotesc sau sunt furnizate de vanzator.

- Efectuati o observatie a zonei infestate, anterior amplasarii otravii, in vederea identificarii speciilor de rozatoare, a locurilor de activitate a acestora si a determinarii posibilei cauze si a amplorii infestarii.





## MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1- 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318,36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

- Eliminati hrana usor de obtinut de rozatoare (de exemplu, cereale varsate sau deseuri alimentare). In plus, nu curatati zona infestata imediat inainte de aplicare, deoarece conduce la perturbarea populatiei de rozatoare si face mai dificila acceptarea momelii de catre aceasta.
- Produsul trebuie utilizat numai ca parte a unui sistem integrat de management al infestarilor cu daunatori (IPM), care sa includa, printre altele, masuri de igiena și, acolo unde este posibil, metode fizice de combatere.
- Produsul trebuie amplasat in imediata apropiere a locurilor in care s-a observat prezenta rozatoarelor (de exemplu: cai de acces, locuri de cuibărit si de hranire, gauri, vizuini, etc.).
- In masura posibilitatilor, fixati capcanele de sol sau alte structuri.
- Capcanele trebuie etichetate clar pentru a indica ca contin rodenticide si ca se interzice mutarea sau deschiderea lor.
- Atunci cand produsul este utilizat in zone publice, zonele tratate trebuie sa fie marcate in timpul perioadei de tratament, iar un aviz care explica riscul otravirii primare sau secundare de catre anticoagulant, precum si indicarea primelor masuri care trebuie luate in caz de otravire trebuie sa fie puse la dispozitie alaturi de momeli.
- Momeala trebuie asigurata in asa fel incat sa nu poata fi scoasa din capcana.
- Amplasati capcanele la adăpost de copii, pasari, animale de companie, animale domestice si la alte animale nevizate.
- Amplasati capcanele departe de alimente, bauturi si hrana pentru animale, precum si de ustensilele sau suprafetele care intra in contact cu acestea.
- Folositi manusi de protectie rezistente la substante chimice in faza de manipulare.
- Nu beti, mancati sau fumati in timpul utilizarii. Dupa utilizarea produsului, spalati-va mainile si pielea expusa.
- Frecventa vizitelor in zona tratata ramane la discreția operatorului, in functie de rezultatele studiului efectuat la inceputul perioadei de tratament. Aceasta frecventa trebuie sa fie conforma cu recomandarile cuprinse in codul de bune practici (sau echivalent).
- Daca consumul de momeala este scazut in raport cu infestarea estimata, luati in considerare reamplasarea statiilor de momeala in alte locuri si posibilitatea de a schimba formularea momelii.
- Daca dupa o perioada de aplicare de 35 de zile, momelile continua sa fie consumate si nu se observa o reducere a activitatii rozatoarelor, trebuie determinata cauza probabila. Daca s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozatoarele sa aiba un grad de rezistenta la substanta. Prin urmare, luati in considerare utilizarea unui rodenticid non-coagulant, daca este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea, luati in considerare utilizarea de capcane mecanice, ca masura de combatere alternativa.
- Nu deschideti sacii care contin momeala.
- Momeala vracă puneti momeala in statia de intoxicare folosind un dispozitiv de dozare. Specificati metodele pentru minimizarea prafului (de ex. stergerea umeda).

**XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE :** Depozitarea recipientului într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, închis și departe de lumina directă a soarelui.

Accesul copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă sa fie interzisa.

**DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDICE ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE :** 2 ani (24 luni)

**ALTE INFORMATII:**

Datorită modului lor de acțiune întârziat, rodenticidele anticoagulante au nevoie de 4 până la 10 zile pentru a fi eficiente după consumul de momeală.

- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele goale cu mâinile goale, folosiți mănuși sau folosiți unelte, cum ar fi cleștele atunci când le eliminați.





**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 311 86 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

COPIE

- Acest produs contine un agent de amarare și un colorant.

Restricții pentru utilizarea produsului biocid: Se va evita prin orice mijloace patrunderea in sistemul de canalizare si in ape de suprafata. Atunci cand se plaseaza punctele de momela in apropierea apelor de suprafata (rauri, iazuri, canale de apa, diguri, santuri de irigare) sau sisteme de scurgere a apei , se va evita contactul momelii cu apa.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

Acest certificat reprezinta reinnoirea certificatului pentru autorizarea produsului biocid Nr. RO/2016/0157/MRA/ ES/AA-2013-14-00110

PRESEDINTE,  
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

COPIE

COPIE