

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: VICTOR GEL

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0021203-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0021203-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	8
5.1. Navodila za uporabo	8
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	9
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	9
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	9
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. Druge informacije	10

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

VICTOR GEL
VICTOR GEL COCKROACHES
Vulcan Gel Cockroach
Vulcan Gel Cockroach Pro
DDD gel za zatiranje ščurkov

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Kollant S.r.l.
	Naslov	Via C.Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo Italija
Številka dovoljenja	SI-0021203-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0021203-0000	
Datum dovoljenja	10/09/2019	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31/12/2025	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	ADAMA Celsius, B.V. Amsterdam.(NL)
Naslov proizvajalca	ADAMA Group - Spitalstrasse, 5 8200 Schaffhausen Švica
Lokacije proizvodnje	MYLVA, S.A. - San Galderic 23 08395 San Pol de Mar, BARCELONA Španija
	COMERCIAL QUIMICA MASSÓ, S.A. - P.I. San Pere Molanta - Avda. del Cadí 7-14 08799 Olerdola (Barcelona) Španija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	37 - Imidaklopid
Ime proizvajalca	Bayer Cropscience AG
Naslov proizvajalca	16 rue Jean-Marie Leclair cp 106 69266 Lyon Cedex 09 Francija
Lokacije proizvodnje	Industrial Operations Alfred Nobel-Strasse 50 40789 Monheim Nemčija
Aktivna snov	37 - Imidaklopid
Ime proizvajalca	Adama Agriculture Espana, S.A.
Naslov proizvajalca	Calle Mendez Alvaro, 20-5 28045 Madrid Španija
Lokacije proizvodnje	Adama Makhteshim Ltd. - Neot-Hovav Eco-Industrial Park 84100 Beer Sheva Izrael Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd - 39 Wenfeng Road 225009 Yangzhou Kitajska

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktivna snov	138261-41-3	428-040-8	2,15

2.2. Vrsta formulacije

RB - gotova vaba

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on in 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

Hraniti zunaj dosega otrok.

Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

Preprečiti sproščanje v okolje.

Prestreči razlito tekočino.

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.

4. Dovoljena(e) uporaba**4.1 Opis uporabe**

Uporaba 1 - Uporaba 1 – V notranjih prostorih, razpokah in špranjah - Vaba v obliki gela, ki se nanaša kot kapljice - splošna uporaba (ne-poklicni uporabnik)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid proti ščurkom

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Blattella germanica*
Splošno ime: German cockroach
Razvojni stadij: Adults and nymphs

Znanstveno ime: *Blatta orientalis*
Splošno ime: Oriental cockroach
Razvojni stadij: Adults and nymphs

Znanstveno ime: *Periplaneta americana*
Splošno ime: American Cockroach
Razvojni stadij: Adults and nymphs

Znanstveno ime: *Blattodea*
Splošno ime: Brown-banded cockroach
Razvojni stadij: Odrasli osebk

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

V notranjih prostorih, razpokah in špranjah

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem
Podroben opis:

Odprta aplikacija z vabo v obliki gela, ki se nanese kot kapljica iz brizge.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 2-6 kapljic/m²
Redčenje (%): 0
Število in časovni raspored uporabe:
Doza: 2-6 kapljic/m². Odvisno od stopnje okuženosti.

Frekvenca nanosa: Preverite mesta z vabo vsakih 7-14 dni in ponovno nanesite vabo, če je bila le ta pojedena in okuženost vztraja. Ne nanašajte več kot štiri krat na mesto vabe med tretiranjem.

Frekvenca tretiranja: Tretiranje se lahko ponovi tri mesece po zaključeni okuženosti.

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

LPDE plastična brizgalka 3, 5, 10 in 20 g

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Uporaba le v notranjih prostorih.
Biocidni proizvod nanesite samo v razpoke in špranje, za pohištvo in napravami. Proizvoda se ne sme uporabiti na površinah.
Ne izpostaviti kapljic vabe sončni svetlobi ali viru toplote (kot npr. radiator). Prosimo kontaktirajte izvajalce nadzora nad škodljivci v primeru da okuženost po tretiranju ne mine.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne nanašajte na površine ali pripomočke, ki so lahko v stiku s krmo/živilami.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

glejte Splošna navodila za uporabo

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

glejte Splošna navodila za uporabo

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

glejte Splošna navodila za uporabo

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Uporaba 2 - V notranjih prostorih, razpokah in špranjah - Vaba v obliki gela, ki se nanaša kot kapljice - poklicna uporaba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid proti ščurkom
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Blattella germanica</i> Splošno ime: German cockroach Razvojni stadij: Adults and nymphs Znanstveno ime: <i>Blatta orientalis</i> Splošno ime: Oriental cockroach Razvojni stadij: Adults and nymphs Znanstveno ime: <i>Periplaneta americana</i> Splošno ime: American Cockroach Razvojni stadij: Adults and nymphs Znanstveno ime: <i>Blattodea</i> Splošno ime: Brown-banded cockroach Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj V notranjih prostorih, razpokah in špranjah
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem Podroben opis: Odprta aplikacija z vabo v obliki gela, ki se nanese kot kapljica iz brizge.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 2-6 kapljic/m ² Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Doza: 2-6 kapljic/m ² . Odvisno od stopnje okuženosti. Frekvenca nanosa: Preverite mesta z vabo vsakih 7-14 dni in ponovno nanesite vabo, če je bila le ta pojedena in okuženost vztraja. Ne nanašajte več kot štiri krat na mesto vabe med tretiranjem. Frekvenca tretiranja: Tretiranje se lahko ponovi tri mesece po zaključeni okuženosti
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni

Velikosti in material embalaže

LDPE plastična brizgalka 3, 5, 10 in 20 g.

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Uporaba le v notranjih prostorih.

Biocidni proizvod nanesite samo v razpoke in špranje, za pohištvo in napravami.
Proizvoda se ne sme uporabiti na površinah. Ne izpostaviti kapljic vabe sončni svetlobi ali viru toplote (kot npr. radiator).
Prosimo kontaktirajte izvajalce nadzora nad škodljivci v primeru da okuženost po tretiranju ne mine.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne nanašajte na površine ali pripomočke, ki so lahko v stiku s krmo/živilo.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

glejte Navodila za uporabo

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

glejte Navodila za uporabo

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

glejte Navodila za uporabo

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Uporaba 3 – V notranjih prostorih, razpokah in špranjah - Vaba v obliki gela, ki se nanaša kot kapljice, usposobljeni poklicni uporabnik

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Insekticidi proti ščurkom

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Blattella germanica*
Splošno ime: German cockroach
Razvojni stadij: Adults and nymphs

Znanstveno ime: *Blatta orientalis*
Splošno ime: Oriental cockroach
Razvojni stadij: Adults and nymphs

Znanstveno ime: *Periplaneta americana*
Splošno ime: American Cockroach
Razvojni stadij: Adults and nymphs

Znanstveno ime: Blattodea:
Splošno ime: Brown-banded cockroach
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

V notranjih prostorih, razpokah in špranjah

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem
Podroben opis:

Odprta aplikacija z vabo v obliki gela, ki se nanese kot kapljica iz brizge/kartuše.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Odvisna je od stopnje okuženosti in vrste ščurkov. (1 kapljica = 0,04 g)
Redčenje (%): 0

Število in časovni razpored uporabe:

Doza: je odvisna od stopnje okuženosti in vrste ščurkov. (1 kapljica = 0,04 g).

- nemški ščurki (*Blattella germanica*): 0,04-0,16 g/m² (1-4 kapljic/m²)

- orientalski ščurki (*Blatta orientalis*): 0,08-0,24 g/m² (2-6 kapljic/m²)

- ameriški ščurki (*Periplaneta Americana*): 0,08 g/m² -0,24 g/m²(2-6 kapljic/m²)

- rjavi ščurki (*Supella longipalpa*): 0,04-0,16 g/m² (1-4 kapljic/m²)

Frekvenca nanosa: Preverite mesta z vabo vsakih 7-14 dni in ponovno nanesite vabo, če je bila le ta pojedena in okuženost vztraja. Ne nanašajte več kot štiri krat na mesto vabe med tretiranjem.

Frekvenca tretiranja: Tretiranje se lahko ponovi tri mesece po zaključeni okuženosti

Skupina(-e) uporabnikov

Strokovnjak z licenco

Velikosti in material embalaže

LDPE plastična brizgalka 3, 5, 10 in 20 g.
LDPE plastična kartuša po 30 in 35 g

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Uporaba le v notranjih prostorih.

Biocidni proizvod nanesite samo v razpoke in špranje, za pohištvo in napravami. Proizvoda se ne sme uporabiti na površinah. Ne izpostavite kapljic vabe sončni svetlobi ali viru toplote (kot npr. radiator).

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne izvajati tretiranja na javnih mestih v prisotnosti ljudi in/ali domačih živali.

Proizvod se bo nanašal v prehrabeni industriji v odsotnosti živil, razen v skladiščih, kjer so shranjeni proizvodi pravilno pakirani. Sprejeti je potrebno ustrezne ukrepe za zagotovitev, da hrana, oprema ali pripomočki, ki so bili predhodno tretirani s proizvodom, ne vsebujejo ostankov aktivne snovi. Uporabite samo v zaprtih območjih, ki so težko dostopna in hranite stran od vode.

Sprejeti metode celostnega zatiranja škodljivcev, kot so to kombinacija kemičnih, fizikalnih kontrolnih metod in drugih javnozdravstvenih ukrepov, ob upoštevanju lokalnih posebnosti (podnebne razmere, ciljne vrste, pogoji uporabe, itd.)

Preveriti učinkovitost proizvoda na mestu uporabe: če je potrebno, je potrebno raziskati vzrok za zmanjšano učinkovitost, da se zagotovi da ni odpornosti ali da se ugotovi potencialna odpornost. Proizvoda ne uporabljati na območjih, kjer obstaja sum ali je ugotovljena odpornost.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika dovoljenja.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

glejte Navodila za uporabo

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

glejte Navodila za uporabo

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

glejte Navodila za uporabo

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Opravite temeljit pregled, da ugotovite stopnjo okužbe (nizka ali visoka).
Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodilo in upoštevajte vsa navodila, ki so na voljo.
Ne uporabljajte na lesenih ali poroznih površinah.
Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.
Ne mešajte z drugimi kemikalijami ali v območjih, ki ste jih pred kratkim obdelali z insekticidom.
Proizvod naj se ponovno nanaša samo do zaključka nadzora nad škodljivci.
Za optimalno učinkovitost tretiranja, upoštevajte dobro higiensko prakso: odstranite ali preprečite dostop do vseh virov hrane. Vaba mora biti glavni vir hrane, ki je na voljo ščurkom.
Da bi optimizirali učinkovitost, enkrat tedensko preverite vabo in jo zamenjajte/dopolnite, če je poškodovana ali umazana.
Uporabljajte proizvod v priporočenih odmerkih in intervalih.
Nevarno za čebele.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Preprečiti stik z očmi in kožo.
Preprečiti otrokom dotikanje tretiranih površin.
Ta proizvod je potrebno uporabljati izmenično z drugimi izdelki, ki ne vsebujejo iste aktivne snovi, da bi se izognili odpornim populacijam.
Ne izvajati tretiranja v prisotnosti otrok in/ali domačih živali.
Ne nanašajte direktno na površine, kjer se hrani, pripravlja ali je hrana ali krma.
Ne nanašajte/uporabljajte direktno na ali blizu hrane, krme ali pijače ali na površinah ali pripomočkih, ki bodo verjetno prišli v direkten stik s hrano, krmo, pijačo ali živalmi.
Proizvod je potrebno nanesti tako, da hišni ljubljenci, hrana, krma in živina ne pridejo v stik s proizvodom.
Nastavite nedostopno otrokom, hišnim živalim in ne-ciljnim živalim.
Proizvod mora biti nanešen varno, tako da se minimizira tveganje za uživanje s strani živali ali otrok.
Proizvoda ne odvrzite na tla, v vodotoke, v korito ali v odtok.
Preprečiti sproščanje v okolje (P273).
Odstranite neporabljen proizvod, njegovo embalažo in vse druge odpadke (npr. mrtve insekte) v skladu z lokalnimi predpisi.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Navodila za prvo pomoč:
- V primeru stika s kožo, sperite prizadeto območje z veliko vode brez drgnjenja. Če se pojavi draženje/preobčutljivost kože, vztraja ali se intenzivira, poiščite zdravniško pomoč
- V primeru stika z očmi; preverite za in odstranite kontaktne leče, spirajte oči z veliko vode pri odprtih vekah vsaj 15 minut.
- V primeru zaužitja, sperite usta z veliko vode, NE izzivati bruhanja, NE dajati ničesar v usta nezavestni osebi. Če doživite hude bolečine v trebuhu ali se počutite slabo, poiščite zdravniško pomoč.
- Če je potrebno, odpeljite prizadeto osebo v zdravstveni dom in prinesite embalažo ali etiketo, ko je mogoče.

NIKOLI NE PUSTITE PRIZADETE OSEBE NENADZOROVANE!

Nasveti za medicinsko in zdravstveno osebje:

- Zagotovite simptomatsko in podporno zdravljenje.

ČE JE POTREBEN ZDRAVNIŠKI NASVET, IMEJTE EMBALAŽO ALI ETIKETO PRI ROKI IN POKLIČITE LOKALNI CENTER ZA ZASTRUPITVE [112].

Nujni ukrepi za varstvo okolja

Previdnostni ukrepi: Preprečiti, da pride proizvod v okolje (površinske vode in podtalnico), kanalizacijo (pričakujte, če je specifično področje uporabe, kanalizacijske pokrove), odvodnjavanje itd. s konstrukcijo zaščitnih pregrad in zapiranjem odtokov.

Poročajte ustreznim organom ali jih obvestite o uhajanju v vodne poti, odtoke, kanalizacijo ...

Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Absorbirati razlitje z inertnim materialom (pesek, kaolin ...), zbrati in dati v posode za kasnejše pravilno identificiranje in ravnanje z nevarnimi odpadki.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi (P501)

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Proizvod je stabilen 2 leti v originalni embalaži pod normalnimi pogoji skladiščenja.
Shranjujte v originalni posodi.
Posode hraniti tesno zaprte, na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.
Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
Hraniti ločeno od vode, hrane in krmil.
Priporočljivo je, da izdelek hranite pri temperaturi po možnosti med 5 ° C in 45 ° C

6. Druge informacije

Definicije:

Usposobljeni poklicni uporabnik: izvajalec dejavnosti nadzora nad škodljivci, ki so prejeli posebno usposabljanje za delo z insekticidi v skladu z nacionalno veljavno zakonodajo.

Poklicni uporabnik: Uporabnik, ki uporablja biocidne proizvode na delovnem mestu. Ta uporabnik ima nekaj znanja in veščine pri rokovanju s kemikalijami in je sposoben pravilno uporabiti osebno varovalno opremo (OVO), če je potrebno.

Splošna uporaba (ne-poklicni uporabnik): Uporabniki, ki niso poklicni uporabniki in ki uporabljajo izdelek v kontekstu privatnega življenja.

Izdelek vsebuje grenko snov, ki jo naredi ogabno za ljudi ali domače živali. Za usposobljenega poklicnega uporabnika se priporoča, da nosi ustrezne zaščitne rokavice med uporabo.