

RO

ANEXĂ

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

FERBLOCK BROMA 27

Tip(uri) de produs

TP 14: Rodenticide

Numărul autorizației: RO/2023/0381/MRS/IT/2021/00741/AUT

Numărul deciziei de reglementare R4BP: RO-0033121-0000

Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	FERBLOCK BROMA 27 ASKARAT BLOCK ASTRAT BLOCK BROMAFAST BLOCK DODARAT BLOCK OMNIRAT BLOCK ZURRAT BLOCK
--------------------------------	---

1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	FERBI S.r.l.
	Adresă	I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo Italia
Numărul autorizației		RO/2023/0381/MRS/IT/2021/00741/AUT
Numărul deciziei de reglementare R4BP		RO-0033121-0000
Data autorizației		14/12/2012
Data de expirare a autorizației		31/12/2026

1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	FERBI S.r.l.
Adresa producătorului	Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italia
Adresa locurilor de producție	FERBI S.r.l. - Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italia

1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanță activă	Bromodiolonă
Denumirea producătorului	Activa S.r.l.
Adresa producătorului	Via Feltre 32 20132 Milano Italia
Adresa locurilor de producție	Dr. Tezza s.r.l. - Via Tre Ponti 22 37059 S.Maria di Zevio (VR) Italia

Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Bromodiolonă	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substanță activă	28772-56-7	249-205-9	0,0027 % (de greutate)
Denatonium benzoate	benzyl-[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-diazanium; benzoate	Substanță inactivă	3734-33-6	223-095-2	0,001 % (de greutate)
Calcium hidroxid	calcium; dihidroxid	Substanță inactivă	1305-62-0	215-137-3	0,375 % (de greutate)

2.2. Tip(uri) de formulare

RB Momeală (gata de utilizare)

Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	H373: Poate provoca leziuni ale organelor (sangvine) în caz de expunere prelungită sau repetată {1:indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că înicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol:}.
Fraze de precauție	P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P501: Aruncați conținutul la în conformitate cu regulamentele locale/regionale/naționale/internationale. P501: Aruncați recipientul la în conformitate cu regulamentele locale/regionale/naționale/internationale.

Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1. Descrierea utilizării

Tabel 1. Șoareci de casă – profesional – interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: șoareci de casă Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 60 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Sac etichetat sau imprimat în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic): de la 1.5 kg până la 25 kg (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g. Ambalajul este limitat la pungile ambalate separat în PE/ Aluminiu/ Poliester cu o dimensiune maximă de 10 kg. Pungă/sac/ în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic) etichetat sau imprimat găleată HDPE (sigilată): de la 1.5 kg până la 25 kg (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g). Ambalajul este limitat la pungile ambalate separat în PE/ Aluminiu/ Poliester cu o dimensiune maximă de 10 kg. Pungă/sac/ în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic) imprimat pe cutie de carton ce conține plicuri sau cutie de carton: de la 1.5 kg până la 25 kg (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g). Ambalajul este limitat la pungile ambalate separat în PE/ Aluminiu/ Poliester cu o dimensiune maximă de 10 kg.

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează cel puțin o dată la 2-3 zile la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (profesional)”.

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (profesional)”.

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (profesional)”.

4.2. Descrierea utilizării

Tabel 2. Ratti - profesioniști - all'interno di edifici

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: șobolanul maro Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 100 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare:

	-
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Sac etichetat sau imprimat în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic): de la 1.5 kg până la 25 kg (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g. Ambalajul este limitat la pungile ambalate separat în PE/ Aluminiu/ Poliester cu o dimensiune maximă de 10 kg.</p> <p>Pungă/sac/ în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic) etichetat sau imprimat găleată HDPE (sigilată): de la 1.5 kg până la 25 kg (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g). Ambalajul este limitat la pungile ambalate separat în PE/ Aluminiu/ Poliester cu o dimensiune maximă de 10 kg.</p> <p>Pungă/sac/ în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic) imprimat pe cutie de carton ce conține plicuri sau cutie de carton: de la 1.5 kg până la 25 kg (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g). Ambalajul este limitat la pungile ambalate separat în PE/ Aluminiu/ Poliester cu o dimensiune maximă de 10 kg.</p>

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (profesional)”.

4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (profesional)”.

4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (profesional)”.

4.3. Descrierea utilizării

Tabel 3. Șoareci de casă și șobolani - profesional - exterior, în jurul clădirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: <i>Mus musculus</i> Denumirea comună: altele: #oarece de casă Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți Denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: altele: #obolanul maro Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior La exterior, în jurul clădirilor.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: #oarecele de casă: 60 g momeală pastă per capcană. #obolanul maro: 100 g momeală pastă per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. altro. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Sac etichetat sau imprimat în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic): de la 1.5 kg până la 25 kg (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g. Ambalajul este limitat la pungile ambalate separat în PE/ Aluminiu/ Poliester cu o dimensiune maximă de 10 kg. Pungă/sac/ în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic) etichetat sau imprimat găleată HDPE (sigilată): de la 1.5 kg până la 25 kg (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g). Ambalajul este limitat la pungile ambalate separat în PE/ Aluminiu/ Poliester cu o dimensiune maximă de 10 kg. Pungă/sac/ în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic) imprimat pe cutie de carton ce conține plicuri sau cutie de carton: de la 1.5 kg până la 25 kg (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g). Ambalajul este limitat la pungile ambalate separat în PE/ Aluminiu/ Poliester cu o dimensiune maximă de 10 kg.

4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de intemperii (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.
- Capcanele se inspectează [în cazul șoarecilor – cel puțin o dată la 2-3 zile la] [în cazul șobolanilor – numai după 5-7 zile de la] începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.
- Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

4.3.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Nu introduceți produsul direct în vizuini.

4.3.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.3.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (profesional)”.

4.3.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (profesional)”.

4.4. Descrierea utilizării

Tabel 4. Șoareci de casă – populație – interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: șoarece de casă Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală

	Descriere detaliata: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 60 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Sac etichetat sau imprimat în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic): de la 10 g până la 100 g (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g). Pungă/sac/ în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic) etichetat sau imprimat găleată HDPE (sigilată): de la 10 g până la 100 g (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g). Pungă/sac/ în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic) imprimat pe cutie de carton ce conține plicuri sau cutie de carton: de la 10g până la 100 g (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g).

4.4.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează cel puțin o dată la 2-3 zile la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.4.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (Populație)”.

4.4.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (Populație)”.

4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (Populație)”.

4.4.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (Populație)”.

4.5. Descrierea utilizării

Tabel 5. Șobolani –Populație – interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide.
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: șobolanul maro Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior La interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 100 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Labelled or printed bag/sack in PE/Aluminium/Polyester (thermal welded): from 100 g up to 300 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks). Bag/sack in PE/Aluminium/Polyester (thermal welded) in labelled or printed HDPE bucket (sealed): from 100 g up to 300 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks). Bag/sack in PE/Aluminium/Polyester (thermal welded) in labelled or printed carton sachet or in labelled or printed cardboard: from 100 g up to 300 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks).

4.5.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.5.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (Popula#ie)”.

4.5.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (Popula#ie)”.

4.5.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (Popula#ie)”.

4.5.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (Popula#ie)”.

4.6. Descrierea utilizării

Tabel 6. Șobolani – populație – în jurul clădirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolanul maro Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adul#i
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior În jurul clădirilor.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii #i deteriorării.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: 100 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distan#a minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul #i calendarul de aplicare: -
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioni#ti)
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Sac etichetat sau imprimat în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic): de la 100 g până la 300 g (con#ine momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g.

Pungă/sac/ în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic) etichetat sau imprimat găleată HDPE (sigilată): de la 100 g până la 300 g (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g). Pungă/sac/ în PE/Aluminiu/Poliester (lipit termic) imprimat pe cutie de carton ce conține plicuri sau cutie de carton: de la 100 g până la 300 g (conține momeli de rodenticid în blocuri de ceară de 10-20 g).
--

4.6.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.- Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.- Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.6.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (Populație)”.

4.6.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (Populație)”.

4.6.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

A se vedea „Măsuri generale de utilizare (Populație)”.

4.6.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

A se vedea „Direcții generale de utilizare (Populație)”.

Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE¹

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Uz profesional

- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt furnizate la vânzare
- Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării.
- Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (ex. boabe de cereale sau resturi de mâncare)). Pe lângă acestea, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.
- Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor (IPM), care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și atunci când este posibil, metode fizice de combatere.
- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventivă (ex. astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutura) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.
- Capcanele trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care s-au observat prezența rozătoarelor (ex. căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire, găuri, vizuini, etc).
- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau pe alte structuri.
- Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind informațiile înscrise la punctul 5.3 de pe etichetă.
- Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată perioada tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismenteprivind riscul de intoxicație primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor, care se iau în caz de intoxicație.
- Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.
- Amplasați produsul la distanță de îndemâna copiilor, păsări, animale de companie sau alte specii de animale nevizitate.
- Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și alte lucruri pentru animale, ustensile sau suprafețe cu care ar putea intra în contact.
- Manipulați produsul numai cu mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice.
- În timpul manipulării produsului, nu mâncați, beți sau fumați. Spălați-vă mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.
- Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în alte locuri și eventual o nouă schimbare a formulei momelii.
- Dacă după 35 zile după tratament momeala continuă să fie consumată și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza posibilă. Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid anticoagulant, dacă este disponibil sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea, luați în considerare și utilizarea de curse-capcane, ca și măsură de combatere alternativă.
- Îndepărtați momeala rămasă la finalul tratamentului.

Uz Populație

- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt furnizate la vânzare
- Înainte de a folosi produse rodenticide, ar trebui să luați în considerare și utilizarea unor metode non-chimice (ex. curse)
- Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (ex. boabe de cereale sau resturi de mâncare)). Pe lângă acestea, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.
- Capcanele trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care s-au observat prezența rozătoarelor (ex. căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire, găuri, vizuini, etc).
- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau pe alte structuri.
- Amplasați produsul la distanță de îndemâna copiilor, păsări, animale de companie sau alte specii de animale nevizitate.

¹Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

-
- Amplasa#i produsul la distan#ă de alimente, băuturi #i alte lucruri pentru animale, ustensile sau suprafe#e cu care ar putea intra în contact.
 - Nu amplasa#i capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei unde ar putea intra în contact cu apa.
 - În timpul manipulării produsului, nu mânca#i, be#i sau fuma#i. Spăla#i-vă mâinle #i pielea expusă direct după utilizarea produsului.
 - Îndepărta#i momeala rămasă la finalul tratamentului.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Uz profesional

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informa#i persoanele (utilizatorii zonei tratate #i împrejurimile acestora) care s-ar putea afla în preajma capcanelor ce au legătură cu campania de combatere a rozătoarelor (dacă e cazul).
- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căuta#i #i îndepărta#i frecvent rozătoarele moarte pe perioada tratamentului (ex. cel pu#in de două ori pe săptămână). [Dacă este relevant, specifica#i dacă este necesară o inspec#ie mai frecventă sau zilnică]
- Produsle nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 zile fără o evaluare a stării de infestare a eficacită#ii tratamentului.
- Nu utiliza#i momeli care con#in substan#e active anticoagulante ca momeli permanente pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau monitorizarea activită#ilor rozătoarelor.
- Informa#iile despre produs (adică eticheta #i / sau prospectul) trebuie să arate clar că:
 - produsul nu va fi furnizat publicului larg (de ex. „numai pentru uz profesional”). produsul trebuie utilizat în sta#ii de momeli adecvate, rezistente la manipulare (de exemplu, „se utilizează numai în sta#ii de momeli rezistente la manipulare”) utilizatorii trebuie să eticheteze în mod corespunzător sta#iile de momeală cu informa#iile men#ionate în sec#iunea 5.3 din RCP (de exemplu, eticheta#i sta#iile de momeală conform recomandărilor produsului ”).
- Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în termen de 35 de zile. Informa#iile despre produs (ex. eticheta #i / sau prospectul) recomandă în mod clar că, în cazul lipsei de eficacitate suspectată până la sfâr#itul tratamentului (dacă se mai observă activitatea rozătoarelor), utilizatorul trebuie să solicite sfatul furnizorului produsului sau să apeleze un serviciu de control împotriva dăunătorilor.
- Nu spăla#i sta#iile de momeală cu apă între aplica#ii.
- Elimina#i rozătoarele moarte în conformitate cu cerin#ele locale.

Uz Popula#ie

- Analiza#i posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (ex. astupa#i găurile, îndepărta#i cât mai mult posibil eventualele surse de hrană #i băutură) pentru a cre#te #ansa de consum al produsului #i pentru a reduce riscul de reinvadare.
- Nu utiliza#i prin rodenticide anticoagulante ca momeli permanente (ex. pentru preven#ia inefestării cu rozătoare sau pentru a detecta activitatea rozătoarelor) .
- Informa#iile despre produs (ex. eticheta #i / sau prospectul) trebuie să arate în mod clar că:
 - produsul trebuie utilizat în sta#ii de momeli adecvate rezistente la manipulare (de exemplu, „se utilizează numai în sta#iile de momeală rezistente la manipulare”).
 - utilizatorii trebuie să eticheteze în mod corespunzător sta#iile de momeală cu informa#iile men#ionate în sec#iunea 5.3 din RCP (de exemplu, „eticheta#i sta#iile de momeală conform recomandărilor produsului”).
- Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în termen de 35 de zile. Informa#iile despre produs (ex. eticheta #i / sau prospectul) recomandă în mod clar că, în cazul lipsei de eficacitate suspectată până la sfâr#itul tratamentului (adică se mai observă activitatea rozătoarelor), utilizatorul trebuie să solicite sfatul furnizorului produsului sau să apeleze un serviciu de control pentru combaterea dăunătorilor.
- Căuta#i #i elimina#i rozătoarele moarte în timpul tratamentului, cel pu#in atât de des cât sunt inspectate sta#iile de momeală.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de ingestie, simptomele, care pot apărea cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale. În cazuri severe, pot să apară echimoze pe suprafața pielii și sânge în fecale sau urină.

- Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/ veterinar.

- În caz de:

- Expunere cutanată, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.

- Expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz ocular, țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.

- Expunere orală, clătiți atent gura cu apă. Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală unei persoane inconștiente. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Contactați un medic veterinar specializat dacă produsul a fost înghițit de vreun animal.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: "a nu se muta sau deschide", "conține rodenticid", "denumirea produsului sau numărul autorizației", "substanța activă" și "în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică".

- Periculos pentru animalele sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

- Depozitați în locuri uscate, răcoroase și bine ventilate. Păstrați ambalajele închise departe de razele soarelui.

- Depozitați în locuri unde nu au acces copiii, păsările, animalele de companie și animalele de fermă.

- Termen de valabilitate: 2 ani.

Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

- Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4 la 10 zile de la consumul momelii.
- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, folosiți mănuși sau instrumente, ca și clești, atunci când le îndepărtați.
- Acest produs conține un agent amar și colorant.