

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Deosan Activate Pre RTU AG108

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

Numărul curent: EU-0019228-0000

Numărul curent R4BP 3: EU-0019228-0003

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	3
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	3
2.2. Tipul preparatului	3
3. Fraze de pericol și de precauție	3
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	4
5. Direcții generale de utilizare	26
5.1. Instrucțiuni de utilizare	26
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	27
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	27
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	28
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	28
6. Alte informații	28

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Deosan Activate Pre RTU AG108
Deosan Activate Pre RTU

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresa	Maarssebroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Țările de Jos
Numărul curent	EU-0019228-0000 1-2	

Numărul curent R4BP 3	EU-0019228-0003
Data autorizației	03/04/2019
Data de expirare a autorizației	31/03/2029

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	1319 - Iod
Numele producătorului	ACF Minera S.A.
Adresa producătorului	San Martin No 499 1100000 Iquique Chile
Adresa locurilor de producție	Lagunas mine 118 0000 Pozo Almonte Chile

Substanța activă	1319 - Iod
Numele producătorului	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Adresa producătorului	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes 8320000 Santiago Chile
Adresa locurilor de producție	Nueva Victoria plant 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile

Substanța activă	1319 - Iod
Numele producătorului	Cosayach Nitratos S.A.
Adresa producătorului	Hnos Amunátegui 178 8320000 Santiago Chile
Adresa locurilor de producție	S.C.M. Cosayach Cala Cala 118 0000 Pozo Almonte Chile

Substanța activă	1319 - Iod
Numele producătorului	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Adresa producătorului	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japonia
Adresa locurilor de producție	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japonia

Substanța activă	1319 - Iod
Numele producătorului	ISE Chemicals Corporation
Adresa producătorului	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Japonia
Adresa locurilor de producție	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City 299-3201 Chiba Japonia

Substanța activă	1319 - Iod
Numele producătorului	Atacama Minerals SCM
Adresa producătorului	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes 8320000 Santiago Chile
Adresa locurilor de producție	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility 3580000 Antofagasta Chile

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,3

2.2. Tipul preparatului

AL - Orice alt lichid

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	<p>Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.</p> <p>A nu se lăsa la îndemâna copiilor.</p> <p>Evitați dispersarea în mediu.</p> <p>Aruncați conținutul la în conformitate cu regulamentele naționale.</p> <p>Aruncați recipientul la în conformitate cu regulamentele naționale.</p>

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Utilizarea # 12 Dezinfectia mameloanelor inainte de muls , Imersiune manuală (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: bacterii (gram-pozitive și gram-negative) etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Drojdie denumirea comună: drojdie etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Imersiune manuală - Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, înainte de mulgere in cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda imersiunii manuale
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000mg/kg (0,3% w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. - 3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi. Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE

canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE

recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda imersiunii manuale.
Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.
3 aplicații pre-mulgere, per animal, pe zi.
Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

În cazul în care este necesară dezinfectarea pre și post-mulgere, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs ce nu conține iod

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Utilizarea # 13 Dezinfectia mameloanelor inainte de muls, Înspumare manuală (lichid RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: bacterii (gram-pozitive și gram-negative)
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Drojdie
denumirea comună: drojdie
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Interior

Metoda (metodele) de aplicare

Înspumare manuală -

Dezinfectant mamelone, pentru aplicare directă, înainte de mulgere în cazul animalelor lactante
Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda înspumării manuale.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000 mg/kg (0,3% w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. -

3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi
Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE

canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE

recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.
Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda înspumării manuale.
3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi.
Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

În cazul în care este necesară o combinație de dezinfectare pre și post-mulgere, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs ce nu conține iod

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Utilizarea # 14 Dezinfectia mameloanelor inainte de muls, Aplicarea manuală a spray-ului (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: bacterii (gram-pozitive și gram-negative) etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Drojdie denumirea comună: drojdie etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior indoor
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicarea manuală a spray-ului - Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, înainte de mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000 mg/kg (0,3% w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. - 3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi. Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.
Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.
3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi.
Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

În timpul manipulării produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)
În cazul în care este necesară dezinfectarea pre și post-mulgere, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs ce nu conține iod

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Utilizarea # 15 Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Imersiune manuală (lichid RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: bacterii (gram-pozitive și gram-negative)
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Drojdie
denumirea comună: drojdie
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Interior

Metoda (metodele) de aplicare

Imersiune manuală -

Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, după mulgere în cazul animalelor lactante
Aplicare directă pe ugerul animalului după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000mg/kg (0,3% w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. -

3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE

canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE

recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.
Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.
3 aplicații post-mulgere, per animal, per zi
Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.4.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

În cazul în care este necesară dezinfectarea pre și post-mulgere, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs ce nu conține iod

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.5 Modul de utilizare

Utilizarea 5 - Utilizarea # 16 Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Înspumare manuală (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: bacterii (gram-pozitive și gram-negative) etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Drojdie denumirea comună: drojdie etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Înspumare manuală - Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, după mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda înspumării manuale.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000 mg/kg (0,3% w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. - 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE

canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE

recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda înspumării manuale.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicații post-mulgere, per animal, per zi

Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

4.5.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

În cazul în care este necesară dezinfectarea pre și post-mulgere, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs ce nu conține iod

4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.5.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.6 Modul de utilizare

Utilizarea 6 - Utilizarea # 17 Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Aplicarea manuală a spray-ului (lichid RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: bacterii (gram-pozitive și gram-negative)
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Drojdie
denumirea comună: drojdie
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Interior

Metoda (metodele) de aplicare

Aplicarea manuală a spray-ului -

Dezinfectant mameloanelor, pentru aplicare directă după muls, în cazul animalelor lactante
Aplicare directă pe mameloanele animalului după muls, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000 mg/kg (0,3% w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. -

3 aplicări post-muls, per animal, pe zi.
Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE

canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE

recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.
Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.
3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi
Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicaren

4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

În timpul manipulării produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)
În cazul în care este necesară dezinfectarea pre și post-mulgere, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs ce nu conține iod

4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.6.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7 Modul de utilizare

Utilizarea 7 - Utilizarea # 18 – Dezinfecția mameloanelor după muls, Aplicarea automatizată a spray-ului (a nu se combina cu dezinfectarea pre-mulgere) (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: bacterii (gram-pozitive și gram-negative) etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Drojdie denumirea comună: drojdie etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicarea automatizată a spray-ului - Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, după muls în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după muls, prin metoda aplicării automatizate a spray-ului.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000 mg/kg (0,3% w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. -

5 aplicări post-mulgere, per animal, per zi. A nu se combina cu dezinfectare pre-mulgere pe bază de iod.

Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE

canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE

recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.7.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda aplicării automatizate a spray-ului. Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

5 aplicări post-mulgere, per animal, per zi. A nu se combina cu dezinfectare pre-mulgere pe bază de iod. Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare

4.7.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.8 Modul de utilizare

Utilizarea 8 - Utilizarea # 19 Dezinfectia mameloanelor după muls, imersiune semi-automatizată (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: bacterii (gram-pozitive și gram-negative) etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Drojdie denumirea comună: drojdie etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Semi-automat dipping - Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, după muls în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după muls, prin metoda imersiunii semi-automatizate..

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000mg/kg (0,3% w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. -

3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi.
Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE

canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE

recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.8.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii semi-automatizate.
Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.
3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi
Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.8.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

În cazul în care este necesară dezinfectarea pre și post-mulgere, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs ce nu conține iod

4.8.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.8.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.8.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.9 Modul de utilizare

Utilizarea 9 - Utilizarea # 20 Dezinfectia mameloanelor înainte și după muls, Imersiune manuală (lichid RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: bacterii (gram-pozitive și gram-negative)
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Drojdie
denumirea comună: drojdie
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Interior

Metoda (metodele) de aplicare

Imersiune manuală -

Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă înainte și după muls în cazul animalelor lactante

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după muls, prin metoda imersiunii manuale

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000mg/kg (0,3% w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. -

	<p>3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total). Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare</p>
<p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p>	<p>profesional</p>
<p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p>	<p>canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE</p> <p>canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE</p> <p>recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE</p>

4.9.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda imersiunii manuale. Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total). Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare</p>

4.9.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

<p>În timpul manipulării produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)</p>

4.9.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.9.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.9.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.10 Modul de utilizare

Utilizarea 10 - Utilizarea # 21 Dezinfecția mameloanelor înainte și după muls, Înspumare manuală (lichid RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: bacterii (gram-pozitive și gram-negative)
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Drojdie
denumirea comună: drojdie
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

Interior

Metoda (metodele) de aplicare

Înspumare manuală -

Dezinfecțant mameloane, pentru aplicare directă, înainte și după muls în cazul animalelor lactante
Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după muls, prin metoda înspumării manuale.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000 mg/kg (0,3% w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. -

3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total).
Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE

canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE

recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.10.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.
Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda înspumării manuale.
3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total).
Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

4.10.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

În timpul manipulării produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)

4.10.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.10.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.10.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.11 Modul de utilizare

Utilizarea 11 - Utilizarea # 22 Dezinfectia mameloanelor înainte și după muls, Aplicarea manuală a spray-ului (lichid RTU)

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: bacterii (gram-pozitive și gram-negative)
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Drojdie
denumirea comună: drojdie
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

interior

Metoda (metodele) de aplicare

Aplicarea manuală a spray-ului -

	<p>Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă înainte și după mulgere, în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.</p>
<p>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</p>	<p>În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000 mg/kg (0,3% w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. -</p> <p>3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total). Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare</p>
<p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p>	<p>profesional</p>
<p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p>	<p>canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE</p> <p>canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE</p> <p>recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE</p>

4.11.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului. Formulă gata de utilizare ce conține 0,3% w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.
3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total). Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare

4.11.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

În timpul manipulării produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)
Purtați încălțăminte de protecție adecvată (EN 13832) atunci când aplicați produsul.
Purtarea unei salopete de protecție (cel puțin tipul 6, EN 13034) este obligatorie

4.11.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.11.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.11.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Acest produs trebuie adus la o temperatură de >20°C înainte de utilizare

Pre-mulgere:

Aplicați produsul pe întreaga suprafață a fiecărui mamelon.

Pentru utilizarea eficientă împotriva bacteriilor și a drojdiilor, produsul trebuie menținut în contact cu pielea cel puțin 30 de secunde. După timpul de contact adecvat, îndepărtați bine produsul, utilizând un prosop de hârtie/cârpă pentru a vă asigura că mameloanele sunt curate și uscate.

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000mg/kg (0,3% w/w)

Post-mulgere:

Acoperiți toată suprafața fiecărui mamelon cu produs imediat după mulgere.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie asigurat faptul că produsul nu este îndepărtat după aplicare (de ex., mențineți vaca în picioare cel puțin 5 minute)

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3000mg/kg (0,3% w/w)

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Este recomandată utilizarea unei pompe dozatoare pentru introducerea produsului în echipamentul de aplicare.

Produsul nu conține Substanțe cu Risc

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Inhalare: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.
Contactul cu pielea: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.
Contactul cu ochii: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.
Ingerare: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală

După inhalare: Inspirați aer curat; consultați un medic dacă apar simptome.
După contactul cu pielea: Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.
După contactul cu ochii: Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub apă curgătoare (cel puțin 15 minute).
După ingerare: Clătiți-vă gura și beți foarte multă apă. Sunați imediat un medic.
Dacă este necesar sfatul unui medic, asigurați-vă că aveți recipientul sau eticheta produsului la îndemână

Stabilitate și reactivitate:

Reactivitate: Nu sunt cunoscute riscuri de reactivitate în condiții normale de utilizare și depozitare.
Stabilitate chimică: Stabil în condiții normale de utilizare și depozitare.
Posibilitatea reacțiilor periculoase: Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare și depozitare.
Condiții ce trebuie evitate: Nu se cunosc în condiții normale de utilizare și depozitare.
Produse de descompunere periculoși: Nu se cunosc în condiții normale de utilizare și depozitare.

Măsuri de precauție de mediu:

Un șanț pentru colectarea scurgerilor mai mari de lichid.
Limitați și/sau ștergeți scurgerile cu un material inert, apoi puneți-l într-un recipient adecvat. Preveniți scurgerea excesivă de lichid în scurgeri, canale colectoare sau cursuri de apă.
Colectați în recipiente închise și adecvate pentru eliminare.
Nu puneți materialele scurse înapoi în recipientul original.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Recipientele goale trebuie clătite de trei ori înainte de eliminare
Prosoapele de hârtie utilizate pentru ștergerea animalului și pentru îndepărtarea produsului trebuie eliminate ca deșeu casnic/normal.

Nu aruncați produs nediluat în canale colectoare.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Păstrați produsul numai în recipientul original, închis
Protejați împotriva înghețului
Nu depozitați la temperaturi peste 30°C
Dată de valabilitate 24 de luni

6. Alte informații

Niciunul/una

