



Bratislava, 20. septembra 2019
Naša značka: 11962/2019-3052-54394
Ref. číslo: bio/2067/O/19/RM
Opravené dňa: 20. septembra 2019

ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti číslo BC-JF014120-71 žiadateľa BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o., Moyzesova č. 50, 984 01 Lučenec, Slovensko zo dňa 18.12.2014 o obnovu autorizácie číslo 2012/14569/12986/SK/MA/21686 podľa čl. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu (ďalej len „nariadenie o obnovách“) rozhodlo tak, že

obnovuje autorizáciu biocídneho výrobku

Názov biocídneho výrobku: **Protect granule**
Číslo autorizácie biocídneho výrobku: **SK14-MRS-019**
Platnosť autorizácie do: **31. decembra 2022**

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu obnovy autorizácie biocídneho výrobku č. HU-2013-PA-14-00036-0000 platnej do 31.12.2022 vydané príslušným orgánom referenčného členského štátu Maďarsko dňa 02.08.2019,

a zároveň ruší rozhodnutie o autorizácii č. bio/242/O/14/R/2 zo dňa 17.03.2014 v znení rozhodnutia č. bio/644/O/16/RM o predĺžení platnosti a Dodatok k rozhodnutiu o autorizácii č. bio/2040/O/19/DM zo dňa 11.09.2019 a nahrádza ich týmto rozhodnutím o obnove autorizácie biocídneho výrobku,

a stanovuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocídnych výrobkov autorizovaných rozhodnutím o autorizácii č. bio/242/O/14/R/2 zo dňa 17.03.2014 v znení rozhodnutia č. bio/644/O/16/RM o predĺžení platnosti a Dodatok k rozhodnutiu o autorizácii č. bio/2040/O/19/DM zo dňa 11.09.2019 pod pôvodným autorizačným číslom 2012/14569/12986/SK/MA/21686 na trhu do 20.12.2019 a ďalšiu lehotu na ich použitie do 20.03.2020 v súlade s príslušnou legislatívou a za podmienky, že výrobok je klasifikovaný v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/1179.

Odôvodnenie:

Žiadateľ BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o., Moyzesova č. 50, 984 01 Lučenec, Slovensko doručení žiadosti číslo BC-JF014120-71 zo dňa 18.12.2014 prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (ďalej len „R4BP“) v súlade s čl. 71 nariadenia o biocídnych výrobkoch a na základe nariadenia o obnovách požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) ako príslušný orgán dotknutého členského štátu o obnovu autorizácie biocídneho výrobku udelenej vzájomným uznaním vnútroštátnej autorizácie pod číslom autorizácie 2012/14569/12986/SK/MA/21686.

Príslušný orgán referenčného členského štátu Maďarsko v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku obnovil autorizáciu dňa 02.08.2019 pod číslom HU-2013-PA-14-00036-0000 s platnosťou do 31.12.2022.

Preskúmaním žiadostí MH SR zistilo, že žiadosť o obnovu spĺňa požiadavky ustanovené nariadením o obnovách, a že zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku je v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku.

Príloha 1

Bratislava, 20. septembra 2019
Naša značka: 11962/2019-3052-54394
Ref. číslo: bio/2067/O/19/RM

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Výrobok

Názov výrobku	Protect granule
Obchodný názov výrobku	PROTECT granule na myši a potkany

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Meno	BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.
	Adresa	Moyzesova č. 50, 984 01 Lučenec, Slovensko
Číslo autorizácie	SK14-MRS-019	
<i>R4BP žiadosť o obnovu autorizácie č.</i>	BC-JF014120-71	
Dátum obnovy autorizácie	20. septembra 2019	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	31. decembra 2022	

1.3. Výrobca výrobku

Názov výrobcu	Babolna Bio Ltd
Adresa výrobcu	Szállás utca 6, 1107 Budapest, Maďarsko
Miesto výrobných priestorov	Köves J út 1-3, 2943 Bábolna, Maďarsko

1.4. Výrobca účinnej látky

Účinná látka	Bromadiolón
Názov výrobcu	Dr Tezza
Adresa výrobcu	Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio, Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio, Taliansko

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Bromadiolón	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Účinná látka	28772-56-7	249-205-9	0.0027

2.2. Typ úpravy

RB - Návnada (na priame použitie)

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Bezpečnostné upozornenia	P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P280 Noste ochranné rukavice. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi požiadavkami.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Myš domová – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Mus musculus</i> - myš domová - mláďatá a dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	aplikácia návnady Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Tácky: 1 tácka obsahujúca 75 g alebo 90 g návnady na deratizačnú staničku. Filtrovaný papier alebo plastové vrečko: 20 až 100 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5m.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Plastová tácka s aromapriepustným obalom (filtrovaný papier) obsahujúca 75, 90, 125, alebo 150g návnady, balené po 1-2 ks táčok v kartónovom obale alebo plastovom vrečku. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Sáčky z filtrovaného papiera obsahujúce 10, 20, 25, alebo 50g návnady, balené v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Sáčky z filtrovaného papiera obsahujúce 20, 25g návnady, 2 sáčky v plastovej deratizačnej staničke, 1-2 ks staničiek v kartónovom obale. Plastové vrečko alebo sáčok z filtrovaného papiera obsahujúci 50, 100, 150g návnady v kartónovej krabici, v plastovom vrečku alebo v kovovej krabici. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Plastové vrečko obsahujúce 100 alebo 150g návnady v kartónovej krabici. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Plastové vrečko obsahujúce 50, 100 alebo 150g návnady (jednorazová dávka). Maximálna hmotnosť balenia je 150g.

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni v prípade myší na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Potkany – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Rattus norvegicus</i> - potkan hnedý - mláďatá a dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	aplikácia návnady Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Tácky: 1 tácka obsahujúca 150 g návnady alebo 2 tácky obsahujúce 75, 90 g návnady na deratizačnú staničku. Filtračný papier alebo plastové vrečko: 150 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 7m (v prípade veľkého zamorenia) až 10m (v prípade nízkého zamorenia).
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Plastová tácka s aromapriepustným obalom (filtračný papier) obsahujúca 75, 90, 125, alebo 150g návnady, balené po 1-2 ks táčok v kartónovom obale alebo plastovom vrečku. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Sáčky z filtračného papiera obsahujúce 10, 20, 25, alebo 50g návnady, balené v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Sáčky z filtračného papiera obsahujúce 20, 25g návnady, 2 sáčky v plastovej deratizačnej staničke, 1-2 ks staničiek v kartónovom obale. Plastové vrečko alebo sáčok z filtračného papiera obsahujúci 50, 100, 150g

	návnady v kartónovej krabici, v plastovom vrečku alebo v kovovej krabici. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Plastové vrečko obsahujúce 100 alebo 150g návnady v kartónovej krabici. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Plastové vrečko obsahujúce 50, 100 alebo 150g návnady (jednorazová dávka). Maximálna hmotnosť balenia je 150g.
--	--

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej len každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.3. Opis použitia

Použitie 3 – Potkany – široká verejnosť – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Rattus norvegicus</i> - potkan hnedý - mláďatá a dospelé jedince
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	aplikácia návnady Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii,
Dávkovanie a frekvencia	Tácky: 1 tácka obsahujúca 150 g návnady alebo 2 tácky obsahujúce 75, 90 g návnady na deratizačnú staničku. Filtračný papier alebo plastové vrečko: 150 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 7m (v prípade veľkého zamorenia) až 10m (v prípade nízkeho zamorenia).
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál	Plastová tácka s aromapriepustným obalom (filtračný papier) obsahujúca 75, 90, 125, alebo 150g návnady, balené po 1-2 ks táčok v kartónovom obale alebo plastovom vrecku. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Sáčky z filtračného papiera obsahujúce 10, 20, 25, alebo 50g návnady, balené v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Sáčky z filtračného papiera obsahujúce 20, 25g návnady, 2 sáčky v plastovej deratizačnej staničke, 1-2 ks staničiek v kartónovom obale. Plastové vrecko alebo sáčok z filtračného papiera obsahujúci 50, 100, 150g návnady v kartónovej krabici, v plastovom vrecku alebo v kovovej krabici. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Plastové vrecko obsahujúce 100 alebo 150g návnady v kartónovej krabici. Maximálna hmotnosť balenia je 150g. Plastové vrecko obsahujúce 50, 100 alebo 150g návnady (jednorazová dávka). Maximálna hmotnosť balenia je 150g.
-------------------------------------	---

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.3.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.4. Opis použitia

Použitie 4 – Myš domová – profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Mus musculus</i> - myš domová - mláďatá a dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	aplikácia návnady Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči

	manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Voľná návnada: 50 – 100g návnady na deratizačnú staničku. Tácky: 1 tácka obsahujúca 75 alebo 90g na deratizačnú staničku. Vrečko z filtračného papiera: 20-100 návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5m.
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosť balenia a obalový materiál	Plastová tácka s aromapriepustným obalom (filtračný papier) obsahujúca 75, 90, 125, 150 alebo 175g návnady, balená v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 20kg. Sáčky z filtračného papiera obsahujúce 20, 25, alebo 50g návnady, balené v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 20kg. Voľná návnada v plastovom vedre: maximálne 20kg. Voľná návnada v kartónovom sude: maximálne 30kg. Voľná návnada v plastových sáčkoch v kartónovom obale: maximálne 25kg. Voľná návnada v papierovom vrecí: maximálne 25kg.

4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.5. Opis použitia

Použitie 5 – Potkany – profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Rattus norvegicus</i> - potkan hnedý - mláďatá a dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	aplikácia návnady

	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Voľná návnada: 200 – 250g návnady na deratizačnú staničku. Tácky: 1 tácka obsahujúca 125g, 150g alebo 175g návnady alebo 2 tácky obsahujúce 75g alebo 100g návnady na deratizačnú staničku. Vrečko z filtračného papiera: 200 - 250g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 7m (v prípade veľkého zamorenia) až 10m (v prípade nízkeho zamorenia).
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Plastová tácka s aromapriepustným obalom (filtračný papier) obsahujúca 75, 90, 125, 150 alebo 175g návnady, balená v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 20kg. Sáčky z filtračného papiera obsahujúce 20, 25, alebo 50g návnady, balené v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 20kg. Voľná návnada v plastovom vedre: maximálne 20kg. Voľná návnada v kartónovom sude: maximálne 30kg. Voľná návnada v plastových sáčkoch v kartónovom obale: maximálne 25kg. Voľná návnada v papierovom vreci: maximálne 25kg.

4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov.

V prípade potreby doplňte návnadu.

4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.6. Opis použitia

Použitie 6 – Myš domová a potkany – profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Rattus norvegicus</i> - potkan hnedý - mláďatá a dospelé jedince <i>Mus musculus</i> - myš domová - mláďatá a dospelé jedince

Oblasť použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	aplikácia návnady Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Myš domová: Voľná návnada: 50 – 100g návnady na deratizačnú staničku. Tácky: 1 tácka obsahujúca 75 alebo 90g na deratizačnú staničku. Vrečko z filtračného papiera: 20-100 návnady na deratizačnú staničku. Potkany: Voľná návnada: 200 – 240g návnady na deratizačnú staničku. Tácky: 1 tácka obsahujúca 125g, 150g alebo 175g návnady alebo 2 tácky obsahujúce 75g alebo 100g návnady na deratizačnú staničku. Vrečko z filtračného papiera: 200 - 240g návnady na deratizačnú staničku. Myši: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5m. Potkany: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 7m (v prípade veľkého zamorenia) až 10m (v prípade nízkeho zamorenia).
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Plastová tácka s aromapriepustným obalom (filtračný papier) obsahujúca 75, 90, 125, 150 alebo 175g návnady, balená v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 20kg. Sáčky z filtračného papiera obsahujúce 20, 25, alebo 50g návnady, balené v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 20kg. Voľná návnada v plastovom vedre: maximálne 20kg. Voľná návnada v kartónovom sude: maximálne 30kg. Voľná návnada v plastových sáčkoch v kartónovom obale: maximálne 25kg. Voľná návnada v papierovom vreci: maximálne 25kg.

4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni v prípade myši a len každých 5 až 7 dní v prípade potkanov na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu. Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

4.6.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

4.6.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.6.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

-

4.7. Opis použitia

Použitie 7 – Myš domová a potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Rattus norvegicus</i> - potkan hnedý - mláďatá a dospelé jedince <i>Mus musculus</i> - myš domová - mláďatá a dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	aplikácia návnady Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii alebo zakryté a chránené miesta s návnadou (v prípade ak poskytujú rovnaký stupeň ochrany necieľových druhov a ľudí ako deratizačné staničky).
Dávkovanie a frekvencia	Myš domová: Voľná návnada: 50 – 100g návnady na deratizačnú staničku. Tácky: 1 tácka obsahujúca 75 alebo 90g na deratizačnú staničku. Vrečko z filtračného papiera: 20-100 návnady na deratizačnú staničku. Potkany: Voľná návnada: 200 – 240g návnady na deratizačnú staničku. Tácky: 1 tácka obsahujúca 125g, 150g alebo 175g návnady alebo 2 tácky obsahujúce 75g alebo 100g návnady na deratizačnú staničku. Vrečko z filtračného papiera: 200 - 250g návnady na deratizačnú staničku. Trvalé návnady: 50 – 250g návnady na miesto s návnadou.
Kategória používateľov	Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Plastová tácka s aromapriepustným obalom (filtračný papier) obsahujúca 75, 90, 125, 150 alebo 175g návnady, balená v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 20kg. Sáčky z filtračného papiera obsahujúce 20, 25, alebo 50g návnady, balené v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 20kg. Voľná návnada v plastovom vedre: maximálne 20kg. Voľná návnada v kartónovom sude: maximálne 30kg. Voľná návnada v plastových sáčkoch v kartónovom obale: maximálne 25kg. Voľná návnada v papierovom vreci: maximálne 25kg.

4.7.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Trvalé umiestnenie návnad: Keď to je možné, odporúča sa, aby sa ošetrovaná oblasť skontrolovala najmenej každé 4 týždne, aby sa predišlo selekcii rezistentnej populácie.

4.7.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezáúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hľadavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Výrobok sa môže používať na trvalé ošetrenie iba na miestach s vysokým potenciálom pre inváziu hlodavcov,

ak sa iné metódy kontroly ukázali ako nedostatočné.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Trvalé umiestnenie návnad: Trvalé umiestnenie návnad je striktno obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opätovnej invázie, keď sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné.

Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opätovné zamorenie.

4.7.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.7.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

-

4.7.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

-

4.8. Opis použitia

Použitie 8 – Myš domová a potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Rattus norvegicus</i> - potkan hnedý - mláďatá a dospelé jedince <i>Mus musculus</i> - myš domová - mláďatá a dospelé jedince
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	aplikácia návnady Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii alebo zakryté a chránené miesta s návnadou (v prípade ak poskytujú rovnaký stupeň ochrany necieľových druhov a ľudí ako deratizačné staničky).
Dávkovanie a frekvencia	Myš domová: Voľná návnada: 50 – 100g návnady na deratizačnú staničku. Tácky: 1 tácka obsahujúca 75 alebo 90g na deratizačnú staničku. Vrečko z filtračného papiera: 20-100 návnady na deratizačnú staničku. Potkany: Voľná návnada: 200 – 250g návnady na deratizačnú staničku. Tácky: 1 tácka obsahujúca 125g, 150g alebo 175g návnady alebo 2 tácky obsahujúce 75g alebo 100g návnady na deratizačnú staničku. Vrečko z filtračného papiera: 200 - 250g návnady na deratizačnú staničku. Trvalé návnady: 50 – 250g návnady na návnadové miesto.
Kategória používateľov	Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Plastová tácka s aromapriepustným obalom (filtračný papier) obsahujúca 75, 90, 125, 150 alebo 175g návnady, balená v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 20kg. Sáčky z filtračného papiera obsahujúce 20, 25, alebo 50g návnady, balené v kartónovom obale. Maximálna hmotnosť balenia je 20kg. Voľná návnada v plastovom vedre: maximálne 20kg. Voľná návnada v kartónovom sude: maximálne 30kg.

	Voľná návnada v plastových sáčkoch v kartónovom obale: maximálne 25kg. Voľná návnada v papierovom vreci: maximálne 25kg.
--	---

4.8.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Trvalé umiestnenie návnad: Keď to je možné, odporúča sa, aby sa ošetrovaná oblasť skontrolovala najmenej každé 4 týždne, aby sa predišlo selekcii rezistentnej populácie.

Pre použitie v krytých a chránených nástrahových miestach: Pri vonkajšom použití musia byť nástrahy zakryté a umiestnené na strategických miestach, aby sa minimalizovala expozícia necielených živočíchov.

4.8.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce.

Výrobok sa môže používať na trvalé ošetrenie iba na miestach s vysokým potenciálom pre inváziu hlodavcov, ak sa iné metódy kontroly ukázali ako nedostatočné.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Trvalé umiestnenie návnad: Trvalé umiestnenie návnad je striktné obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opätovnej invázie, keď sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné.

Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opätovné zamorenie.

4.8.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.8.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.8.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

5.1. Pokyny na používanie

Široká verejnosť:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné stanice by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita

hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelech, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

Návnady vo filtračnom papieri: Neotvárajte vrecúška s návnadou.

Profesionáli a vyškolení profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelech, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozri oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtiahnuť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ povolenia v informáciách o výrobku).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Frekvencia prezerania deratizovanej oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uváženie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie. Táto frekvencia by mala byť v súlade s odporúčaniami príslušného kódexu osvedčených postupov.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, ak je dostupný, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok

Návnady vo filtračnom papieri: Neotvárajte vrecúška s návnadou.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Široká verejnosť:

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo

na zisťovanie aktivity hlodavcov).

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- Výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“),
- Používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

Profesionáli a vyškolení profesionáli:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby o deratizácii hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie (pokiaľ nie je autorizované trvalé umiestnenie návnady).

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie. Na striedavé použitie zväzťe použitie neantikoagulantného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi aplikáciami neumývajte vodou stanice na návnadu ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrýtych a chránených miestach s návnadou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami

Pre balenia určené aplikáciou odborne spôsobilej osoby (voľná návnada): Pri presýpaní výrobku noste vhodný (jednorazový) respirátor.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce ďasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym alebo veterinárnym personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom
- zasiahnutia očí vždy skontrolujte a vyberte kontaktné šošovky, vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút
- orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí.

Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. V prípade potreby kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel. č.: 02/547 741 66. Ak výrobok prehltnie domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody volajte Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel. č.: 02/547 741 66“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami.

Odporúča sa používanie ochranných rukavíc.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajú na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady.

Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

- koniec dokumentu -