

# Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

**Denumirea produsului:** Vebitox Dife Block

**Tipul (tipurile) de produs (produse):** TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

**Numărul curent:** RO/2019/0149/MRA/IT/2012/00043/AUT

**Numărul curent R4BP 3:** RO-0016697-0000

## Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Frazе de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	16
5.1. Instrucțiuni de utilizare	16
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	17
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	18
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	18
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	18
6. Alte informații	19

## Informații administrative

### 1.1. Denumirea comercială a produsului

Murin Dife Block
Vebitox Dife Block

### 1.2. Detinatorul autorizației

<b>Numele și adresa detinatorului autorizației</b>	Numele	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	Adresa	via Desman, 43 35010 Borgoricco Italia
<b>Numărul curent</b>	RO/2019/0149/MRA/IT/2012/00043/AUT	
<b>Numărul curent R4BP 3</b>	RO-0016697-0000	
<b>Data autorizației</b>	20/06/2012	
<b>Data de expirare a autorizației</b>	01/07/2024	

### 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

<b>Numele producatorului</b>	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
<b>Adresa producătorului</b>	via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Italia
<b>Adresa locurilor de producție</b>	Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 35010 Borgoricco (PD) Italia

### 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

<b>Substanța activă</b>	26 - Difenacum
<b>Numele producătorului</b>	Activa Srl
<b>Adresa producătorului</b>	Via Feltre 32 20132 Milan Italia
<b>Adresa locurilor de producție</b>	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italia

## 2. Compoziția și formularea produsului

### 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Difenacum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	Substanța activă	56073-07-5	259-978-4	0,005

### 2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)
-------------------------------

## 3. Fraze de pericol și de precauție

<b>Fraze de pericol</b>	<p>Poate dăuna fătului.</p> <p>Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.</p>
<b>Fraze de precauție</b>	<p>A nu se lăsa la îndemâna copiilor.</p> <p>A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.</p> <p>Purtați mănuși de protecție.</p> <p>ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.</p> <p>Aruncați conținutul la în conformitate cu legislația națională.</p>

## 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

### 4.1 Modul de utilizare

#### Utilizarea 1 - Șoareci de casă - specialiști - la interior

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Inaplicabil pentru rodenticide
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: Adulți
<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior  la interior
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată:  Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Frecvența de aplicare: 40g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri.
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	industrial  profesional
<b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>	Bloc de momeală de 10 g și 20 g Dimensiuni pachet: de la 1,5 la 25 de kg În cazul pachetelor de peste 10 kg, este obligatorie ambalarea în pungi separate de maxim 5 sau 10 kg  Materiale de ambalare: - plic, plastic: coextrudat/ PEID/polietilenă - plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 - Plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 - Conservă/Tablă, hârtie, carton, - Cutie, hârtie, carton cu plicuri de plastic coextrudat/ PEID/polietilenă - Găleată: PEID

#### 4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează cel puțin o dată la 2-3 zile la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

#### 4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

#### 4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

#### 4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Perioadă de valabilitate: 24 de luni

### 4.2 Modul de utilizare

#### Utilizarea 2 - șobolani - specialiști - La interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Adulți  denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: Adulți

<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior  La interior
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliata:  Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Frecvența de aplicare: 60-100g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri.
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	industrial  profesional
<b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>	Bloc de momeală de 10 g și 20 g Dimensiuni pachet: de la 1,5 la 25 de kg În cazul pachetelor de peste 10 kg, este obligatorie ambalarea în pungi separate de maxim 5 sau 10 kg  Materiale de ambalare: - plic, plastic: coextrudat/ PEID/polietilenă - plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE40 - Plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 - Conservă/Tablă, hârtie, carton, - Cutie, hârtie, carton cu plicuri de plastic coextrudat/ PEID/polietilenă - Găleată: PEID

#### 4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

#### 4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

#### 4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

#### 4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Perioadă de valabilitate: 24 de luni

### 4.3 Modul de utilizare

#### Utilizarea 3 - Șoareci de casă și șobolani – specialiști – la exterior, în jurul clădirilor

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Inaplicabil pentru rodenticide
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: Adulți  denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Adulți  denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: Adulți
<b>Domeniul de utilizare</b>	în aer liber  la exterior, în jurul clădirilor  Metoda: cerere momeală



<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	<p>Descriere detaliata:</p> <p>Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.</p>
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	<p>Frecvența de aplicare: Șoareci de casă: 40g de momeală per capcană. șobolani: 60-100g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri.</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul și calendarul de aplicare:</p> <p>Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri.</p>
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	<p>industrial</p> <p>profesional</p>
<b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>	<p>Bloc de momeală de 10 g și 20 g</p> <p>Dimensiuni pachet: de la 1,5 la 25 de kg</p> <p>În cazul pachetelor de peste 10 kg, este obligatorie ambalarea în pungi separate de maxim 5 sau 10 kg</p> <p>Materiale de ambalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plic, plastic: coextrudat/ PEID/polietilenă</li> <li>- plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE40</li> <li>- Plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60</li> <li>- Conservă/Tablă, hârtie, carton,</li> <li>- Cutie, hârtie, carton cu plicuri de plastic coextrudat/ PEID/polietilenă</li> <li>- Găleată: PEID</li> </ul>

#### 4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de intemperii (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.
- Capcanele se inspectează [în cazul șoarecilor – cel puțin o dată la 2-3 zile la] [în cazul șobolanilor – numai după 5-7 zile de la] începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.
- Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

#### 4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu introduceți produsul direct în vizuini.

#### 4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

--

#### 4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Perioadă de valabilitate: 24 de luni
--------------------------------------

#### 4.4 Modul de utilizare

##### Utilizarea 4 - Șoareci de casă și șobolani – experți - la interior

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Inaplicabil pentru rodenticide
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: Adulți  denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: Adulți  denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Adulți
<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior  la interior
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată:  Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării sau puncte de momeală acoperite și protejate, atât timp cât asigură același nivel de protecție a speciilor nevizate și persoanelor ca stațiile de intoxicare rezistente la modificări neautorizate.

## Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Șobolani: - Infestare majoră: 60-100 g de momeală per capcană.  
- Infestare redusă: 40-60 g de momeală per capcană. Șoareci: 40 g de momeală per capcană. Amplasarea de momeli permanente 60-100 g de momeală per capcană  
Diluare (%): 0  
Numărul și calendarul de aplicare:

### Șobolani:

- Infestare majoră: 60-100 g de momeală per capcană.
- Infestare redusă: 40-60 g de momeală per capcană.

### Șoareci:

- 40 g de momeală per capcană.

Amplasarea de momeli permanente 60-100 g de momeală per capcană

## Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

## Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Bloc de momeală de 10 g și 20 g  
Dimensiuni pachet: de la 1,5 la 25 de kg  
În cazul pachetelor de peste 10 kg, este obligatorie ambalarea în pungi separate de maxim 5 sau 10 kg

### Materiale de ambalare:

- plic, plastic: coextrudat/ PEID/polietilenă
- plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE40
- Plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- Conservă/Tablă, hârtie, carton,
- Cutie, hârtie, carton cu plicuri de plastic coextrudat/ PEID/polietilenă
- Găleată: PEID

### 4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.

În caz de utilizare în cadrul unui sistem de momire permanent:

- Atunci când este posibil, zona tratată trebuie să fie vizitată la intervale de cel mult patru săptămâni, pentru a evita dezvoltarea unei populații rezistente.
- Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

### 4.4.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor

- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.

- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform

recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant.

- Nu utilizați produsul pentru tratamente cu aplicare intermitentă a momelii.
- Produsele pot fi utilizate ca momeală permanentă numai în locurile cu potențial ridicat de reinfestare și atunci când alte metode de control s-au dovedit insuficiente.

În caz de utilizare în cadrul unui sistem de momire permanent:

- Amplasarea de momeli permanente este limitată exclusiv la locurile cu risc înalt de reinvadare, atunci când alte metode de combatere s-au dovedit insuficiente.
- Strategia de amplasare a momelilor permanente trebuie să fie reexaminată periodic, în contextul sistemului de combatere integrată a dăunătorilor și al evaluării riscului de reinfestare.

#### 4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

#### 4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Perioadă de valabilitate: 24 de luni

### 4.5 Modul de utilizare

#### Utilizarea 5 - Șoareci de casă și șobolani – experți – la exterior, în jurul clădirilor

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: Adulți  denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: Adulți  denumirea științifică: Rattus norvegicus

denumirea comună: Brown rat  
etapă de dezvoltare: Minori

denumirea științifică: Rattus norvegicus  
denumirea comună: Brown rat  
etapă de dezvoltare: Adulți

**Domeniul de utilizare**

în aer liber  
  
la exterior, în jurul clădirilor

**Metoda (metodele) de aplicare**

Metoda: cerere momeală  
Descriere detaliată:  
  
Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării sau puncte de momeală acoperite și protejate, atât timp cât asigură același nivel de protecție a speciilor nevizate și persoanelor ca stațiile de intoxicare rezistente la modificări neautorizate.

**Doza (dozele) și frecvența de aplicare**

Frecvența de aplicare: Șobolani: - Infestare majoră: 60-100 g de momeală per capcană.  
- Infestare redusă: 40-60 g de momeală per capcană. Șoareci: 40 g de momeală per capcană. Amplasarea de momeli permanente 60-100 g de momeală per capcană  
Diluare (%): 0  
Numărul și calendarul de aplicare:

Șobolani:

- Infestare majoră: 60-100 g de momeală per capcană.
- Infestare redusă: 40-60 g de momeală per capcană.

Șoareci:

- 40 g de momeală per capcană.

Amplasarea de momeli permanente 60-100 g de momeală per capcană

**Categoria (categoriile) de utilizatori**

instruiți profesional

**Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare**

Bloc de momeală de 10 și 20 g  
Dimensiuni pachet: de la 1,5 la 25 de kg  
În cazul pachetelor de peste 10 kg, este obligatorie ambalarea în pungi separate de maxim 5 sau 10 kg

Materiale de ambalare:

- plic, plastic: coextrudat/ PEID/polietilenă
- plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE40
- Plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- Conservă/Tablă, hârtie, carton,
- Cutie, hârtie, carton cu plicuri de plastic coextrudat/ PEID/polietilenă
- Găleată: PEID

#### 4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.

În caz de utilizare în cadrul unui sistem de momire permanent:

- Amplasarea de momeli permanente este limitată exclusiv la locurile cu risc înalt de reinvadare, atunci când alte metode de combatere s-au dovedit insuficiente.
- Strategia de amplasare a momelilor permanente trebuie să fie reexaminată periodic, în contextul sistemului de combatere integrată a dăunătorilor și al evaluării riscului de reinfestare.

Utilizare în stații de intoxicare acoperite și protejate:

- În caz de utilizare externă, stațiile de intoxicare trebuie să fie acoperite și plasate în locuri strategice, pentru a reduce la minim riscul de expunere a speciilor nevizate.
- Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

#### 4.5.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor
- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.
- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant.

- Nu utilizați produsul pentru tratamente cu aplicare intermitentă a momelii.
- Nu introduceți produsul direct în vizuini.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.

- Produsele pot fi utilizate ca momeală permanentă numai în locurile cu potențial ridicat de reinfestare și atunci când alte metode de control s-au dovedit insuficiente. În caz de utilizare în cadrul unui sistem de momire permanent:

- Amplasarea de momeli permanente este limitată exclusiv la locurile cu risc înalt de reinvadare, atunci când alte metode de combatere s-au dovedit insuficiente.
- Strategia de amplasare a momelilor permanente trebuie să fie reexaminată periodic, în contextul sistemului de combatere integrată a dăunătorilor și al evaluării riscului de reinfestare.

#### 4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de

irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

#### 4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Perioadă de valabilitate: 24 de luni

### 4.6 Modul de utilizare

#### Utilizarea 6 - Șobolani – experți – zone exterioare deschise

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Inaplicabil pentru rodenticide
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Rattus rattus denumirea comună: Roof rat etapă de dezvoltare: Adulți  denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Minori  denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: Adulți
<b>Domeniul de utilizare</b>	în aer liber  în aer liber zone exterioare deschise
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată:  Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării sau puncte de momeală acoperite și protejate, atât timp cât asigură același nivel de protecție a speciilor nevizate și persoanelor ca stațiile de intoxicare rezistente la modificări neautorizate.
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Frecvența de aplicare: Șobolani: - Infestare majoră: 60-100 g de momeală per capcană. - Infestare redusă: 40-60 g de momeală per capcană. Șoareci: 40 g de momeală per capcană. Amplasarea de momeli permanente 60-100 g de momeală per capcană

	<p>Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare:</p> <p>Șobolani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infestare majoră: 60-100 g de momeală per capcană.</li> <li>- Infestare redusă: 40-60 g de momeală per capcană.</li> </ul> <p>Șoareci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 g de momeală per capcană.</li> </ul> <p>Amplasarea de momeli permanente 60-100 g de momeală per capcană</p>
<p><b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b></p>	<p>instruiți profesional</p>
<p><b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b></p>	<p>Bloc de momeală de 10 și 20 g Dimensiuni pachet: de la 1,5 la 25 de kg În cazul pachetelor de peste 10 kg, este obligatorie ambalarea în pungi separate de maxim 5 sau 10 kg</p> <p>Materiale de ambalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plic, plastic: coextrudat/ PEID/polietilenă</li> <li>- plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE40</li> <li>- Plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60</li> <li>- Conservă/Tablă, hârtie, carton,</li> <li>- Cutie, hârtie, carton cu plicuri de plastic coextrudat/ PEID/polietilenă</li> <li>- Găleată: PEID</li> </ul>

#### 4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament. Protejați momeala împotriva condițiilor atmosferice. Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.</li> </ul> <p><i>În caz de utilizare în cadrul unui sistem de momire permanent</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atunci când este posibil, zona tratată trebuie să fie vizitată la intervale de cel mult patru săptămâni, pentru a evita dezvoltarea unei populații rezistente.</li> <li>- Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.</li> </ul>
---



Utilizare în stații de intoxicare acoperite și protejate:

- În caz de utilizare externă, stațiile de intoxicare trebuie să fie acoperite și plasate în locuri strategice, pentru a reduce la minim riscul de expunere a speciilor nevizate.

- Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

#### 4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor

- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.

- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant.

- Nu utilizați produsul pentru tratamente cu aplicare intermitentă a momelii.

- Nu introduceți produsul direct în vizuini.

- Produsele pot fi utilizate ca momeală permanentă numai în locurile cu potențial ridicat de reinfestare și atunci când alte metode de control s-au dovedit insuficiente.

În caz de utilizare în cadrul unui sistem de momire permanent:

- Amplasarea de momeli permanente este limitată exclusiv la locurile cu risc înalt de reinvadare, atunci când alte metode de combatere s-au dovedit insuficiente.

- Strategia de amplasare a momelilor permanente trebuie să fie reexaminată periodic, în contextul sistemului de combatere integrată a dăunătorilor și al evaluării riscului de reinfestare.

#### 4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

#### 4.6.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Perioadă de valabilitate: 24 de luni

## **5. Direcții generale de utilizare**

### **5.1. Instrucțiuni de utilizare**

- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.
- Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării.
- Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (de exemplu, boabe de cereale vărsate sau resturi de mâncare). Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.
- Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor, care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și, atunci când este posibil, metode fizice de combatere.
- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.
- Produsul trebuie să fie amplasat în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezența rozătoarelor (de exemplu, căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).
- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri.
- Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind conținutul de rodenticide și interzicerea mutării sau a deschiderii acestora (a se vedea punctul 5.3 privind informațiile care se înscriu pe etichetă).
- Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismente privind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicare.
- Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.
- Amplasați produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizate.
- Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele aflate în contact cu acestea.
- Manipulați produsul numai cu mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice (UNI EN 374)
- Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului. După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea direct expusă.
- Frecvența vizitelor în zona tratată rămâne la discreția operatorului, în funcție de rezultatele studiului efectuat la începutul perioadei de tratament. Această frecvență trebuie să fie conformă cu recomandările cuprinse în codul de bune practici relevant.
- Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în alte locuri și o eventuală schimbare a formulei momelii.
- Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situații. Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Luați în considerare și utilizarea de curse, ca măsură de combatere alternativă.
- Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.

## 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor
- Informațiile despre produs (eticheta și/sau prospectul) trebuie să specifice în mod clar că produsul se furnizează exclusiv utilizatorilor experți, posesori ai unor certificări care să ateste îndeplinirea cerințelor de formare aplicabile (de exemplu, „numai pentru experți”).
- A nu se utiliza în zone în care poate fi suspectată o rezistență la substanța activă.
- Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului (dacă produsele nu sunt utilizate în cadrul unui sistem de momire permanent)
- Nu utilizați prin rotație anticoagulanți diferiți, cu potență comparabilă sau mai mică, în scopul gestionării rezistenței. Pentru utilizarea prin rotație, analizați posibilitatea folosirii unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui anticoagulant cu potență mai mare.
- Între aplicări, nu spălați cu apă capcanele sau ustensilele folosite în capcane acoperite și protejate.
- Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.

### 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale.
- În cazuri severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau în urină.
- Antidot: vitamina K1, administrată numai de personal medical/veterinar.
- În caz de:
  - expunere cutanată, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.
  - expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.
  - expunere orală, clătiți atent gura cu apă.
- Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente.
- Nu provocați vomă.
- În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului.
- Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie.
- Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „a nu se muta sau deschide”; „conține un produs rodenticid”; „denumirea produsului sau numărul de autorizare”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică”.
- Periculos pentru animalele sălbatice.

### 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

- La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale

### 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

- A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.
- A se păstra în locuri unde nu au acces copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.
- Perioadă de valabilitate: 2 ani

## 6. Alte informații

- Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii.
  - Rozătoarele pot fi purtătoare de boli.
- Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați.
- Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.