

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2022/0333/MRS/HU-2013-PA-14-00047-0000**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **11.04.2022**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : **UNGARIA**
- Nr. Autorizatiei din statul membru emitent: **HU-2013-PA-14-00047-0000**

II. Data emiterii autorizatiei : 09.05.2022**III. Data expirării autorizatiei : 31.12.2022****IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: GRANOKETT RODENTICID GRANULAT**Alte denumiri : **GRANOKETT RODENTICIDE ; GRANOKETT RÁGCSÁLÓIRTÓ SZER; GRANOKETT RODENTICIDE****V.****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România:** Metatox Kft.

ADRESA : H-5520 Szeghalom, Kossuth u.8., Ungaria

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: METATOX PESZTICID GYÁRTÓ

ADRESA : H-5520 Szeghalom, Kossuth u.8., Ungaria

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: Metatox Peszticid Gyártó-, és Forgalmazó Kft.

ADRESA : H-5520 Szeghalom, Kossuth u.8., Ungaria

LOC DE PRODUCTIE : H-5520 Szeghalom, Kossuth u.8., Ungaria

NUMELE FABRICANTULUI DE SUBSTANTA ACTIVA: (Bromadiolone)

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**PELGAR INTERNATIONAL LTD.**


ADRESA: Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants United Kingdom

LOC DE PRODUCTIE : Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants United Kingdom

VI.**TIPUL DE PRODUS:** Tip 14 (Rodenticid)**VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI:** profesional/ profesionali instruiti**VIII.****TIPUL PREPARATULUI :** este o momeală gata de utilizare sub forma de pelete**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanta activă***a) substante chimice*

Denumire comuna	<i>Bromadiolone</i>
Denumirea IUPAC	<i>3-[3-[4-(4-Bromophenyl)phenyl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-2-hydroxychromen-4-one</i>
Numar CAS	28772-56-7
Numar CE	249-205-9
Continut de substantă activă	0,005%

2) Substanta inactivă/nonactivă-neprecizata**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****A. Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice***

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS08 Atenție
Fraze de risc H	H360D Poate dauna fatului. H372 Provoacă leziuni ale sângelui prin expunere prelungită sau repetată
Fraze de prudență P	P102 A nu se lasa la indemana copiilor. P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P270A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a feței (mască respiratorie) P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau posibilă expunere: consultați medicul. P501 Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu reglementările naționale (a se preciza).



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



XI. AMBALAREA

- Utilizarea nr. 1 – Șoareci de casă – profesioniști – la interior

Momeală în plicuri individuale de 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, ambalate în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;

Momeală în plicuri individuale de 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, ambalate în cutie de carton de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în cutie de carton de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în sac de plastic de 20 kg, 25 kg și 50 kg.

- Utilizarea nr. 2 – Șobolani – profesioniști – la interior

Momeală în plicuri individuale de 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, ambalate în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;

Momeală în plicuri individuale de 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, ambalate în cutie de carton de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în cutie de carton de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în sac de plastic de 20 kg, 25 kg și 50 kg.

- Utilizarea nr. 3 – Șoareci de casă și/sau șobolani – specialiști – la exterior, în jurul clădirilor

Momeală în plicuri individuale de 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, ambalate în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;

Momeală în plicuri individuale de 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, ambalate în cutie de carton de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în cutie de carton de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în sac de plastic de 20 kg, 25 kg și 50 kg.

- Utilizarea nr. 4 - Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – la interior

Momeală în plicuri individuale de 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, ambalate în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;

Momeală în plicuri individuale de 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, ambalate în cutie de carton de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în cutie de carton de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în sac de plastic de 20 kg, 25 kg și 50 kg.

- Utilizarea nr. 5 - Șoareci și/sau șobolani – profesioniști instruiți – la exterior și în jurul clădirilor

Momeală în plicuri individuale de 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, ambalate în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;

Momeală în plicuri individuale de 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, ambalate în cutie de carton de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în cutie de carton de 3 kg și 5 kg;

Momeală cu pelete vrac ambalate în sac de plastic de 20 kg, 25 kg și 50 kg.



XII.

INSTRUCTIUNILE SI DOZELE DE APLICARE

Organisme țintă:

- **Șoarecele de casă** (*Mus musculus*),
- **Șobolanul cenușiu** (*Rattus norvegicus*).

Mod de acțiune: Ingerare

- **Șoarece de casă** (*Mus musculus*)-Concentrația - 20-30 gr momeală/stație de momeală la distanța de 3-5 metri. Timpul de acțiune: 4-10 zile de la aplicare
- **Șobolan cenușiu** (*Rattus norvegicus*)-Concentrația- 50-100 g momeală/ stație de momeală la distanța de 5-10 metri. Timpul de acțiune: 4-10 zile de la aplicare

Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.

Studiați și evaluați în prealabil zona infestată pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării.

Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (de exemplu: boabe de cereale vărsate sau resturi de mâncare.)

Pe lângă acestea, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.

Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și dacă este posibil metode fizice de combatere.

Produsul trebuie să fie amplasat în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezența rozătoarelor (de exemplu: căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.)

Dacă este posibil, capcanele trebuie fixate pe sol sau de alte structuri. Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare, privind conținutul de rodenticide și interzicerea mutării sau a deschiderii acestora.

Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie amplasate avertismente privind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicare.

Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.

Amplasați produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizate.

Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețe aflate în contact cu acestea.

În primele două săptămâni, stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2-3 zile pentru șoareci și la fiecare 5-7 zile pentru șobolani pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Înlocuiți momelile deteriorate, umede sau mușcate. Apoi verificați săptămânal stațiile de momeală.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Dacă asimilarea consumului momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în alte locuri.

Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situații.

Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel poate fi necesară

utilizarea unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Folosirea capcanelor mecanice se consideră o metodă alternativă de control.

Datorită efectului întârziat al agentului anticoagulant, moartea rozătoarelor este de așteptat să survină la 4-10 zile după consum.

După tratament, îndepărtați momeala rămasă și locurile de alimentare.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE :

- Se depozitează într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Se păstrează recipientul închis și departe de lumina directă a soarelui.
- Se depozitează în locuri în care nu au acces copii, păsările, animalele de companie și animalele de fermă.
- DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDE ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 2 ani

ALTE INFORMATII :

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

