

Resumen de las características del producto biocida

Nombre del producto: TX3 GEL

Tipo(s) de producto: TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Número de la autorización: ES/MR(NA)-2019-18-00665

R4BP 3 Número de referencia de activo: ES-0020341-0000

Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	2
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	2
2. Composición y formulación del producto	2
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	2
2.2. Tipo de formulación	3
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	3
4. Uso(s) autorizado(s)	3
5. Instrucciones generales de uso	12
5.1. Instrucciones de uso	12
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	12
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	12
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	12
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	13
6. Información adicional	13

Información administrativa

1.1. Nombre comercial del producto

TX3 GEL
KAPTER FLUOGEL
SKULD FLUOGEL
GEL LETAL LZ CUCARACHAS
PREBEN GEL CUCARACHAS IMD
Protect Home Gel Anti-Cucarachas
PESTNET Fluogel
BIOTOP GEL CUCARACHAS
LISTA GEL CUCARACHAS
CRISCOLOR PROTECT GEL CUCARACHAS
Blatogel cucarachas
Cucacida gel
IMI 215 gel cucarachas
KELT GEL CUCARACHAS
Rastrerogel cucarachas
Saturnia gel cucarachas
SKULD GEL
Tiranogel cucarachas
Vital plant gel cucarachas

1.2. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la autorización	Razón social	ZAPI S.p.A.
	Dirección	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italia
Número de la autorización	ES/MR(NA)-2019-18-00665	
R4BP 3 Número de referencia de activo	ES-0020341-0000	

Fecha de la autorización

05/11/2019

Fecha de vencimiento
de la autorización

31/12/2025

1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

Nombre del fabricante

Zapi S.p.A.

Dirección del fabricante

Via Terza Strada 12 35026 Conselve Italia

Ubicación de las plantas de
fabricación

Via Terza Strada 12 35026 Conselve Italia

1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa

37 - Imidacloprid

Nombre del fabricante

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Lista Artículo 95: ZAPI S.p.A.)

Dirección del fabricante

Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang China

Ubicación de las plantas de
fabricación

Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd. - Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province. China

2. Composición y formulación del producto

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Sustancia activa	138261-41-3	428-040-8	2,19

2.2. Tipo de formulación

RB-Cebo en gel (listo para su uso)

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.
Evitar su liberación al medio ambiente.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Recoger el vertido.
Eliminar el contenido en y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.(Público en General y Personal Profesional)
Eliminar el contenido en y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.(Profesional ESPECIALIZADO)

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1 Descripción de uso

Uso 1 - Uso # 1 – Interiores-cebo en gotas-público en general, personal profesional.

Tipo de producto

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

Insecticida listo para su uso contra cucarachas.

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Blattella germanica
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: adultos y ninfas

Nombre científico: Blatta orientalis
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: adultos y ninfas

Nombre científico: Supella longipalpa
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: adultos y ninfas

Nombre científico: Periplaneta americana
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: (adultos y ninfas)

Ámbito de utilización	<p>Interior</p> <p>Otro</p> <p>Interiores Grietas y rendijas.</p>
Método(s) de aplicación	<p>Método: Aplicación en cebo por gotitas. Descripción detallada: -</p>
Dosis y frecuencia de aplicación	<p>Tasa de aplicación: Consulte * Número y frecuencia de aplicación Dilución (%): - Número y frecuencia de aplicación: <u>Dosis:</u> Blattella germanica/Supella longipalpa: 1 - 3 gotas/m² Blatta orientalis/Periplaneta americana: 3 gotas/m²</p> <p>Una gota de 6-7mm de diámetro corresponde a 0.08 gramos de TX3 GEL. Se requiere la dosis más alta (3 gotas/m²) en caso de fuerte infestación de cucarachas, condiciones extremadamente sucias o donde las cucarachas oriental y americana predominen.</p> <p><u>Frecuencia de aplicación:</u> Verifique regularmente el consumo de TX3 GEL y reemplácelo cuando esté agotado. No aplicar más de una vez por semana.</p> <p>Efectivo hasta 3 meses después de la aplicación El control de la población se alcanza una semana después de la aplicación.</p>
Categoría(s) de usuarios	<p>Profesional</p> <p>Público en general (no profesional)</p>
Tamaños de los envases y material del envasado	<p>Cartuchos de PP/LDPE con 30, 31, 32, 33,34 o 35 gramos.</p> <p>Jeringuillas de LDPE/HDPE de 5 a 35 gramos (con incremento 1 gramo)</p> <p>Los cartuchos y jeringuillas están empaquetados en cajas, blíster o bolsas (cartón, plástico, aluminio) de 1 a 6 unidades.</p>

4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Aplicar el biocida en grietas y rendijas.
Aplique el biocida no más de una vez por semana.
Consultar también este punto en Instrucciones generales de uso

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida útil: 36 meses.
Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.2 Descripción de uso

Uso 2 - Uso # 2 – Interiores-cebo en gotas-Personal profesional especializado

Tipo de producto

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

Insecticida listo para su uso contra cucarachas.

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: *Blattella germanica*
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: adultos y ninfas

Nombre científico: *Blatta orientalis*
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: adultos y ninfas

Nombre científico: *Supella longipalpa*
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: adultos y ninfas

Nombre científico: *Periplaneta americana*
Nombre común: American Cockroach
Etapa de desarrollo: Adultos y ninfas

Ámbito de utilización	Interior Otro Interiores Grietas y rendijas.
Método(s) de aplicación	Método: Aplicación en cebo por gotitas Descripción detallada: -
Dosis y frecuencia de aplicación	<p>Tasa de aplicación: 3 gotas/m². Una gota de 6-7mm de diámetro corresponde a 0.08 gramos de TX3 GEL Dilución (%): - Número y frecuencia de aplicación:</p> <p>Dosis: Blattella germanica/Supella longipalpa: 1 - 3 gotas/m² Blatta orientalis/Periplaneta americana: 3 gotas/m² La dosis más alta (3 gotas/m²) se requiere en caso de fuerte infestación de cucarachas, condiciones de suciedad extrema o donde las cucarachas orientalis y americana predominen.</p> <p>Una gota de 6-7mm de diámetro corresponde a 0.08 gramos de TX3 GEL.</p> <p>Frecuencia de aplicación: Verifique regularmente el consumo de TX3 GEL y reemplácelo cuando esté agotado. No aplicar más de una vez por semana.</p> <p>Efectivo hasta 3 meses después de la aplicación. El control de la población se alcanza una semana después de la aplicación.</p>
Categoría(s) de usuarios	Profesional especializado
Tamaños de los envases y material del envasado	<p>Cartuchos de PP/LDPE con 30 a 35 gramos (con variación de 1 gramo)</p> <p>Jeringuillas de LDPE/HDPE de 5 a 35 gramos (con variación de 1 gramo)</p> <p>Los cartuchos y jeringuillas están empaquetados en cajas, blíster o bolsas (cartón, plástico, aluminio) de 1 a 24 unidades (con variación de 1 unidad)</p>

4.2.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Aplicar el biocida en grietas y rendijas.

Aplique el biocida no más de una vez por semana.

Adoptar métodos integrados de gestión de plagas, como la combinación de métodos químicos, de control físico y otras medidas de salud pública, teniendo en cuenta las especificidades locales (condiciones climáticas, especies objetivo, condiciones de uso, etc.).

Alterne productos que contienen sustancias activas con un modo de acción diferente (para eliminar individuos resistentes de la población).

Consultar también este punto en Instrucciones generales de uso

4.2.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Use guantes desechables durante la aplicación del biocida.
Consultar también este punto en Instrucciones generales de uso

4.2.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.2.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.2.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida útil: 36 meses.
Consultar también este punto en Instrucciones generales de uso

4.3 Descripción de uso

Uso 3 - Uso # 3 – Interiores-cebo en portacebos/trampas-público en general, personal profesional.

Tipo de producto

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

Insecticida listo para su uso contra cucarachas.

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Blattella germanica
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: adultos y ninfas

Nombre científico: Blatta orientalis
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: adultos y ninfas

Ámbito de utilización

Interior

-

Método(s) de aplicación

Método: En portacebos / trampas

Descripción detallada:

-

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: 1 trampa cada 15 m² -Si es necesario reemplace la trampa a más tardar 3 meses después de su activación.

Dilución (%): -

Número y frecuencia de aplicación:

Dosis: 1 trampa cada 15 m²

Frecuencia de aplicación: Si es necesario reemplace la trampa a más tardar 3 meses después de su activación.

Efectivo hasta 3 meses después de la apertura.

El control de la población de alcanza dos semanas después de la aplicación.

Categoría(s) de usuarios

Profesional

Público en general (no profesional)

Tamaños de los envases y material del envasado

Trampa de PS de 2 a 8 gramos (con incremento 1 gramo).

Las trampas están empaquetadas en cajas, blíster o bolsas (cartón, plástico, aluminio) de 1 a 6 unidades.



4.3.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Si es necesario reemplace la trampa a más tardar 3 meses después de su activación.
Consultar también este punto en Instrucciones generales de uso

4.3.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.3.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.3.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.3.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida útil: 30 meses.
Consultar también este punto en Instrucciones generales de uso

4.4 Descripción de uso

Uso 4 - Tabla 4. Uso # 4 – Interiores-cebo en portacebos/trampas -Personal profesional especializado.

Tipo de producto

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	Insecticida listo para su uso contra cucarachas.
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Blattella germanica Nombre común: - Etapa de desarrollo: adultos y ninfas Nombre científico: Blatta orientalis Nombre común: - Etapa de desarrollo: adultos y ninfas
Ámbito de utilización	Interior -
Método(s) de aplicación	Método: En portacebos / trampas Descripción detallada: -
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 1 trampa cada 15 m2 -Si es necesario reemplace la trampa a más tardar 3 meses después de su activación. Dilución (%): - Número y frecuencia de aplicación: Dosis: 1 trampa cada 15 m2 Frecuencia de aplicación: Si es necesario reemplace la trampa a más tardar 3 meses después de su activación. Efectivo hasta 3 meses después de la apertura. El control de la población de alcanza dos semanas después de la aplicación. Efectivo hasta 3 meses después de la apertura. El control de la población de alcanza dos semanas después de la aplicación.
Categoría(s) de usuarios	Profesional especializado Público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Trampa de PS de 2 a 8 gramos (con incremento 1 gramo).

Las trampas están empaquetadas en cajas, blíster o bolsas (cartón, plástico, aluminio) de 1 a 24 unidades.

4.4.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Si es necesario reemplace la trampa a más tardar 3 meses después de su activación. Adoptar métodos integrados de gestión de plagas, como la combinación de métodos químicos, de control físico y otras medidas de salud pública, teniendo en cuenta las especificidades locales (condiciones climáticas, especies objetivo, condiciones de uso, etc.). Alterne productos que contienen sustancias activas con un modo de acción diferente (para eliminar individuos resistentes de la población).

Consultar también este punto en Instrucciones generales de uso

4.4.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.4.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.4.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consultar este punto en Instrucciones generales de uso

4.4.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida útil: 30 meses.
Consultar también este punto en Instrucciones generales de uso

5. Instrucciones generales de uso

5.1. Instrucciones de uso

Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas.
Informar al titular del registro si el tratamiento no es efectivo.
Lávese las manos después de aplicar el producto y antes de comer, beber o fumar.
Se recomienda no aplicar el producto en superficies muy sucias o en superficies que se lavan frecuentemente o que hayan sido tratadas recientemente con otros insecticidas. En cualquier caso, no aplique otros insecticidas o repelentes de insectos en áreas tratadas con TX3 GEL.
No aplique el producto cerca de fuentes de calor (por ejemplo, debajo del radiador).
Para optimizar la efectividad del tratamiento, siga las buenas prácticas de higiene: elimine o evite cualquier acceso a las fuentes de alimentos.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Coloque el cebo en un lugar inaccesible para niños, animales de compañía y animales no objetivo.
El producto debe aplicarse de forma segura de manera que se minimice el riesgo de consumo por parte de otros animales o niños.
Evitar el contacto con las superficies tratadas.
No aplique directamente sobre o cerca de alimentos, piensos o bebidas, o sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos, bebidas y animales.
Úselo solo en áreas ocultas de difícil acceso y lejos del agua.
Al final del tratamiento, eliminar los residuos del producto/trampas de acuerdo con la normativa local.

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

- Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:
 - Irritación y/o reacción alérgica en piel.
- Medidas básicas de actuación:
 - Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
 - En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
 - En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

- Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
 - Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono 91 562 04 20

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

Público en general, personal profesional:

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Usuario profesional especializado:

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar el recipiente cerrado en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de las heladas y fuentes de calor.

Almacenar lejos de la luz.

6. Información adicional

Personal profesional especializado: operadores de control de plagas que han recibido formación específica frente al control de insectos de acuerdo a la legislación nacional actual.

Personal profesional: usuario que aplica productos biocidas dentro de su lugar de trabajo. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos y es capaz de usar correctamente los equipos de protección personal (PPE) si fuera necesario.

Público en general (personal no profesional): usuarios que no son profesionales y que aplican el producto biocida en el contexto de su vida privada.

El producto contiene una sustancia amargante que la hace repulsiva a niños y mascotas.

Para los usuarios no profesionales, la etiqueta del producto indicará que la dosis de aplicación de 1 a 3 gotas/m² es eficaz contra las cucarachas pequeñas (*Blattella germanica*/*Supella longipalpa*), mientras que la dosis de aplicación de 3 gotas/m² es eficaz contra las cucarachas grandes (*Blatta orientalis*/*Periplaneta americana*).