

PT

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)

KOL-RAT Doméstico

Tipo(s) de produto

PT14: Rodenticidas

Número de autorização: PTDGS mac-19/2018, bbs42/2020 e bbs43/2020

Número da decisão de autorização R4BP: PT-0022151-0000

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	KOL-RAT Doméstico ZAS ISCO FRESCO 003 ZAS CEBO FRESCO 003
-----------------------------------	---

1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	IMPEX EUROPA, S.L.
	Endereço	Avda. de Pontevedra, nº 39 36600 Vilagarcía de Arousa Espanha
Número de autorização	PTDGS mac-19/2018, bbs42/2020 e bbs43/2020	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0022151-0000	
Data da autorização	26/03/2014	
Data de caducidade da autorização	31/12/2026	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	Laboratorios Agrochem, S.L.
Endereço do fabricante	Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud) 36600 VILAGARCIA DE AROUSA (Pontevedra) Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) Espanha
Localização das instalações de fabrico	Tres Rieres, 10 08292 Esparraguera (Barcelona) Espanha

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Bromadiolona
Nome do fabricante	Laboratorios Agrochem S.L.
Endereço do fabricante	Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud) 08292 Esparraguera Espanha
Localização das instalações de fabrico	Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud) 08292 Esparraguera Espanha

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Bromadiolona	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substância ativa	28772-56-7	249-205-9	0,0029 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	H373: Pode afetar os órgãos {0:ou indicar todos os órgãos afetados, se forem conhecidos:} após exposição prolongada ou repetida {1:indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição:}.
Recomendações de prudência	P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P280: Usar vestuário de proteção. P301 + P310: EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P501: Eliminar conteúdo em em conformidade com a regulamentação em vigor, por gestor autorizado de resíduos.. P501: Eliminar recipiente em em conformidade com a regulamentação em vigor, por gestor autorizado de resíduos..

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

4.1. Descrição de utilizações

Tabela 1. Uso 1 - Ratos - Público em Geral

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Mus musculus</i> Nome comum: house mouse Estádio de desenvolvimento: adultos Nome científico: <i>Mus musculus</i> Nome comum: house mouse Estádio de desenvolvimento: jovens
Campo(s) de utilização	utilização em interiores utilização no exterior outro: Outro Interior e envolvente de edifícios.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: O isco em pasta fresca é colocado manualmente na estação de isco, devidamente rotulada e colocada na área de infestação.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratos: estações de isco com 60 g de produto por cada 5-10 metros. Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação: 60 g de isco por estação de isco dependendo do grau de infestação. Se for necessário mais do que uma estação de isco, a distância mínima entre as estações de isco deve ser de 5-10 metros.
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Tamanho máximo das embalagens : 150g Número de estações de isco ou recargas por embalagens : até 150g Quantidade de isco por estações de isco ou recargas : Saquetas i 10 a 5 0g

	Material de embalagem: bolsas, baldes, caixa de cartão, polietileno (PE) ou PP e HDPE.
--	--

4.1.1. Instruções específicas de utilização

As estações de isco devem ser verificadas, pelo menos a cada 2-3 dias no início do tratamento até semanalmente a fim de verificar os iscos consumidos pelos roedores, o estado de conservação das estações de isco e remover os roedores mortos. Repor ou substituir os iscos sempre que necessário.

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.2. Descrição de utilizações

Tabela 2. Uso 2 - Ratazanas - Público em Geral

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: adultos Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: jovens
Campo(s) de utilização	utilização em interiores utilização no exterior outro: Outro Interior e envolvente de edifícios.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: O isco fresco em pasta é colocado manualmente na estação de isco, devidamente rotulada e colocada na área de infestação.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratazanas: estações de isco com 100 g de produto por cada 5-10 metros Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação: 100 g de isco por estação de isco dependendo do grau de infestação. Se for necessário mais do que uma estação de isco, a distância mínima entre estações de isco deve ser de 5-10 metros.
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Tamanho máximo das embalagens : 150g Número de estações de isco ou recargas por embalagens : até 150g Quantidade de isco por estações de isco ou recargas : Saquetas 10 a 50g Material de embalagem : bolsas , baldes , caixa de cartão , polietileno (PE) ou PE e HDPE.

--	--

4.2.1. Instruções específicas de utilização

As estações de isco devem ser verificadas, pelo menos a cada 5-7 dias no início do tratamento passando a semanalmente, a fim de verificar os iscos consumidos pelos roedores, o estado de conservação das estações de isco e remover os roedores mortos. Repor ou substituir os iscos sempre que necessário.

4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.2.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.2.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.2.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO¹

5.1. Instruções de utilização

- Antes de usar o produto, ler atentamente o rótulo e seguir as instruções apresentadas ou indicadas no ponto

- Antes da utilização do produto, devem ser considerados métodos de controlo não químicos, por exemplo: ratoes

- Remover o alimento facilmente alcançável pelos roedores (por exemplo, grãos ou resíduos de alimentos). Para além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, pois perturba a população

- As estações de isco devem ser colocadas nas zonas próximas onde a actividade de roedor foi observada (etc.)

- Se possível, as estações de isco devem ser fixas ao pavimento ou outra estrutura.

- Não abrir as saquetas com isco, excepto na formulação de grãos soltos (só autorizado para uso

- Colocar as estações de isco fora do alcance das crianças, pássaros, animais de estimação ou outros

- Colocar as estações de isco afastadas de alimentos, bebidas, rações, assim como de utensílios ou su

- Não colocar as estações de isco perto de sistemas de drenagem de água onde possa estar em co

- Durante o manuseamento do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e as áreas de pele expostas

- Remover o restante isco ou estações de isco no final do tratamento.

5.2. Medidas de redução do risco

- Considerar medidas de controlo preventivo (tapar aberturas, remover alimentos e bebidas para o maior grau de infestação).

- Não utilizar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes (por exemplo, para prevenir o aparecimento de roedores ou detectar actividade de roedores).

- A informação do produto (/rótulo e/ou folheto) deve apresentar claramente o seguinte:

¹As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

•

O produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis (por exemplo:" usar em estações de isco

•

os utilizadores devem rotular devidamente as estações de isco com a informação do ponto 5.3 do SPC (p.e:" rotular as estações de isco de acordo com as recomendações do produto").

- A utilização deste produto deve eliminar os roedores em 35 dias .
A informação do produto (rotulo e/ou folheto) deverá recomendar que em caso de suspeita de falta de do tratamento (isto é, continua a observar-se actividade de roedores),
o utilizador deverá consultar o fornecedor do produto ou serviço de controlo de pragas .

- os roedores mortos devem ser removidos em intervalos frequentes durante o tratamento , pelo menos
- Eliminar os roedores mortos em conformidade com a regulamentação em vigor .

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- O produto contém uma substância anticoagulante. Se ingerido, os sintomas podem ser retardados, podendo incluir hemorragia nasal e das gengivas. Em situações mais graves, pode surgir sangramento nas fezes e na urina.

- **Antídoto: Vitamina K1** administrada somente por um médico e/ou veterinário.

- Em caso de:

- Contacto com a pele, lavar a pele com água e de seguida com água e sabão;
- Contacto com os olhos, lavar os olhos com água, manter as pálpebras abertas, pelo menos 10 minutos;
- Ingestão, lavar com água abundante. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Se ingerido, procurar assistência médica imediata e mostrar a embalagem ou o rotulo do produto. Contactar um veterinário em caso de ingestão por um animal.

- NÃO DEIXAR O INTOXICADO SOZINHO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.

- SE NECESSÁRIO ACONSELHAMENTO MÉDICO, TENHA DISPONÍVEL O RÓTULO OU A EMBALAGEM DO PRODUTO E CONSULTE O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (TEL.:800 250 250).

- Sintomas: Diátesis hemorrágica, derivado do efeito da antiprotombina - tempo prolongado da protombina - que pode ser evidente num prazo mínimo de 24 horas e máximo de 72 horas (tempo de protrombina normal após a admissão do paciente no hospital, não exclui o diagnóstico).

- No contacto com o Centro de Informação Antivenenos, informar o nº de autorização do produto, o nome comercial do produto e a substância activa. Se possível, providenciar uma cópia do rótulo ou da ficha de dados de segurança.

- As estações de isco devem ser rotuladas com a seguinte informação: "Não mover ou abrir"; "Contem rodenticida"; "Nome e número de autorização do produto"; "Substância activa" e " em caso de acidente ou incidente, contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 800 250 250".

- Perigoso para os animais selvagens.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

No final do tratamento, eliminar os iscos não consumidos e a embalagem em conformidade com a regulamentação em vigor.

Recomenda-se o uso de luvas de protecção.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado. Manter os recipientes fechados e afastados da luz solar directa.

Armazenar em locais afastados de crianças, pássaros, animais domésticos e outros animais.
O produto biocida é estável durante 24 meses.

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Devido ao modo de acção demorado, os rodenticidas anticoagulantes levam 4-10 dias para serem eficazes após o consumo do isco.

Os roedores podem ser portadores de doenças. Não mexer com as mãos nos roedores mortos, utilizar luvas de protecção ou outros equipamentos, se disponíveis.

O produto contém um agente amargante e um corante.