

**PL**

**ZAŁĄCZNIK**

**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO**

Ratimor Plus granulat

**Grupa produktowa**

PT14: Rodentycydy

**Numer zezwolenia:** PL/2019/0431/MR

**Numer zasobu w R4BP:** PL-0021754-0000

---

## Rozdział 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

### 1.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) produktu

Nazwa handlowa	Ratimor Plus granulat
----------------	-----------------------

### 1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	Unichem d.o.o.
	Adres	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Słowenia
Numer zezwolenia		PL/2019/0431/MR
<i>Numer zasobu w R4BP</i>		PL-0021754-0000
Data udzielenia zezwolenia		04/11/2019
Data ważności zezwolenia		31/12/2025

### 1.3. Producent(-ci) produktu

Nazwa producenta	Unichem d.o.o.
Adres producenta	Sinja Gorica 2 SI-1360 Vrhnika Słowenia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Sinja Gorica 2 SI-1360 Vrhnika Słowenia

### 1.4. Producent(-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	Bromadiolone
Nazwa producenta	PelGar International Limited
Adres producenta	Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, GU34 2QR Alton, Hampshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Prazska 54, 280 02 Kolin, Czechy

---

## Rozdział 2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA PRODUKTU

### 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu produktu

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substancja czynna	28772-56-7	249-205-9	0,0029

### 2.2. Rodzaj(e) postaci użytkowej

XX Inne: przynęta gotowa do użycia: granulata

### Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H373: Może powodować uszkodzenie narządów krew w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia -.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P102: Chronić przed dziećmi. P260: Nie wdychać pyłu. P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć zasięgnąćporady. P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć zgłosić. P501: zawartość usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. P501: pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

## Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM

### 4.1. Opis zastosowań

**Tabela 1. Zwalczenie myszy wewnątrz budynków przez użytkownika powszechnego**

Grupa produktowa	PT14: Rodentycydy
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	brak
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: <i>Mus musculus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: mysz domowa Etap rozwoju: inne: -
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie w pomieszczeniach  Wewnątrz budynków
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: inne: <b>Przynęta</b> gotowa do użycia w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych  Szczegółowy opis: -
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: -  Rozcieńczenie (%): -  Liczba i harmonogram aplikacji: <u>Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):</u> Do 40 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m. <u>Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):</u>  Do 40 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.
Kategoria(-e) użytkowników	ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<b>Maksymalna wielkość opakowania zbiorczego – 50 g</b> 1. Saszetki (papier) o masie od 10 g do 20 g pakowane w opakowanie zbiorcze: <ul style="list-style-type: none"><li>• saszetka zewnętrzna (PE, PE/PP, PP, papier/PE), pakowana w pudło (karton, tektura),</li><li>• pojemnik (PP, PE),</li><li>• torba (Natron),</li><li>• saszetka zewnętrzna (PE, PP, PE/PP, papier/PE) pakowana w torbę (Natron), wiadro (PP, PE) z pokrywą (HDPE, PP), pudło (karton, tektura),</li><li>• wiadro (PP, PE) z pokrywą,</li><li>• pudło (karton, tektura) z wyściółką lub torbą (PE, PP),</li><li>• fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE, PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudło (karton, termozgrzewalny plastik).</li></ul>

2. Saszetki (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/ALU) o masie od 10 g do 40 g pakowane w opakowanie zbiorcze:
- pojemnik (karton, tektura),
  - pojemnik (PP, PE),
  - torba (Natron),
  - pojemnik (HDPE),
  - worek (papier warstwowy),
  - worek tkany (PP),
  - wiadro (PP, PE) z pokrywą,
  - fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE, PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudło (karton, termozgrzewalny plastik),
  - worek (PET/PE, PP/PE, papier/PE),
  - pudło (karton, tektura) z wyściółką lub z wewnętrzną torbą (PE, PP),
  - pudło (karton, tektura),
  - saszetka zewnętrzna (PE, PE/PP, PP, papier/PE) pakowana w kartonowy rękaw, a następnie w pudło (karton), torba (Natron), wiadro (PP, HDPE) z pokrywą.
3. Fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE, PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudło (karton, termozgrzewalny plastik).
4. Pojemnik-wsad (PVC, PS, PP, PET) z termozgrzewalnym wieczkiem (PET/PP, PET/PE, PP) do napełniania stacji deratyzacyjnych.

#### **4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania**

- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.

#### **4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania**

#### **4.1.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania**

patrz sekcja 5.2

#### **4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

patrz sekcja 5.3

#### **4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

patrz sekcja 5.4

#### 4.1.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

#### 4.2. Opis zastosowań

**Tabela 2. Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków przez użytkownika powszechnego**

Grupa produktowa	PT14: Rodentycydy
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	brak
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: <i>Rattus norvegicus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: szczur wędrowny Etap rozwoju: inne: -  Nazwa naukowa: <i>Rattus rattus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: szczur śniady Etap rozwoju: inne: -
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie w pomieszczeniach  Wewnątrz budynków
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: inne: Przynęta gotowa do użycia w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych  Szczegółowy opis: -
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: -  Rozcieńczenie (%): -  Liczba i harmonogram aplikacji: <u>Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):</u> Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m. <u>Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):</u>  Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m
Kategoria(-e) użytkowników	ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<b>Maksymalna wielkość opakowania zbiorczego – 150 g</b>

1. Saszetki (papier) o masie od 10 g do 20 g pakowane w opakowanie zbiorcze:
  - saszetka zewnętrzna (PE, PE/PP, PP, papier/PE), pakowana w pudło (karton, tektura),
  - pojemnik (PP, PE),
  - torba (Natron),
  - saszetka zewnętrzna (PE, PP, PE/PP, papier/PE) pakowana w torbę (Natron), wiadro (PP, PE) z pokrywą (HDPE, PP), pudło (karton, tektura),
  - wiadro (PP, PE) z pokrywą,
  - pudło (karton, tektura) z wyściółką lub torbą (PE, PP),
  - fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE, PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudło (karton, termozgrzewalny plastik).
2. Saszetki (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/ALU) o masie od 10 g do 40 g pakowane w opakowanie zbiorcze:
  - pojemnik (karton, tektura),
  - pojemnik (PP, PE),
  - torba (Natron),
  - pojemnik (HDPE),
  - worek (papier warstwowy),
  - worek tkany (PP),
  - wiadro (PP, PE) z pokrywą,
  - fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE, PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudło (karton, termozgrzewalny plastik),
  - worek (PET/PE, PP/PE, papier/PE),
  - pudło (karton, tektura) z wyściółką lub z wewnętrzną torbą (PE, PP),
  - pudło (karton, tektura),
  - saszetka zewnętrzna (PE, PE/PP, PP, papier/PE) pakowana w kartonowy rękaw, a następnie w pudło (karton), torba (Natron), wiadro (PP, HDPE) z pokrywą.
3. Fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE, PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudło (karton, termozgrzewalny plastik).
4. Pojemnik-wsad (PVC, PS, PP, PET) z termozgrzewalnym wieczkiem (PET/PP, PET/PE, PP) do napełniania stacji deratyzacyjnych.

#### **4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania**

- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.

#### **4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania**

#### **4.2.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania**

patrz sekcja 5.2



**4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**  
patrz sekcja 5.3

**4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**  
patrz sekcja 5.4

**4.2.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**  
patrz sekcja 5.5

### 4.3. Opis zastosowań

**Tabela 3. Zwalczanie szczurów wokół budynków przez użytkownika powszechnego**

Grupa produktowa	PT14: Rodentycydy
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	brak
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Rattus norvegicus Nazwa zwyczajowa: inne: szczur wędrowny Etap rozwoju: inne: -  Nazwa naukowa: Rattus rattus Nazwa zwyczajowa: inne: szczur śniady Etap rozwoju: inne: -
Obszar(y) zastosowania	inne: Inne  wokół budynków
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: inne: Przynęta gotowa do użycia w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych  Szczegółowy opis: -
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: -  Rozcieńczenie (%): -  Liczba i harmonogram aplikacji: <u>Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):</u> Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m.

	<p><u>Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):</u></p> <p>Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m</p>
Kategoria(-e) użytkowników	ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<p><b>Maksymalna wielkość opakowania zbiorczego – 150 g</b></p> <p>1. Saszetki (papier) o masie od 10 g do 20 g pakowane w opakowanie zbiorcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saszetka zewnętrzna (PE, PE/PP, PP, papier/PE), pakowana w pudło (karton, tektura),</li> <li>• pojemnik (PP, PE),</li> <li>• torba (Natron),</li> <li>• saszetka zewnętrzna (PE, PP, PE/PP, papier/PE) pakowana w torbę (Natron), wiadro (PP, PE) z pokrywą (HDPE, PP), pudło (karton, tektura),</li> <li>• wiadro (PP, PE) z pokrywą,</li> <li>• pudło (karton, tektura) z wyściółką lub torbą (PE, PP),</li> <li>• fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE, PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudło (karton, termozgrzewalny plastik).</li> </ul> <p>2. Saszetki (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/ALU) o masie od 10 g do 40 g pakowane w opakowanie zbiorcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pojemnik (karton, tektura),</li> <li>• pojemnik (PP, PE),</li> <li>• torba (Natron),</li> <li>• pojemnik (HDPE),</li> <li>• worek (papier warstwowy),</li> <li>• worek tkany (PP),</li> <li>• wiadro (PP, PE) z pokrywą,</li> <li>• fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE, PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudło (karton, termozgrzewalny plastik),</li> <li>• worek (PET/PE, PP/PE, papier/PE),</li> <li>• pudło (karton, tektura) z wyściółką lub z wewnętrzną torbą (PE, PP),</li> <li>• pudło (karton, tektura),</li> <li>• saszetka zewnętrzna (PE, PE/PP, PP, papier/PE) pakowana w kartonowy rękaw, a następnie w pudło (karton), torba (Natron), wiadro (PP, HDPE) z pokrywą.</li> </ul> <p>3. Fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE, PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudło (karton, termozgrzewalny plastik).</p> <p>4. Pojemnik-wsad (PVC, PS, PP, PET) z termozgrzewalnym wieczkiem (PET/PP, PET/PE, PP) do napełniania stacji deratyzacyjnych.</p>

#### 4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.
- Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.

- 
- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.

#### **4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania**

#### **4.3.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania**

patrz sekcja 5.2

#### **4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

patrz sekcja 5.3

#### **4.3.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

patrz sekcja 5.4

#### **4.3.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

patrz sekcja 5.5

---

## Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA<sup>1</sup>

### 5.1. Instrukcje stosowania

- Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży.
- Przed zastosowaniem produktów gryzoniobójczych należy rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).
- Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności).
- Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.
- Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.).
- Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur.
- Przynęty nie należy wyjmować z saszetek.
- Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe.
- Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt.
- Nie umieszczać stacji deratyzacyjnych w pobliżu miejsc, w których mogą mieć one kontakt z wodami powierzchniowymi.
- Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.
- Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znaną poza stacjami.

### 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).
- Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).
- Etykieta i (lub) ulotka powinna zawierać wyraźne zalecenia, że:
  - o dozwolone jest stosowanie produktu w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem stacjach deratyzacyjnych;
  - o stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować, poprzez umieszczenie informacji, o których mowa w sekcji 5.3 charakterystyki produktu biobójczego (np. „stacje należy oznakować zgodnie z zaleceniami dla produktu”).
- W przypadku stosowania produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty, gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 35 dni. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy powiadomić dostawcę/sprzedawcę produktu lub skonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się deratyzacją.
- W trakcie zabiegu deratyzacji (przynajmniej podczas każdej inspekcji) należy wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie.
- Padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i nieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. (Taka sama informacja powinna znajdować się w treści oznakowania opakowania).

---

<sup>1</sup>Instrukcje stosowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych zezwoleniem.

---

### 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

#### Skutki uboczne/działania niepożądane:

Produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i moczu.

Antidotum: Witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny/weterynaryjny.

#### Pierwsza pomoc:

W przypadku:

- kontaktu ze skórą: spłukać skórę wodą, a następnie umyć wodą z mydłem.
- kontaktu z oczami: przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 10 minut.
- kontaktu z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Oznakowania na stacjach deratyzacyjnych muszą zawierać następujące informacje:

„Nie przenosić ani nie otwierać”; „Zawiera substancję gryzoniobójczą”; „Nazwa produktu lub nr pozwolenia”; „Substancja(-e) czynna(-e)” i „W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć (należy podać numery telefonów do ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi)”.

#### Środki ochrony środowiska:

- W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni).
- Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt.

### 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Opakowania po produkcie oraz pozostałości produktu po zastosowaniu (w tym przynętę znaną poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. (Taka sama informacja powinna znajdować się w treści oznakowania opakowania).

- W przypadku użytkownika powszechnego zaleca się stosowanie rękawic ochronnych

### 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych. Przechowywać z dala od światła słonecznego.

**Długość okresu przechowywania:** do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej

---

---

## Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Kategoria zagrożenia

STOT RE 2

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze

GHS08

Uwaga

Ze względu na mechanizm działania substancji należących do grupy antykoagulantów skutki zastosowania produktów gryzoniobójczych je zawierających można zaobserwować po upływie 4-10 dni po spożyciu przynęty.

- Gryzonie mogą przenosić choroby. Padłe gryzonie i przynętę należy usuwać, stosując rękawice ochronne lub narzędzia, np. szczypce.
- Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia oraz barwnik.
- W przypadku produktów do zwalczania myszy i szczurów w postaci: ziaren, granulatu, past, dla użytkowników powszechnych maksymalna dopuszczalna ilość przynęty na opakowanie wynosi 150 g.