

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Biopren ant gel

Tipul (tipurile) de produs (produse):

- TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
- TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
- TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
- TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Numărul curent: RO/2022/0315/MRP/ES/APP(NA)-2021-18-00768

Numărul curent R4BP 3: RO-0028666-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Frazе de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	11
5.1. Instrucțiuni de utilizare	11
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	11
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	11
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	12
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	13
6. Alte informații	13

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Biopren gel pentru combaterea furnicilor
Protect gel pentru combaterea furnicilor

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
	Adresa	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Ungaria
Numărul curent	RO/2022/0315/MRP/ES/APP(NA)-2021-18-00768	
Numărul curent R4BP 3	RO-0028666-0000	
Data autorizației	22/03/2022	
Data de expirare a autorizației	05/08/2026	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Mylva S.A.
Adresa producătorului	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Spania
Adresa locurilor de producție	Sant Galderic 23 08395 Sant Pol de Mar Spania

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	37 - Imidacloprid
Numele producătorului	Bayer S.A.S.
Adresa producătorului	16 rue Jean-Marie Leclair 90106 Lyon Cedex Franța
Adresa locurilor de producție	16 rue Jean-Marie Leclair 90106 Lyon Cedex Franța
Substanța activă	1386 - S-metopren
Numele producătorului	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
Adresa producătorului	H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 1107 Szállás, Budapest Ungaria
Adresa locurilor de producție	H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 1107 Szállás, Budapest Ungaria

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Substanța activă	138261-41-3	428-040-8	0,01
S-metopren	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Substanța activă	65733-16-6		0,08

2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

<p>A nu se lăsa la îndemâna copiilor.</p> <p>Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.</p> <p>Evitați dispersarea în mediu.</p> <p>Colectați scurgerile de produs.</p> <p>Aruncați conținutul la Eliminați conținutul ca fiind deșeu periculos prin centrele autorizate pentru deșeuri periculoase, în conformitate cu legislația în vigoare. (Profesioniști instruiți)..</p> <p>Aruncați recipientul la Eliminați recipientul ca fiind deșeu periculos prin centrele autorizate pentru deșeuri periculoase, în conformitate cu legislația în vigoare. (Profesioniști instruiți)..</p> <p>Aruncați conținutul la Eliminați conținutul ca fiind deșeu periculos conform legislației în vigoare. (Profesioniști instruiți și utilizatori publici)..</p> <p>Aruncați recipientul la Eliminați recipientul ca fiind deșeu periculos conform legislației în vigoare. (Profesioniști instruiți și utilizatori publici)..</p>
--

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - # 1 – Momeală-gel aplicată sub forma unor picături/linii – Uz în spații interioare – Profesioniști instruiți, profesioniști și utilizatori publici (utilizatori neprofesioniști)

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid pentru combaterea furnicilor.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: <i>Linepithema humile</i> denumirea comună: furnica argentiniană etapă de dezvoltare: Adulți denumirea științifică: <i>Lasius niger</i> denumirea comună: furnica neagră de grădină etapă de dezvoltare: Adulți
Domeniul de utilizare	de interior Interior. Clădiri rezidențiale, industriale, publice și comerciale or instituționale. Aplicați produsul biocid sub forma unor pete, în spatele mobilierului și a motoarelor.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicarea momelii-gel din seringă sau cartușe, sub forma unor pete Descriere detaliată: Aplicați Biopren gel pentru combaterea furnicilor sub forma unor picături sau linii (picături alungite) în locurile unde furnicile sunt prezente.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 0.2-0.6 g/m ² Diluare (%):

	<p>Numărul și calendarul de aplicare: Doza: 0,2-0,6 g/m² = 1-3 picături/m² (1 picătură = 1 linie de o lungime de 3 cm = 0,2 g momeală-gel) Frecvența aplicării: Verificați punctele de aplicare după 7 zile. Dacă momeala s-a consumat și infestarea persistă, repetați odată aplicarea. Frecvența tratamentului: La trei luni după eliminarea infestării, tratamentul se poate repeta. Maxim 8 aplicări anual.</p>
<p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p>	<p>instruiți profesional profesional Publicul larg (neprofesionist)</p>
<p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p>	<p>Public general și utilizatori profesioniști:</p> <p>seringă LDPE conținând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 g momeală-gel.</p> <p>Utilizatori profesioniști instruiți:</p> <p>cartușe LDPE conținând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 și 500 g momeală-gel.</p> <p>seringă LDPE conținând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 și 50 g momeală-gel.</p>

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>Utilizare numai în spații interioare.</p> <p>Aplicați produsul biocid într-o zonă delimitată, în forma unei pete în spatele mobilierului și a motoarelor.</p> <p>Se recomandă spălarea mâinilor înainte de a utiliza momeala, pentru a evita contaminarea cu mirosuri deranjante, cum ar fi tutunul, etc.</p> <p>Nu pulverizați sau stropiți substanțe chimice în apropierea zonelor în care se aplică Biopren gel pentru combaterea furnicilor, deoarece acestea pot contamina momeala, aceasta devenind astfel neapetisantă pentru furnici.</p> <p>Nu aplicați pe suprafețe poroase.</p>

Nu aplicați în zonele tratate recent cu un alt insecticid.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Evitați contactul cu ochii și pielea.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi secțiunea 2.1.5.3

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vezi secțiunea 2.1.5.4

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea 2.1.5.5

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - # 2 – Momeală-gel aplicată sub forma unor picături/linii – Uz în exterior- profesioniști instruiți

Tipul produsului

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Insecticid pentru combaterea furnicilor.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: *Linepithema humile*
denumirea comună: furnica argentiniană
etapă de dezvoltare: Adulți

Domeniul de utilizare

în aer liber
Exterior, suprafețe pavate.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: Aplicarea momelii-gel din seringă sau cartușe, sub forma unor pete
Descriere detaliată:

	<p>Aplicați Biopren gel pentru combaterea furnicilor sub forma unor picături sau linii (picături alungite) în locurile unde furnicile sunt prezente</p>
<p>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</p>	<p>Frecvența de aplicare: 0.2-0.6 g/m² Diluare (%): Numărul și calendarul de aplicare: Doza: 0,2-0,6 g/m² = 1-3 picături/m² (1 picătură = 1 linie de o lungime de 3 cm = 0,2 g momeală-gel) Frecvența aplicării: Verificați punctele de aplicare după 7 zile. Dacă momeala s-a consumat și infestarea persistă, repetați odată aplicarea. Frecvența tratamentului: La trei luni după eliminarea infestării, tratamentul se poate repeta. Maxim 8 aplicări anual.</p>
<p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p>	<p>instruiți profesional</p>
<p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p>	<p>cartușe LDPE conținând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 și 500 g momeală-gel.</p> <p>seringă LDPE conținând 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10,15, 20, 25, 30, 35, 40 și 50 g momeală-gel.</p>

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>Aplicați numai pe suprafețe pavate.</p> <p>Se recomandă spălarea mâinilor înainte de a utiliza momeala, pentru a evita contaminarea cu mirosuri deranjante, cum ar fi tutunul, etc.</p> <p>Nu pulverizați sau stropiți substanțe chimice în apropierea zonelor în care se aplică Biopren gel pentru combaterea furnicilor, deoarece acestea pot contamina momeala, aceasta devenind astfel neapetisantă pentru furnici.</p> <p>Nu aplicați pe suprafețe poroase. Aplicați numai pe suprafețe pavate. În cazul în care acest lucru nu este posibil, aplicați produsul pe o folie de plastic.</p>
--

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

<p>Evitați contactul cu ochii și pielea. Evitați contactul direct al produsului cu albine și alți polenizatori prin acoperirea acestuia, de exemplu, cu un ghiveci sau cu o țigla (asigurându-vă că furnicile au totuși acces la momeală.).</p>
--

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi secțiunea 2.1.5.3

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vezi secțiunea 2.1.5.4

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea 2.1.5.5

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - # 3 – Momeală-gel aplicată sub forma unor capcane (stații de momeală)– Uz în interior-profioniști instruiți, profesioniști și public general (neprofioniști)

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid pentru combaterea furnicilor.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Linepithema humile denumirea comună: furnica argentiniană etapă de dezvoltare: Adulți denumirea științifică: Lasius niger denumirea comună: furnica neagră de grădină etapă de dezvoltare: Adulți
Domeniul de utilizare	de interior Interior. Clădiri rezidențiale, industriale, publice și comerciale sau instituționale. Aplicați produsul biocid sub forma unor pete, în spatele mobilierului și a motoarelor.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Stații de momeală gata de folosire Descriere detaliată: Momeală-gel în capcane (stații de momeală).
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 0.3-0.6 g/m ² Diluare (%): Numărul și calendarul de aplicare: Doza: 0,3-0,6 g/m ² , în funcție de gradul de infestare, aplicat de preferință în mai multe stații de momeală pentru o eficiență mai bună.

	<p>De exemplu, amplasați 2-3 stații de momeală (cu câte 5-15 g momeală în fiecare) la fiecare 25 m2. Frecvența aplicării: Verificați punctele de aplicare după 7 zile și amplasați noi stații de momeală dacă momeala s-a consumat și infestarea nu este încă sub control. Frecvența tratamentului: La trei luni după eliminarea infestării, tratamentul se poate repeta. Maxim 8 aplicări anual.</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>instruiți profesional profesional Publicul larg (neprofesionist)</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Public general și utilizatori profesioniști: Stații de momeală din plastic cu 1, 2, 3, 4, 5 și 6 g momeală-gel. Profesioniști instruiți: Stații de momeală din plastic cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 și 30 g momeală-gel.</p>

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>Amplasați stațiile de momeală în zone (în interior) unde furnicile sunt prezente în apropierea rutelor acestora sau a cuiburilor de furnici.</p> <p>Verificați frecvent punctul de aplicare și amplasați o nouă stație de momeală dacă momeala a fost consumată și infestarea nu este încă sub control.</p>
--

4.3.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

<p>Stațiile nu trebuie manipulate după deschidere. Nu introduceți niciodată degetele prin găurile din stația de momeală. Îndepărtați stațiile de momeală la sfârșitul tratamentului.</p>
--

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi secțiunea 2.1.5.3

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vezi secțiunea 2.1.5.4

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea 2.1.5.5

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - # 4 – Momeală-gel aplicată sub forma unor capcane – Uz în exterior- profesioniști instruiți

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid pentru combaterea furnicilor.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: <i>Linepithema humile</i> denumirea comună: furnica argentiniană etapă de dezvoltare: Adulți
Domeniul de utilizare	în aer liber Exterior (în jurul clădirilor, teraselor...): în apropierea rutelor și cuiburilor furnicilor, pe suprafețe pavate.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: stații de momeală gata de utilizare Descriere detaliată: Momeală-gel în capcane (stații de momeală).
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 0.2-0.6 g/m ² Diluare (%): Numărul și calendarul de aplicare: Doza: 0,2-0,6 g/m ² , în funcție de gradul de infestare, aplicat de preferință în mai multe stații de momeală pentru o eficiență mai bună. De exemplu, amplasați 2-3 stații de momeală (cu câte 5-15 g momeală în fiecare) la fiecare 25 m ² . Frecvența aplicării: Verificați punctele de aplicare după 7 zile și amplasați noi stații de momeală dacă momeala s-a consumat și infestarea nu este încă sub control. Frecvența tratamentului: La trei luni după eliminarea infestării, tratamentul se poate repeta. Maxim 8 aplicări anual.

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Stații de momeală din plastic cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 și 30 g momeală-gel.

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Amplasați stațiile de momeală în zone (în exterior) unde furnicile sunt prezente în apropierea rutelor acestora sau a cuiburilor de furnici.
Amplasați stațiile de momeală numai pe suprafețe pavate și în locuri protejate de precipitații pentru a evita dispersarea produsului în mediu și pentru a evita expunerea acestuia la lumina directă a soarelui.
În aer liber (terase, balcoane, curți sau grădini), aplicați Biopren gel pentru combaterea furnicilor în locuri unde apariția furnicilor este mai probabilă.
Verificați frecvent punctul de aplicare și amplasați o nouă stație de momeală dacă momeala a fost consumată și infestarea nu este încă sub control.

4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Stațiile nu trebuie manipulate după deschidere.
Nu introduceți niciodată degetele prin găurile din stația de momeală.
Îndepărtați stațiile de momeală la sfârșitul tratamentului.

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi secțiunea 2.1.5.3

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vezi secțiunea 2.1.5.4

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi secțiunea 2.1.5.5

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate.

După o verificare temeinică efectuată în vederea stabilirii nivelului de infestare (scăzut sau ridicat), amplasați punctele de momeală în locurile unde s-au detectat furnicile.

Eliminați eventualele surse alternative competitive de hrană din zonele vecine.

Pentru acest produs s-a demonstrat o eficacitate de peste 90% mortalitate a furnicilor adulte în decurs de 15 zile.

Acest produs biocid conține imidacloprid, care este periculos pentru albine.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Feriți de căldură, flacără deschisă și scântei.

Nu amestecați produsul cu alte chimicale.

Nu utilizați pe lemn sau alte suprafețe poroase.

Evitați contactul cu suprafețele tratate.

Acest produs trebuie utilizat alternat cu alte produse care nu conțin aceeași substanță activă, pentru a evita populațiile rezistente.

Produsul trebuie reaplicat numai până la atingerea controlului dăunătorului.

Utilizați produsul la dozele și intervalele recomandate.

A se utiliza numai în zone inaccesibile copiilor și animalelor.

Nu utilizați direct pe sau lângă alimente, furaje sau băuturi, sau pe suprafețe sau ustensile care ar putea fi în contact direct cu alimente, furaje, băuturi și animale.

Utilizare de către profesioniștii instruiți:

- Adoptați metode integrate de gestionare a dăunătorilor, cum ar fi combinația substanțelor chimice, metode de control fizic și alte măsuri de sănătate publică, luând în considerare specificul local (condiții climatice, specii vizate, condiții de utilizare etc.).

- Nu aplicați produsul în zone în care este suspectată sau stabilită rezistența la substanța (substanțele) activă (-e) conținută (-e) în acest produs.

Utilizare de către profesioniștii și neprofesioniștii:

- Informați titularul autorizației dacă tratamentul este ineficient.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Măsuri esențiale de prim ajutor:

- ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Dacă apar simptome, contactați un CENTRU TOXICOLOGIC sau un medic.
- ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați pielea cu apă. Dacă apar simptome, contactați un CENTRU TOXICOLOGIC sau un medic.
- ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Dacă apar simptome, clătiți ochii cu apă. Scoateți lentilele de contact dacă se poartă și dacă acest lucru poate fi ușor efectuat. Contactați un CENTRU TOXICOLOGIC sau un medic.

Sfat medical pentru medici și personalul sanitar:

- Tratament simptomatic și suportiv

DACĂ ESTE NECESAR CONSULT MEDICAL, PĂSTRAȚI LA ÎNDEMÂNĂ ETICHETA SAU RECIPIENTUL ȘI CONSULTAȚI SERVICIUL DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ.

Telefon: (se va indica numărul de telefon pentru fiecare țară)

Pentru a include acest număr de telefon pe etichetă, trebuie să anunțați INTCF în conformitate cu procedura stabilită în Ordinul JUS / 909/2017.

Măsuri de urgență pentru protecția mediului înconjurător:

Măsuri de precauție: Evitați contaminarea canalelor de scurgere, a apelor de suprafață și subterane, precum și a solului.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Profesioniști instruiți:

Recipientele goale, produsul neutilizat și alte deșeuri generate în timpul tratamentului sunt considerate deșeuri periculoase. Livrați aceste deșeuri către o unitate sau întreprindere înregistrată, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Codificați deșeurile conform Deciziei 2014/955 /UE.

Nu dispersați produsul în sol, pământ, apă de suprafață sau orice fel de canalizare.

Public general și profesioniști:

Recipientele goale, produsul neutilizat și alte deșeuri generate în timpul tratamentului sunt considerate deșeuri periculoase. Eliminați acestea în conformitate cu reglementările în vigoare.

Nu dispersați produsul în sol, pământ, apă de suprafață sau orice fel de canalizare.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Stabilitatea la păstrare a produsului în recipientul original este de 4 ani în condiții normale.

Feriți de îngheț.

A se păstra în recipientul original bine închis.

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Se recomandă păstrarea produsului la o temperatură de preferință între 5 ° C și 45 ° C.

A se păstra ferit de lumină.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor care nu sunt vizate / a animalelor de companie.

6. Alte informații

According to national legislation, in Spain there are until three user categories:

- Trained professional users (TP): pest control operators, having received specific training in biocidal product uses according to the national legislation in force.
- Professional users (NTP): professionals that use the biocidal products in the context of his profession, that is not pest control operator, and that are unlikely to have received any specific training in biocidal product use according to the national legislation in force. It can be expected that they have some knowledge and skills handling chemicals (if they must use it in their job) and they are able to use correctly some kind of PPE if necessary.
- Non-professional users (NP): users who are not professionals and that apply the biocidal product is in his private life.

At the same time, there are also some restrictions of packaging in relation to those user categories and product types.

The product contains a bitter substance that makes it repulsive to people or pets.

The applicant must ensure that the general public can understand the difference between species and the level of infestation for correct use of the dose.

The drops should have 0.2 g of gel bait. The applicant should indicate in the label the size of a drop with 0.2 g of product.

The number of bait stations should be indicated in the label depending on the amount of product included in the bait station. E.g. 0.2 g/m² = 1 bait station with 5 g in a room of 25 m².

For trained professional only:

The users should inform if the treatment is ineffective and report straightforward to the registration holder any alarming signals which could be assumed to be resistance development.