

PL

ZAŁĄCZNIK

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO

Ratimor brodifacoum trutka granulowana

Grupa produktowa

PT14: Rodentycydy

Numer zezwolenia: PL/2022/0504/MR/SBP

Numer zasobu w R4BP: PL-0027936-0000

Rozdział 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) produktu

| | |
|----------------|--|
| Nazwa handlowa | Ratimor brodifacoum trutka granulowana Zudlan brodifakum granulat Zudwiz brodifakum granulat Extrat brodifakum granulat Bioxi brodifakum granulat Mumia brodifakum granulat |
|----------------|--|

1.2. Posiadacz pozwolenia

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| Nazwa i adres posiadacza pozwolenia | Nazwa | Unichem d.o.o. |
| | Adres | Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Słowenia |
| Numer zezwolenia | PL/2022/0504/MR/SBP | |
| <i>Numer zasobu w R4BP</i> | PL-0027936-0000 | |
| Data udzielenia zezwolenia | 27/01/2022 | |
| Data ważności zezwolenia | 31/12/2026 | |

1.3. Producent(-ci) produktu

| | |
|------------------------------------|--|
| Nazwa producenta | Unichem d.o.o. |
| Adres producenta | Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Słowenia |
| Lokalizacja zakładów produkcyjnych | Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Słowenia |

1.4. Producent(-ci) substancji czynnych

| | |
|------------------------------------|--|
| Substancja czynna | Brodifakum |
| Nazwa producenta | Activa S.r.l |
| Adres producenta | Via Feltre 32 20132 Milano Włochy |
| Lokalizacja zakładów produkcyjnych | Dr. Tezza S.r.l - Via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria Di Zevio Włochy |

Rozdział 2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA PRODUKTU

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu produktu

| Nazwa zwyczajowa | Nazwa IUPAC | Funkcja | Numer CAS | Numer EC | Zawartość (%) |
|------------------|---|-------------------|------------|-----------|----------------|
| Brodifakum | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | substancja czynna | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0,0025 % (w/w) |

2.2. Rodzaj(e) postaci użytkowej

XX Inne: przynęta gotowa do użycia: granulata

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia | H373: Może powodować uszkodzenie narządów (KR EW) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia {1:podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia:}. |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności | <p>P102: Chronić przed dziećmi.</p> <p>P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.</p> <p>P308+P313: W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady.</p> <p>P308+P313: W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć zgłosić się pod opiekę lekarza.</p> <p>P501: zawartość usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami (przekazać firmie uprawnionej do odzysku i nieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych)..</p> <p>P501: pojemnik usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami (przekazać firmie uprawnionej do odzysku i nieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych)..</p> |

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1. Zastosowanie 1: Zwalczenie myszy wewnątrz budynków przez użytkownika powszechnego:

| | |
|---|--|
| Grupa produktowa | PT14: Rodentycydy |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem | - |
| Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju) | Nazwa naukowa: <i>Mus musculus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: mysz domowa Etap rozwoju: inne: - |
| Obszar(y) zastosowania | użytkowanie w pomieszczeniach - |
| Sposób(-oby) nanoszenia | Metoda: inne: -- Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania | Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: 20-40 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 5 m. |
| Kategoria(-e) użytkowników | ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści) |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | 1.Przynęta w saszetkach (papier) o masie 10g - 20g, pakowane w: Saszeta (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w opakowaniu zbiorczym z tektury, Paczka (PP lub PE), Torba (natron), |

Saszeta (PE, PE/PP, PP lub papier/PE) w opakowaniach zbiorczych: pudełko (karton), torebka (natron) lub wiaderko (PE/HDPE) z pokrywą,

Wiaderko (PE lub PP) z pokrywą,

Pudełko (karton) z wewnętrzną torebką lub wyściółką (PE lub PP),

Fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE lub PP) (20g-40g) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudełko lub termozgrzewalną folię.

2. Przynęta w saszetkach foliowych (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/aluminium) o masie 10g – 40g , pakowane w:

Saszeta (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w opakowaniu zbiorczym z tektury lub płyty pilśniowej,

Paczka (PP lub PE),

Pojemnik (HDPE),

Torba (natron),

Worek tkany (PP),

Wiadro (PP lub PE),

Tuba (PP lub PE),

Fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE lub PP) (20g-40g) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w kartonowe pudełko lub termozgrzewalną folię.

Worek (PET/PE, PP/PE, papier/PE),

Pudełko (karton) z wewnętrzną torebką lub wyściółką (PE lub PP),

| |
|---|
| Saszeta (PE, PE/PP, PP lub papier/PE) w opakowaniach zbiorczych: pudełko (karton), torebka (natron) lub wiaderko (PP/HDPE) z pokrywą, |
|---|

| |
|--|
| 3. Wsad (20g-40g) z uszczelnioną termicznie pokrywą zapakowany w fabrycznie napełnionej stacji deratyzacyjnej (HDPE lub PP) z możliwością wielokrotnego napełnienia, |
|--|

| |
|--|
| zapakowane w kartonowe pudełko, plastikowe opakowanie zgrzewane lub termozgrzewalną folię. |
|--|

| |
|--|
| 4. Wsad (PVC, PS, PP lub PET) (20g-40g) z uszczelnioną termicznie pokrywą (PVC, PS, PP, PET) do stosowania w stacjach deratyzacyjnych. |
|--|

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2. Zastosowanie 2: Zwalczenie szczurów wewnątrz budynków przez użytkownika powszechnego

| | |
|---|--|
| Grupa produktowa | PT14: Rodentycydy |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem | - |
| Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju) | Nazwa naukowa: <i>Rattus norvegicus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: szczur wędrowny Etap rozwoju: inne: - |
| Obszar(y) zastosowania | użytkowanie w pomieszczeniach Wewnątrz budynków. |
| Sposób(-oby) nanoszenia | Metoda: inne: -- Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania | Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: 100-200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 5 m. |
| Kategoria(-e) użytkowników | ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści) |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | Maksymalna wielkość opakowania zbiorczego wynosi 150g. 1. Przynęta w saszetkach (papier) o masie 10g - 20g, pakowane w: Saszeta (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w opakowaniu zbiorczym z tektury, Paczka (PP lub PE), Torba (natron), |

Saszeta (PE, PE/PP, PP lub papier/PE) w opakowaniach zbiorczych: pudełko (karton), torebka (natron) lub

wiaderko (PE/HDPE) z pokrywą,

Wiaderko (PE lub PP) z pokrywą,

Pudełko (karton) z wewnętrzną torebką lub wyściółką (PE lub PP),

Fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE lub PP) (100-150g) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudełko lub termozgrzewalną folię.

2. Przynęta w saszetkach foliowych (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/aluminium) o masie 10g – 40g pakowane w:

Saszeta (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w opakowaniu zbiorczym z tektury,

Paczka (PP lub PE),

Pojemnik (HDPE),

Torba (natron),

Worek tkany (PP),

Wiadro (PP lub PE),

Tuba (PP lub PE),

Fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE lub PP) (100g-150g) z możliwością wielokrotnego napełniania,

pakowana w kartonowe pudełko lub termozgrzewalną folię.

| | |
|--|--|
| | <p>Worek (PET/PE, PP/PE, papier/PE),</p> <p>Pudełko (karton) z wewnętrzną torebką lub wyściółką (PE lub PP),</p> <p>Saszeta (PE, PE/PP, PP lub papier/PE) w opakowaniach zbiorczych: pudełko (karton), torebka (natron) lub wiaderko (PP/HDPE) z pokrywą,</p> <p>3. Wsad (100g-150g) z uszczelnioną termicznie pokrywą zapakowany w fabrycznie napełnionej stacji deratyzacyjnej (HDPE lub PP) z możliwością wielokrotnego napełnienia, zapakowane w kartonowe pudełko, plastikowe opakowanie zgrzewane lub termozgrzewalną folię.</p> <p>4. Wsad (100g-150g) (PVC, PS, PP lub PET) z uszczelnioną termicznie pokrywą (PVC, PS, PP, PET) do stosowania w stacjach deratyzacyjnych.</p> |
|--|--|

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach
patrz sekcja 5.3

4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania
patrz sekcja 5.4

4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania
patrz sekcja 5.5

4.3. Opis zastosowań

Tabela 3. Zastosowanie 3: Zwalczenie szczurów wokół budynków przez użytkownika powszechnego:

| | |
|---|---|
| Grupa produktowa | PT14: Rodentycydy |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem | - |
| Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju) | Nazwa naukowa: <i>Rattus norvegicus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: szczur wędrowny Etap rozwoju: inne: - |
| Obszar(y) zastosowania | użytkowanie na zewnątrz wokół budynków |
| Sposób(-oby) nanoszenia | Metoda: W karmnikach deratyzacyjnych Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych 100-200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 5 m. |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania | Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: 100-200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 5 m. |

| | |
|---|---|
| | |
| Kategoria(-e) użytkowników | ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści) |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | <p>Maksymalna wielkość opakowania zbiorczego wynosi 150g.</p> <p>1. Przynęta w saszetkach (papier) o masie 10g - 20g,</p> <p>pakowane w:</p> <p>Saszeta (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w opakowaniu zbiorczym z tektury,</p> <p>Paczka (PP lub PE),</p> <p>Torba (natron),</p> <p>Saszeta (PE, PE/PP, PP lub papier/PE) w opakowaniach zbiorczych: pudełko (karton), torebka (natron) lub wiaderko (PE/HDPE) z pokrywą,</p> <p>Wiaderko (PE lub PP) z pokrywą,</p> <p>Pudełko (karton) z wewnętrzną torebką lub wyściółką (PE lub PP),</p> <p>Fabrycznie (100g-150g) napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE lub PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w pudełko lub termozgrzewalną folię.</p> <p>2. Przynęta w saszetkach foliowych (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/aluminium) o masie 10g – 40g , pakowane w:</p> <p>Saszeta (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w opakowaniu zbiorczym z tektury,</p> <p>Paczka (PP lub PE),</p> <p>Pojemnik (HDPE),</p> <p>Torba (natron),</p> <p>Worek tkany (PP),</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Wiadro (PP lub PE),</p> <p>Tuba (PP lub PE),</p> <p>Fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE lub PP) (100g-150g) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w kartonowe pudełko lub termozgrzewalną folię. Worek (PET/PE, PP/PE, papier/PE),</p> <p>Pudełko (karton) z wewnętrzną torebką lub wyściółką (PE lub PP), Saszeta (PE, PE/PP, PP lub papier/PE) w opakowaniach zbiorczych: pudełko (karton), torebka (natron) lub wiaderko (PP/HDPE) z pokrywą.</p> <p>3. Wsad (100g-150g) z uszczelnioną termicznie pokrywą zapakowany w fabrycznie napełnionej stacji deratyzacyjnej (HDPE lub PP) z możliwością wielokrotnego napełnienia, zapakowane w kartonowe pudełko, plastikowe opakowanie zgrzewane lub termozgrzewalną folię.</p> <p>4. Wsad (100g-150g) (PVC, PS, PP lub PET) z uszczelnioną termicznie pokrywą (PVC, PS, PP, PET) do stosowania w stacjach deratyzacyjnych</p> |
|--|--|

4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Stacje deratyzacyjne powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem, itp.).
- Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.
- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia czy przynęta została pobrana, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.
- Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.3.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- W przypadku umieszczenia stacji deratyzacyjnych w pobliżu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, cieków wodnych, wałów, rowów nawadniających) lub systemów drenujących należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.3.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.4. Opis zastosowań

Tabela 4. Zastosowanie 4: Zwalczanie myszy wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego:

| | |
|---|---|
| Grupa produktowa | PT14: Rodentycydy |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem | - |
| Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju) | Nazwa naukowa: <i>Mus musculus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: mysz domowa Etap rozwoju: inne: - |
| Obszar(y) zastosowania | użytkowanie w pomieszczeniach - |
| Sposób(-oby) nanoszenia | Metoda: W karmnikach deratyzacyjnych Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych 20-40 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 5 m. |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania | Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - |

| | |
|---|---|
| | <p>Liczba i harmonogram aplikacji: 20-40 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 5 m.</p> |
| Kategoria(-e) użytkowników | profesjonalny |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | <p>This page contains the following errors:error on line 1 at column 845: PCDATA invalid Char value 2 Below is a rendering of the page up to the first error. Maksymalna wielkość opakowania zbiorczego wynosi 25 kg.</p> <p>1. Przynęta w saszetkach foliowych (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/aluminium) o masie 10g, 25g, 30g, 40g, pakowane w:</p> <p>Saszeta (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w opakowaniu zbiorczym</p> <p>z tektury lub płyty pilśniowej, o pojemności 20 kg,</p> <p>Paczka (PE lub PP) o pojemności do 25 kg,</p> <p>Pojemnik (HDPE) o pojemności do 25 kg,</p> <p>Worek (natron) o pojemności do 25 kg,</p> <p>Worek tkany (PP) o pojemności do 25 kg,</p> <p>Wiaderko (PP lub PE) o pojemności do 20 kg,</p> |

4.4.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia czy przynęta została pobrana, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

4.4.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.4.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

4.4.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.4.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.5. Opis zastosowań

Tabela 5. Zastosowanie 5: Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego:

| | |
|---|---|
| Grupa produktowa | PT14: Rodentycydy |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem | - |
| Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju) | Nazwa naukowa: <i>Rattus norvegicus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: szczur wędrowny Etap rozwoju: inne: - |
| Obszar(y) zastosowania | użytkowanie w pomieszczeniach - |
| Sposób(-oby) nanoszenia | Metoda: W karmnikach deratyzacyjnych Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych 100-200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest |

| | |
|---|--|
| | więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 5 m. |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania | <p>Stosowana dawka: -</p> <p>Rozcieńczenie (%): -</p> <p>Liczba i harmonogram aplikacji:</p> <p>100-200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 5 m.</p> |
| Kategoria(-e) użytkowników | profesjonalny |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | <p>Minimalna wielkość opakowania zbiorczego wynosi 1 kg. Maksymalna wielkość opakowania zbiorczego wynosi 25 kg.</p> <p>1. Przynęta w saszetkach foliowych (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/aluminium) o masie 10g, 25g, 30g, 40g, 50g, 100g lub 200g , pakowane w:</p> <p>Saszeta (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w opakowaniu zbiorczym z tektury lub płyty pilśniowej, o pojemności 20 kg, Paczka (PE lub PP) o pojemności do 25 kg, Pojemnik (HDPE) o pojemności do 25 kg Worek (natron) o pojemności do 25 kg, Worek tkany (PP) o pojemności do 25 kg, Wiaderko (PP lub PE) o pojemności do 20 kg, Fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna (HDPE) (o pojemności do 200 g) z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w termozgrzewalną folię, w opakowaniu zewnętrznym (karton) o pojemności do 20 kg, Worek (PET/PE, PP/PE, papier/PE), o pojemności do 10 kg, Kanister (PP) z nakrętką z zabezpieczeniem przed manipulacją, o pojemności do 10kg, Pudełko (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torebką lub wyściółką (PE lub PP) o pojemności do 20 kg, Torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) z wewnętrzną torebką (natron) lub wiadro (PP/HDPE) z pokrywą, pojemności do 25 kg, Wsad (zawierający do 200 g) (PVC, PS, PP, PET) z uszczelnioną termicznie pokrywą (PET/PP, PET/PE, PP) zapakowany w fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE lub PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, zapakowane w opakowanie zewnętrzne (karton), w termozgrzewalną torbę lub termozgrzewalną folię, o pojemności do 20 kg.</p> <p>2. Przynęta pakowana luzem w opakowaniu zbiorczym: Paczka (PP lub PE) o pojemności do 10 kg, Torba (natron) o pojemności do 10 kg, Wiaderko (PE lub PP) z pokrywą o pojemności do 10 kg, Pudełko (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torebką lub wyściółką (PE lub PP) o pojemności do 10 kg,</p> |

| | |
|--|---|
| | Torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) z wewnętrzną torebką (natron) lub wiadro (PP/HDPE) z pokrywą, pojemności do 10 kg. |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | Maksymalna pojemność opakowań zawierających przynętę luzem jest ograniczona do 10kg. W przypadku większej pojemności opakowań rynkowych, zawartość powinna być podzielona na opakowania o masie ≤ 10 kg. |
|--|---|

4.5.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia czy przynęta została pobrana, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

4.5.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.5.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

4.5.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.5.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.6. Opis zastosowań

Tabela 6. Zastosowanie 6: Zwalczanie myszy i/lub szczurów wokół budynków przez użytkownika profesjonalnego:

| | |
|---|--|
| Grupa produktowa | PT14: Rodentycydy |
| W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem | - |
| Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju) | Nazwa naukowa: <i>Mus musculus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: mysz domowa Etap rozwoju: inne: - Nazwa naukowa: <i>Rattus norvegicus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: szczur wędrowny Etap rozwoju: inne: - |
| Obszar(y) zastosowania | użytkowanie na zewnątrz Wokół budynków |
| Sposób(-oby) nanoszenia | Metoda: W karmnikach deratyzacyjnych Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. |
| Stosowane dawki i częstotliwość stosowania | Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: Zwalczanie myszy: 20-40 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 5 m. Zwalczanie szczurów: 100-200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 5 m. |
| Kategoria(-e) użytkowników | profesjonalny |
| Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe | Minimalna wielkość opakowania zbiorczego wynosi 1 kg. Maksymalna wielkość opakowania zbiorczego wynosi 25 kg. 1. Przynęta w saszetkach foliowych (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/aluminium) o masie 10g, 25g, 30g, 40g, 50g, 100g lub 200g, pakowane w: |

Saszeta (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w opakowaniu zbiorczym z tektury lub płyty pilśniowej, o pojemności 20 kg,

Paczka (PE lub PP) o pojemności do 25 kg,

Pojemnik (HDPE) o pojemności do 25 kg,

Worek (natron) o pojemności do 25 kg,

Worek tkany (PP) o pojemności do 25 kg,

Wiaderko (PP lub PE) o pojemności do 20 kg

Fabrycznie napełniona stacja deratyzacyjna z możliwością wielokrotnego napełniania, pakowana w termozgrzewalną folię, w opakowaniu zewnętrznym (karton) o pojemności do 20 kg, Worek (PET/PE, PP/PE, papier/PE), o pojemności do 10 kg,

Kanister (PP) z nakrętką z zabezpieczeniem przed manipulacją, o pojemności do 10kg,

Pudełko (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torebką lub wyściółką (PE lub PP) o pojemności do 20 kg,

Torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) z wewnętrzną torebką (natron) lub wiadro (PP/HDPE) z pokrywą, pojemności do 25 kg,

Wsad (zawierający do 200 g) (PVC, PS, PP, PET) z uszczelnioną termicznie pokrywą (PET/PP, PET/PE, PP) zapakowany w fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE lub PP) z możliwością wielokrotnego napełniania, zapakowane w opakowanie zewnętrzne (karton), w termozgrzewalną torbę lub termozgrzewalną folię, o pojemności do 20 kg.

2. Przynęta pakowana luzem w opakowaniu zbiorczym:

Paczka (PP lub PE) o pojemności do 10 kg,

Torba (natron) o pojemności do 10 kg,

Wiaderko (PE lub PP) z pokrywą o pojemności do 10 kg,

Pudełko (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torebką lub wyściółką (PE lub PP) o pojemności do 10 kg,

Torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) z wewnętrzną torebką (natron) lub wiadro (PP/HDPE) z pokrywą, pojemności do 10 kg.

Maksymalna pojemność opakowań zawierających przynętę luzem jest ograniczona do 10kg. W przypadku większej pojemności opakowań rynkowych, zawartość powinna być podzielona na opakowania o masie ≤ 10 kg

4.6.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Stacje deratyzacyjne powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem, itp.).
- Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.
- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na początku okresu zwalczania myszy oraz przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania szczurów, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia czy przynęta została pobrana, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie.
- Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

4.6.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Nie stosować produktu bezpośrednio do nor gryzoni.

4.6.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- W przypadku umieszczenia stacji deratyzacyjnych w pobliżu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, cieków wodnych, wałów, rowów nawadniających) lub systemów drenażowych należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

4.6.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.6.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA¹

5.1. Instrukcje stosowania

Użytkownik powszechny:

- Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży.
- Przed zastosowaniem produktów gryzoniobójczych należy rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).
- Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności).
- Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.
- Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.).
- Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur.
- Przynęty nie należy wyjmować z saszetek.
- Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe.
- Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt.
- Nie umieszczać stacji deratyzacyjnych w pobliżu miejsc, w których mogą mieć one kontakt z wodami powierzchniowymi.
- Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.
- Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znaną poza stacjami.

Użytkownik profesjonalny:

- Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży.
- Przed zastosowaniem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występują gryzonie, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i stopnia infestacji gryzoni.
- Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności).
- Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.
- Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną oraz, gdzie to możliwe, przy zastosowaniu niechemicznych metod kontroli.
- W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).
- Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.).
- Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur.
- Stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają produkty gryzoniobójcze, i że nie wolno przy nich manipulować (patrz sekcja 5.3 - informacje, które należy zamieszczać na etykietach).
- Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.

¹Instrukcje stosowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych zezwoleniem.

- Tam gdzie jest to możliwe zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona.
 - Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe.
 - Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt.
 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne wykonane z (posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału) – dodatkowo, jeśli wynika to z oceny ryzyka należy wymienić inne środki ochrony indywidualnej takie jak i maskę ochronną, okulary ochronne.
 - Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 - Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.
 - Jeżeli spożycie przynęty jest zbyt niskie w porównaniu do oszacowanego stopnia infestacji gryzoni, należy rozważyć przeniesienie stacji deratyzacyjnych w inne miejsca lub zmianę postaci użytkowej produktu.
- Jeżeli po upływie 35 dni od rozpoczęcia zwalczania gryzoni przynęta jest w dalszym ciągu zjadana, a aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności zabiegu. Jeżeli stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na brodifakum należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydów. Należy również rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).
 - Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znaną poza stacjami.
 - W celu zmniejszenia pylenia produktu, wykladać przynętę za pomocą miarki. Należy podać metody ograniczające pylenie produktu (np. wycieranie na mokro).

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Użytkownik powszechny

- W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).
- Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).
- Etykieta i (lub) ulotka powinna zawierać wyraźne zalecenia, że:
 - o dozwolone jest stosowanie produktu w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem stacjach deratyzacyjnych;
 - o stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować, poprzez umieszczenie informacji, o których mowa w sekcji 5.3 charakterystyki produktu biobójczego (np. „stacje należy oznakować zgodnie z zaleceniami dla produktu”).
- W przypadku stosowania produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty, gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 35 dni. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy powiadomić dostawcę/sprzedawcę produktu lub skonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się deratyzacją.
- W trakcie zabiegu deratyzacji (przynajmniej podczas każdej inspekcji) należy wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie.
- Padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. (Taka sama informacja powinna znajdować się w treści oznakowania opakowania).

Użytkownik profesjonalny:

- O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postronne (np. użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji (zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM)).

- Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie przez cały okres deratyzacji (np. przynajmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli zaistnieje taka potrzeba).
- Nie stosować produktu dłużej niż 35 dni bez wcześniejszej oceny stopnia infestacji i skuteczności zwalczania gryzoni.
- Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).
- Etykieta i (lub) ulotka powinna zawierać wyraźne zalecenia, że:
 - o produkt nie powinien być udostępniany użytkownikom powszechnym (np. „jedynie dla użytkowników profesjonalnych”),
 - o dozwolone jest stosowanie produktu wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych (np. „stosować wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych”),
 - o stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować, poprzez umieszczenie informacji, o których mowa w sekcji 5.3 charakterystyki produktu biobójczego (np. „stacje należy oznakować zgodnie z zaleceniami dla produktu”).
- Zastosowanie tego produktu powinno zwalczyć gryzonie w ciągu 35 dni.
- Etykieta i (lub) ulotka powinna zawierać wyraźne zalecenia, żeby w przypadku podejrzenia braku skuteczności produktu pod koniec okresu zwalczania gryzoni (np. odnotowania dalszej aktywności gryzoni) użytkownik skonsultował się z dostawcą/sprzedawcą lub skontaktował się ze specjalistyczną firmą zajmującą się deratyzacją.
- W trakcie zabiegu nie należy myć wodą stacji deratyzacyjnych.
- Padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. (Taka sama informacja powinna znajdować się w treści oznakowania opakowania).

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Skutki uboczne/działania niepożądane:

Produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i moczu.

Antidotum: Witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny/weterynaryjny.

Pierwsza pomoc:

W przypadku:

- kontaktu ze skórą: splukać skórę wodą, a następnie umyć wodą z mydłem.
- kontaktu z oczami: przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 10 minut.
- kontaktu z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Oznakowania na stacjach deratyzacyjnych muszą zawierać następujące informacje:

„Nie przenosić ani nie otwierać”; „Zawiera substancję gryzoniobójczą”; „Nazwa produktu lub nr pozwolenia”; „Substancja czynna” i „W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruc (należy podać numery telefonów do ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruc produktami biobójczymi)”.

Środki ochrony środowiska:

- W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami (przekazać firmie uprawnionej do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych).
- Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu po zastosowaniu (w tym przynętę znaną poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie uprawnionej do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. (Taka sama informacja powinna znajdować się w treści oznakowania opakowania).
- W przypadku użytkownika powszechnego zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych. Przechowywać z dala od światła słonecznego.

Długość okresu przechowywania: do 24 miesięcy od daty produkcji w temperaturze pokojowej

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Ze względu na mechanizm działania substancji należących do grupy antykoagulantów

skutki zastosowania produktów gryzoniobójczych je zawierających można

zaobserwować po upływie 4-10 dni po spożyciu przynęty.

Gryzonie mogą przenosić choroby. Padłe gryzonie i przynętę należy usuwać, stosując

rękawice ochronne lub narzędzia, np. szczypce.

Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia oraz barwnik.

STOT RE 2

GHS08 - Uwaga