

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

Familienaam: DeLaval iodine-based teat disinfectant family

Productsoort(en): PT 03 - Dierhygiëne

Toelatingsnummer:

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0013188-0000

Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	2
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - meta SPC 1: Metafamily 1	2
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	3
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	3
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	9
6. Overige informatie	10
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	10
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - meta SPC 2: Metafamily 2	12
2. Samenstelling van de meta-SPC	12
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	13
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	13
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	18
6. Overige informatie	20
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	20
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - meta SPC 3: Metafamily 3	25
2. Samenstelling van de meta-SPC	25
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	26
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	26
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	31
6. Overige informatie	32
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	33
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - meta SPC 4: Metafamily 4	34
2. Samenstelling van de meta-SPC	35
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	35

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	35
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	41
6. Overige informatie	42
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	42
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - meta SPC 5: Metafamily 5	43
2. Samenstelling van de meta-SPC	43
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	44
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	44
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	50
6. Overige informatie	51
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	51
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - meta SPC 6: Metafamily 6	53
2. Samenstelling van de meta-SPC	54
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	54
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	54
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	60
6. Overige informatie	61
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	61
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - meta SPC 7: Metafamily 7	62
2. Samenstelling van de meta-SPC	62
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	63
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	63
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	69
6. Overige informatie	70
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	70

Deel I.- Eerste informatieniveau

1. Administratieve informatie

1.1. Familiennaam

DeLaval iodine-based teat disinfectant family

1.2. Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam

DeLaval NV

Adres

Industriepark-Drongen 10 9031 Gent België

Toelatingsnummer

Referentienummer van de asset in R4BP 3

NL-0013188-0000

Toelatingsdatum

02/08/2019

Vervaldatum

01/08/2029

1.4. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

DeLaval NV

Adres van de fabrikant

Industriepark-Drongen 10 9031 Gent België

Productielocatie

Industriepark-Drongen 10 9031 Gent België

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1319 - Jood
Naam van de fabrikant	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Adres van de fabrikant	Supplier EU: SQM Europe NV - Sint-Pietersvliet 7 bus 8 2000 Antwerpen België
Productielocatie	Los Militares 4290 Piso 4 8320000 Las Condes (Santiago) Chili

2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15 - 0,75
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		0 - 6,34
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,06 - 0,33

2.2. Soort(en) formulering

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
SL - Met water mengbaar concentraat

Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 1: Metafamily 1

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

1.3 Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,21 - 0,25
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		0 - 0
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,092 - 0,12

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorkom lozing in het milieu.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Speendesinfectie, kant-en-klare dipmiddelen handmatig aangebracht.

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door handmatig dippen met een dipbeker.
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Bus Kunststof: HDPE 5L Bus Kunststof: HDPE 10L Bus Kunststof: HDPE 20L Bus Kunststof: HDPE 60L Vat Kunststof: HDPE 200L IBC Kunststof: HDPE 1000L

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzing:

Het is aanbevolen om handschoenen te dragen tijdens het melken en de toepassing, voor een hygiënische melkwinning en om de huid te beschermen.

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone dipbeker.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

DIPPEN: dip elke speen in het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de dipbeker bij indien nodig.

Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Er zijn geen gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Speendesinfectie, kant-en-klare spraymiddelen handmatig aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne																		
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie																		
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>																		
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren</p>																		
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door sprayen met behulp van een sprayflacon.																		
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% -</p> <p>Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.</p>																		
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel																		
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<table> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>5L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>10L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>20L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>60L</td> </tr> <tr> <td>Vat</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>200L</td> </tr> <tr> <td>IBC</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>1000L</td> </tr> </table>	Bus	Kunststof: HDPE	5L	Bus	Kunststof: HDPE	10L	Bus	Kunststof: HDPE	20L	Bus	Kunststof: HDPE	60L	Vat	Kunststof: HDPE	200L	IBC	Kunststof: HDPE	1000L
Bus	Kunststof: HDPE	5L																	
Bus	Kunststof: HDPE	10L																	
Bus	Kunststof: HDPE	20L																	
Bus	Kunststof: HDPE	60L																	
Vat	Kunststof: HDPE	200L																	
IBC	Kunststof: HDPE	1000L																	

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzingen:

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone applicator.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor het gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

1) HANDMATIG SPRAYEN: elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de sprayflacon bij indien nodig.

2) AUTOMATISCH SPRAYEN: Elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product.

Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik chemisch resistente handschoenen (handschoenmateriaal moet door toelatingshouder in de productinformatie worden gespecificeerd) wanneer de speendesinfectie na het melken gebeurt door middel van handmatig sprayen.

Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Speendesinfectie, kant-en-klare dip- of spraymiddelen automatisch aangebracht

Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Speendesinfectie

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Bacteriën
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>																		
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.</p>																		
Toepassingsmethode(n)	<p>Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt automatisch op de spenen aangebracht na het melken door melkmachines met een geïntegreerd dip- of spraysysteem.</p>																		
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 3 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.</p>																		
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Professioneel</p>																		
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<table> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>5L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>10L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>20L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>60L</td> </tr> <tr> <td>Vat</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>200L</td> </tr> <tr> <td>IBC</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>1000L</td> </tr> </table>	Bus	Kunststof: HDPE	5L	Bus	Kunststof: HDPE	10L	Bus	Kunststof: HDPE	20L	Bus	Kunststof: HDPE	60L	Vat	Kunststof: HDPE	200L	IBC	Kunststof: HDPE	1000L
Bus	Kunststof: HDPE	5L																	
Bus	Kunststof: HDPE	10L																	
Bus	Kunststof: HDPE	20L																	
Bus	Kunststof: HDPE	60L																	
Vat	Kunststof: HDPE	200L																	
IBC	Kunststof: HDPE	1000L																	

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Er zijn geen gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Er zijn geen algemene gebruiksaanwijzingen. Lees de gebruik-specifieke instructies.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Indien een combinatie van desinfectie voor en na het melken noodzakelijk is, overweeg dan het gebruik van een ander product zonder jodium voor de desinfectie voor het melken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Directe/Indirecte effecten:

Volgens onze ervaring en de aan ons verstrekte informatie heeft het product geen schadelijke effecten bij gebruik en verwerking volgens de specificaties.

- Eerste hulp maatregelen:

Na contact met de ogen: grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Na contact met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kledij en schoenen uittrekken.

Na inslikken: Mond met water uitspoelen. Onmiddellijk arts raadplegen indien zich symptomen voordoen en/of grote hoeveelheden werden ingeslikt.

Na inademing: In de frisse lucht brengen

- Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.
Insluitings-en reinigingsmethoden en -materiaal: Indammen. Absorberen met inert absorberend materiaal. Voorkomen dat product in afvoersystemen komt. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Na afloop van de behandeling dient u ongebruikt product en de verpakking volgens de lokale regelgeving af te voeren. Gebruikt product kan afhankelijk van de lokale regelgeving, op een gemeentelijk riool geloosd worden of naar het mestdepot worden afgevoerd. Voorkom lozing naar een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) systeem.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslag: Rechtop, in de goed afgesloten oorspronkelijke verpakking bewaren. Bescherm tegen direct licht, temperaturen boven 30 °C en vorst.

Houdbaarheid: 1 jaar

6. Overige informatie

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Tri-Fender

Marktgebied: EU

Tri-Fender	Marktgebied: CH
Tri-Fender	Marktgebied: IS
Tri-Fender	Marktgebied: NO
Toelatingsnummer (Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating) NL-0013188-0001 1-1	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alcohol ethoxylaat			68439-46-3		0
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,12

Handelsnaam

TriActive	Marktgebied: DK
Toelatingsnummer (Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating) NL-0013188-0002 1-1	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,214

Alcohol ethoxylaar	68439-46-3		0
Natrium jodide	7681-82-5	231-679-3	0,092

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 2: Metafamily 2

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-2

1.3 Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,23 - 0,25
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		0 - 0
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,097 - 0,11

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Bevat natriumjodaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Voorkom lozing in het milieu.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Speendesinfectie, kant-en-klare dipmiddelen handmatig aangebracht

Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Speendesinfectie

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Bacteriën
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Gisten
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Virussen
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.

Toepassingsmethode(n)

Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door handmatig dippen met een dipbeker.

ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% -

Dosering en frequentie van de toepassing

Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bus	Kunststof: HDPE	5L
Bus	Kunststof: HDPE	10L
Bus	Kunststof: HDPE	20L
Bus	Kunststof: HDPE	60L
Vat	Kunststof: HDPE	200L
IBC	Kunststof: HDPE	1000L

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzingen:

Het is aanbevolen om handschoenen te dragen tijdens het melken en de toepassing, voor een hygiënische melkwinning en om de huid te beschermen.

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone dipbeker.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

DIPPEN: dip elke speen in het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de dipbeker bij indien nodig.

Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Er zijn geen gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Speendesinfectie, kant-en-klare spraymiddelen handmatig aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door sprayen met behulp van een sprayflacon.
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bus	Kunststof: HDPE	5L
Bus	Kunststof: HDPE	10L
Bus	Kunststof: HDPE	20L
Bus	Kunststof: HDPE	60L
Vat	Kunststof: HDPE	200L
IBC	Kunststof: HDPE	1000L

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzingen:

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone applicator.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor het gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

1) HANDMATIG SPRAYEN: elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de sprayflacon bij indien nodig.

2) AUTOMATISCH SPRAYEN: Elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product.

Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik chemisch resistente handschoenen (handschoenmateriaal moet door toelatingshouder in de productinformatie worden gespecificeerd) wanneer de speendesinfectie na het melken gebeurt door middel van handmatig sprayen.

Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Speendesinfectie, kant-en-klare dip- of spraymiddelen automatisch aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne																		
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie																		
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>																		
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.</p>																		
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt automatisch op de spenen aangebracht na het melken door melkmachines met een geïntegreerd dip- of spraysysteem.																		
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 3 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.																		
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel																		
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<table border="0"> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>5L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>10L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>20L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>60L</td> </tr> <tr> <td>Vat</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>200L</td> </tr> <tr> <td>IBC</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>1000L</td> </tr> </table>	Bus	Kunststof: HDPE	5L	Bus	Kunststof: HDPE	10L	Bus	Kunststof: HDPE	20L	Bus	Kunststof: HDPE	60L	Vat	Kunststof: HDPE	200L	IBC	Kunststof: HDPE	1000L
Bus	Kunststof: HDPE	5L																	
Bus	Kunststof: HDPE	10L																	
Bus	Kunststof: HDPE	20L																	
Bus	Kunststof: HDPE	60L																	
Vat	Kunststof: HDPE	200L																	
IBC	Kunststof: HDPE	1000L																	



4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Er zijn geen gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Er zijn geen algemene gebruiksaanwijzingen. Lees de gebruik-specifieke instructies.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Indien een combinatie van desinfectie voor en na het melken noodzakelijk is, overweeg dan het gebruik van een ander product zonder jodium voor de desinfectie voor het melken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Directe/Indirecte effecten:

Volgens onze ervaring en de aan ons verstrekte informatie heeft het product geen schadelijke effecten bij gebruik en verwerking volgens de specificaties.

- Eerste hulp maatregelen:

Na contact met de ogen: grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Na contact met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kledij en schoenen uittrekken.

Na inslikken: Mond met water uitspoelen. Onmiddellijk arts raadplegen indien zich symptomen voordoen en/of grote hoeveelheden werden ingeslikt.

Na inademing: In de frisse lucht brengen

- Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Indammen. Absorberen met inert absorberend materiaal. Voorkomen dat product in afvoersystemen komt. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Na afloop van de behandeling dient u ongebruikt product en de verpakking volgens de lokale regelgeving af te voeren. Gebruikt product kan afhankelijk van de lokale regelgeving, op een gemeentelijk riool geloosd worden of naar het mestdepot worden afgevoerd. Voorkom lozing naar een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) systeem

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslag: Rechtop, in de goed afgesloten oorspronkelijke verpakking bewaren. Bescherm tegen direct licht, temperaturen boven 30 °C en vorst.

Houdbaarheid: 1 jaar

6. Overige informatie

--

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Blockade	Marktgebied: HR
Blockade	Marktgebied: DK
Blockade	Marktgebied: FR
Blockade	Marktgebied: IT
Blockade	Marktgebied: ES

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

NL-0013188-0003 1-2

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		0
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,1

Handelsnaam

IodoFence	Marktgebied: AT
IodoFence	Marktgebied: BE
IodoFence	Marktgebied: BG
IodoFence	Marktgebied: HR
IodoFence	Marktgebied: CY
IodoFence	Marktgebied: CZ
IodoFence	Marktgebied: DK
IodoFence	Marktgebied: EE
IodoFence	Marktgebied: FI
IodoFence	Marktgebied: FR
IodoFence	Marktgebied: DE
IodoFence	Marktgebied: HU
IodoFence	Marktgebied: IE
IodoFence	Marktgebied: IT

IodoFence	Marktgebied: LV
IodoFence	Marktgebied: LT
IodoFence	Marktgebied: LU
IodoFence	Marktgebied: MT
IodoFence	Marktgebied: NL
IodoFence	Marktgebied: PL
IodoFence	Marktgebied: PT
IodoFence	Marktgebied: RO
IodoFence	Marktgebied: SK
IodoFence	Marktgebied: SI
IodoFence	Marktgebied: ES
IodoFence	Marktgebied: SE
IodoFence	Marktgebied: GB
IodoFence	Marktgebied: CH
IodoFence	Marktgebied: NO

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

NL-0013188-0004 1-2

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		0
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,11

Handelsnaam

Fortex	Marktgebied: AT
Fortex	Marktgebied: HR
Fortex	Marktgebied: CZ
Fortex	Marktgebied: DK
Fortex	Marktgebied: EE
Fortex	Marktgebied: FI
Fortex	Marktgebied: FR
Fortex	Marktgebied: DE

Fortex	Marktgebied: HU
Fortex	Marktgebied: IT
Fortex	Marktgebied: LV
Fortex	Marktgebied: LT
Fortex	Marktgebied: LU
Fortex	Marktgebied: NL
Fortex	Marktgebied: PL
Fortex	Marktgebied: PT
Fortex	Marktgebied: ES
Fortex	Marktgebied: SE
Fortex	Marktgebied: CH
Fortex	Marktgebied: NO
Fortex	Marktgebied: IS
Toelatingsnummer <small>(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)</small> NL-0013188-0005 1-2	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,23
Alcohol ethoxylaat			68439-46-3		0
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,097

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 3: Metafamily 3

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-3

1.3 Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15 - 0,15
Alcohol ethoxylaat			68439-46-3		1,25 - 1,25
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,065 - 0,065

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Speendesinfectie, kant-en-klare dipmiddelen handmatig aangebracht

Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Speendesinfectie

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Bacteriën
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Gisten
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Virussen
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.

Toepassingsmethode(n)

Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door handmatig dippen met een dipbeker.

Dosering en frequentie van de toepassing

ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% -
Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bus	Kunststof: HDPE	5L
Bus	Kunststof: HDPE	10L
Bus	Kunststof: HDPE	20L
Bus	Kunststof: HDPE	60L
Vat	Kunststof: HDPE	200L
IBC	Kunststof: HDPE	1000L

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzing:

Het is aanbevolen om handschoenen te dragen tijdens het melken en de toepassing, voor een hygiënische melkwinning en om de huid te beschermen.

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone dipbeker.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen: DIPPEN: dip elke speen in het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de dipbeker bij indien nodig.

Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Er zijn geen gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Speendesinfectie, kant-en-klare spraymiddelen handmatig aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door sprayen met behulp van een sprayflacon.
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bus	Kunststof: HDPE	5L
Bus	Kunststof: HDPE	10L
Bus	Kunststof: HDPE	20L
Bus	Kunststof: HDPE	60L
Vat	Kunststof: HDPE	200L
IBC	Kunststof: HDPE	1000L

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzingen:

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone applicator.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor het gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

1) HANDMATIG SPRAYEN: elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de sprayflacon bij indien nodig.

2) AUTOMATISCH SPRAYEN: Elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product.

Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik chemisch resistente handschoenen (handschoenmateriaal moet door toelatingshouder in de productinformatie worden gespecificeerd) wanneer de speendesinfectie na het melken gebeurt door middel van handmatig sprayen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Speendesinfectie, kant-en-klare dip- of spraymiddelen automatisch aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt automatisch op de spenen aangebracht na het melken door melkmachines met een geïntegreerd dip- of spraysysteem.
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 3 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Bus Kunststof: HDPE 5L Bus Kunststof: HDPE 10L Bus Kunststof: HDPE 20L Bus Kunststof: HDPE 60L Vat Kunststof: HDPE 200L IBC Kunststof: HDPE 1000L

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Er zijn geen gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Er zijn geen algemene gebruiksaanwijzingen. Lees de gebruik-specifieke instructies.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Indien een combinatie van desinfectie voor en na het melken noodzakelijk is, overweeg dan het gebruik van een ander product zonder jodium voor de desinfectie voor het melken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Directe/Indirecte effecten:

Volgens onze ervaring en de aan ons verstrekte informatie heeft het product geen schadelijke effecten bij gebruik en verwerking volgens de specificaties.

- Eerste hulp maatregelen:

Na contact met de ogen: grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Na contact met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kledij en schoenen uittrekken.

Na inslikken: Mond met water uitspoelen. Onmiddellijk arts raadplegen indien zich symptomen voordoen en/of grote hoeveelheden werden ingeslikt.

Na inademing: In de frisse lucht brengen

- Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

Insluitings-en reinigingsmethoden en -materiaal: Indammen. Absorberen met inert absorberend materiaal. Voorkomen dat product in afvoersystemen komt. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Na afloop van de behandeling dient u ongebruikt product en de verpakking volgens de lokale regelgeving af te voeren. Gebruikt product kan afhankelijk van de lokale regelgeving, op een gemeentelijk riool geloosd worden of naar het mestdepot worden afgevoerd. Voorkom lozing naar een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) systeem.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslag: Rechtop, in de goed afgesloten oorspronkelijke verpakking bewaren. Bescherm tegen direct licht, temperaturen boven 30 °C en vorst.

Houdbaarheid: 1 jaar

6. Overige informatie

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Dipal RTU	Marktgebied: AT
Dipal RTU	Marktgebied: HR
Dipal RTU	Marktgebied: CY
Dipal RTU	Marktgebied: DK
Dipal RTU	Marktgebied: EE
Dipal RTU	Marktgebied: FI
Dipal RTU	Marktgebied: FR
Dipal RTU	Marktgebied: DE
Dipal RTU	Marktgebied: GR
Dipal RTU	Marktgebied: LT
Dipal RTU	Marktgebied: MT
Dipal RTU	Marktgebied: NL
Dipal RTU	Marktgebied: BE
Dipal RTU	Marktgebied: PT

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

Dipal RTU	Marktgebied: SI
Dipal RTU	Marktgebied: ES
Dipal RTU	Marktgebied: SE
Dipal RTU	Marktgebied: NO
NL-0013188-0006 1-3	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15
Alcohol ethoxylaat			68439-46-3		1,25
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,065

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 4: Metafamily 4

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-4

1.3 Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15 - 0,15
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		1,5 - 1,5
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,11 - 0,11

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Oogbescherming dragen.

Gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Speendesinfectie, kant-en-klare dipmiddelen handmatig aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door handmatig dippen met een dipbeker.
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Bus Kunststof: HDPE 5L Bus Kunststof: HDPE 10L Bus Kunststof: HDPE 20L Bus Kunststof: HDPE 60L Vat Kunststof: HDPE 200L IBC Kunststof: HDPE 1000L

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzingen:

Het is aanbevolen om handschoenen te dragen tijdens het melken en de toepassing, voor een hygiënische melkwinning en om de huid te beschermen.

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone dipbeker.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

DIPPEN: dip elke speen in het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de dipbeker bij indien nodig.

Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik oog-/gelaatsbescherming wanneer de speendesinfectie na het melken gebeurt door middel van handmatig dippen.

Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Speendesinfectie, kant-en-klare spraymiddelen handmatig aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne																		
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie																		
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>																		
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.</p>																		
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door sprayen met behulp van een sprayflacon.																		
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.																		
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel																		
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<table border="0"> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>5L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>10L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>20L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>60L</td> </tr> <tr> <td>Vat</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>200L</td> </tr> <tr> <td>IBC</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>1000L</td> </tr> </table>	Bus	Kunststof: HDPE	5L	Bus	Kunststof: HDPE	10L	Bus	Kunststof: HDPE	20L	Bus	Kunststof: HDPE	60L	Vat	Kunststof: HDPE	200L	IBC	Kunststof: HDPE	1000L
Bus	Kunststof: HDPE	5L																	
Bus	Kunststof: HDPE	10L																	
Bus	Kunststof: HDPE	20L																	
Bus	Kunststof: HDPE	60L																	
Vat	Kunststof: HDPE	200L																	
IBC	Kunststof: HDPE	1000L																	

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzingen:
Voor handmatige toepassing: gebruik een schone applicator.
Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor het gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

1) HANDMATIG SPRAYEN: elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de sprayflacon bij indien nodig.
2) AUTOMATISCH SPRAYEN: Elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product.
Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik chemisch resistente handschoenen (handschoenmateriaal moet door toelatingshouder in de productinformatie worden gespecificeerd) en oog-/gelaatsbescherming wanneer de speendesinfectie na het melken gebeurt door middel van handmatig sprayen.
Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Speendesinfectie, kant-en-klare dip- of spraymiddelen automatisch aangebracht

Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Speendesinfectie

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Bacteriën
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Gisten
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>																		
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.</p>																		
Toepassingsmethode(n)	<p>Post-milking teat disinfection of udder teats with ready-to-use products. - Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen.</p>																		
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 3 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.</p>																		
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Professioneel</p>																		
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<table border="0"> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>5L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>10L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>20L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>60L</td> </tr> <tr> <td>Vat</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>200L</td> </tr> <tr> <td>IBC</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>1000L</td> </tr> </table>	Bus	Kunststof: HDPE	5L	Bus	Kunststof: HDPE	10L	Bus	Kunststof: HDPE	20L	Bus	Kunststof: HDPE	60L	Vat	Kunststof: HDPE	200L	IBC	Kunststof: HDPE	1000L
Bus	Kunststof: HDPE	5L																	
Bus	Kunststof: HDPE	10L																	
Bus	Kunststof: HDPE	20L																	
Bus	Kunststof: HDPE	60L																	
Vat	Kunststof: HDPE	200L																	
IBC	Kunststof: HDPE	1000L																	

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik oog-/gelaatsbescherming wanneer de speendesinfectie na het melken gebeurt door middel van automatisch dippen of sprayen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Er zijn geen algemene gebruiksaanwijzingen. Lees de gebruik-specifieke instructies.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Indien een combinatie van desinfectie voor en na het melken noodzakelijk is, overweeg dan het gebruik van een ander product zonder jodium voor de desinfectie voor het melken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Directe/Indirecte effecten:

Volgens onze ervaring en de aan ons verstrekte informatie heeft het product geen schadelijke effecten bij gebruik en verwerking volgens de specificaties.

- Eerste hulp maatregelen:

Na contact met de ogen: grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Na contact met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kledij en schoenen uittrekken.

Na inslikken: Mond met water uitspoelen. Onmiddellijk arts raadplegen indien zich symptomen voordoen en/of grote hoeveelheden werden ingeslikt.

Na inademing: In de frisse lucht brengen

- Milieuvorzorgsmaatregelen

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Indammen. Absorberen met inert absorberend materiaal. Voorkomen dat product in afvoersystemen komt. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

--

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Na afloop van de behandeling dient u ongebruikt product en de verpakking volgens de lokale regelgeving af te voeren. Gebruikt product kan afhankelijk van de lokale regelgeving, op een gemeentelijk riool geloosd worden of naar het mestdepot worden afgevoerd. Voorkom lozing naar een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) systeem.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslag: Rechtop, in de goed afgesloten oorspronkelijke verpakking bewaren. Bescherm tegen direct licht, temperaturen boven 30 °C en vorst.

Houdbaarheid: 1 jaar

6. Overige informatie

--

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Dipal Plus

Marktgebied: NL

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

NL-0013188-0007 1-4

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		1,5
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,11

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 5: Metafamily 5

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-5

1.3 Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,75 - 0,75
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		6,34 - 6,34
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,33 - 0,33

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

SL - Met water mengbaar concentraat

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan schade aan organen (schildklier) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling via orale weg.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Voorkom lozing in het milieu.
Oogbescherming dragen.
Gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Speendesinfectie; geconcentreerde dipmiddelen handmatig aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.</p>
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met een verdund concentraat. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door handmatig dippen met een dipbeker.
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 20 %; Gebruiksconcentratie: 0.15 % m/m jodium. -</p> <p>Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Fles Kunststof: HDPE 1L</p> <p>Bus Kunststof: HDPE 5L</p> <p>Bus Kunststof: HDPE 10L</p> <p>Bus Kunststof: HDPE 20L</p> <p>Bus Kunststof: HDPE 60L</p> <p>Vat Kunststof: HDPE 200L</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Gebruiksaanwijzingen:

Het is aanbevolen om handschoenen te dragen tijdens het melken en de toepassing, voor een hygiënische melkwinning en om de huid te beschermen.

Er dient een 20% verdunning te worden gemaakt met schoon water. Neem 200 ml van het geconcentreerde product en vul met water aan tot 1 liter om een eindconcentratie van 0.15% jodium te verkrijgen. Vóór gebruik moet de gebruiksooplossing naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Tijdens het bereiden van de kant-en-klare oplossing kan schuimvorming optreden. In dat geval wordt ten sterkste aanbevolen de behandeling pas te starten wanneer de hoeveelheid schuim voldoende is afgenomen.

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone dipbeker.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor gebruik.

Breng de verdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

DIPPEN: dip elke speen in het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de dipbeker bij indien nodig.

Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik oog-/gelaatsbescherming wanneer de speendesinfectie na het melken gebeurt door middel van handmatig dippen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Speendesinfectie; geconcentreerde spraymiddelen handmatig aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met een verdund concentraat. Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door sprayen met behulp van een spraycontainer. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door sprayen met behulp van een sprayflacon.
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 20 %; Gebruiksconcentratie: 0.15 % m/m jodium. - Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles Kunststof: HDPE 1L Bus Kunststof: HDPE 5L Bus Kunststof: HDPE 10L Bus Kunststof: HDPE 20L Bus Kunststof: HDPE 60L Vat Kunststof: HDPE 200L IBC Kunststof: HDPE 1000L

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Gebruiksaanwijzingen:

Er dient een 20% verdunning te worden gemaakt met schoon water. Neem 200 ml van het geconcentreerde product en vul met water aan tot 1 liter om een eindconcentratie van 0.15% jodium te verkrijgen. Vóór gebruik moet de gebruiksooplossing naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Tijdens het bereiden van de kant-en-klare oplossing kan schuimvorming optreden. In dat geval wordt ten sterkste aanbevolen de behandeling pas te starten wanneer de hoeveelheid schuim voldoende is afgenomen.

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone applicator.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor het gebruik.

Breng de verdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

1) HANDMATIG SPRAYEN: elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de sprayflacon bij indien nodig.

2) AUTOMATISCH SPRAYEN: Elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product. Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik chemisch resistente handschoenen (handschoenmateriaal moet door toelatingshouder in de productinformatie worden gespecificeerd) en oog-/gelaatsbescherming wanneer de speendesinfectie na het melken gebeurt door middel van handmatig sprayen.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Speendesinfectie; geconcentreerde dip- en spraymiddelen automatisch aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met een verdund concentraat. - Het product wordt automatisch op de spenen aangebracht na het melken door melkmachines met een geïntegreerd dip- of spraysysteem.
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 20 %; Gebruiksconcentratie: 0.15 % m/m jodium. - Toepassen na het melken, 3 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles Kunststof: HDPE 1L Bus Kunststof: HDPE 5L Bus Kunststof: HDPE 10L Bus Kunststof: HDPE 20L Bus Kunststof: HDPE 60L Vat Kunststof: HDPE 200L IBC Kunststof: HDPE 1000L

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Gebruiksaanwijzingen:

Er dient een 20% verdunning te worden gemaakt met schoon water. Neem 200 ml van het geconcentreerde product en vul met water aan tot 1 liter om een eindconcentratie van 0.15% jodium te verkrijgen. Vóór gebruik moet de gebruiksooplossing naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Tijdens het bereiden van de kant-en-klare oplossing kan schuimvorming optreden. In dat geval wordt ten sterkste aanbevolen de behandeling pas te starten wanneer de hoeveelheid schuim voldoende is afgenomen.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik oog-/gelaatsbescherming wanneer de speendesinfectie na het melken gebeurt door middel van automatisch dippen of sprayen.

Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvorschrift

Er zijn geen algemene gebruiksaanwijzingen. Lees de gebruik-specifieke instructies.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Indien een combinatie van desinfectie voor en na het melken noodzakelijk is, overweeg dan het gebruik van een ander product zonder jodium voor de desinfectie voor het melken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Directe/Indirecte effecten:

Volgens onze ervaring en de aan ons verstrekte informatie heeft het product geen schadelijke effecten bij gebruik en verwerking volgens de specificaties.

- Eerste hulp maatregelen:

Na contact met de ogen: grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Na contact met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kledij en schoenen uittrekken.

Na inslikken: Mond met water uitspoelen. Onmiddellijk arts raadplegen indien zich symptomen voordoen en/of grote hoeveelheden werden ingeslikt.

Na inademing: In de frisse lucht brengen

- Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Indammen. Absorberen met inert absorberend materiaal. Voorkomen dat product in afvoersystemen komt. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Na afloop van de behandeling dient u ongebruikt product en de verpakking volgens de lokale regelgeving af te voeren. Gebruikt product kan afhankelijk van de lokale regelgeving, op een gemeentelijk riool geloosd worden of naar het mestdepot worden afgevoerd. Voorkom lozing naar een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) systeem.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslag: Rechtop, in de goed afgesloten oorspronkelijke verpakking bewaren. Bescherm tegen direct licht, temperaturen boven 30 °C en vorst.

Houdbaarheid: 2 jaar

6. Overige informatie

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Iobac Conc	Marktgebied: BE
Dipal Conc	Marktgebied: BG
Dipal Conc	Marktgebied: HR
Dipal Conc	Marktgebied: CY
Dipal Conc	Marktgebied: CZ
Dipal Conc	Marktgebied: DK
Dipal Conc	Marktgebied: EE
Dipal Conc	Marktgebied: FI
Dipal Conc	Marktgebied: FR
Dipal Conc	Marktgebied: HU
Dipal Conc	Marktgebied: LV
Dipal Conc	Marktgebied: LT
Dipal Conc	Marktgebied: LU
Dipal Conc	Marktgebied: PL
Dipal Conc	Marktgebied: RO

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

Dipal Conc	Marktgebied: SE
Dipal Conc	Marktgebied: NO
Dipal Conc	Marktgebied: IS
NL-0013188-0008 1-5	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,75
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		6,34
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,33

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 6: Metafamily 6

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-6

1.3 Productsoort(en)

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15 - 0,15
Alcohol ethoxylaat			68439-46-3		0 - 0
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,07 - 0,07

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan bijtend zijn voor metalen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Voorkom lozing in het milieu.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Speendesinfectie, kant-en-klare dipmiddelen handmatig aangebracht.

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne																		
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie																		
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>																		
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.</p>																		
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door handmatig dippen met een dipbeker.																		
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.																		
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel																		
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<table border="0"> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>5L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>10L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>20L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>60L</td> </tr> <tr> <td>Vat</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>200L</td> </tr> <tr> <td>IBC</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>1000L</td> </tr> </table>	Bus	Kunststof: HDPE	5L	Bus	Kunststof: HDPE	10L	Bus	Kunststof: HDPE	20L	Bus	Kunststof: HDPE	60L	Vat	Kunststof: HDPE	200L	IBC	Kunststof: HDPE	1000L
Bus	Kunststof: HDPE	5L																	
Bus	Kunststof: HDPE	10L																	
Bus	Kunststof: HDPE	20L																	
Bus	Kunststof: HDPE	60L																	
Vat	Kunststof: HDPE	200L																	
IBC	Kunststof: HDPE	1000L																	

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzingen:

Het is aanbevolen om handschoenen te dragen tijdens het melken en de toepassing, voor een hygiënische melkwinning en om de

huid te beschermen.
Voor handmatige toepassing: gebruik een schone dipbeker.
Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

DIPPEN: dip elke speen in het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de dipbeker bij indien nodig.
Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Er zijn geen gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Speendesinfectie, kant-en-klare spraymiddelen handmatig aangebracht

Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Speendesinfectie

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Bacteriën
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Gisten
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens																		
Toepassingsgebied	Binnen Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.																		
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door sprayen met behulp van een sprayflacon.																		
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.																		
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel																		
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<table border="0"> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>5L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>10L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>20L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>60L</td> </tr> <tr> <td>Vat</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>200L</td> </tr> <tr> <td>IBC</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>1000L</td> </tr> </table>	Bus	Kunststof: HDPE	5L	Bus	Kunststof: HDPE	10L	Bus	Kunststof: HDPE	20L	Bus	Kunststof: HDPE	60L	Vat	Kunststof: HDPE	200L	IBC	Kunststof: HDPE	1000L
Bus	Kunststof: HDPE	5L																	
Bus	Kunststof: HDPE	10L																	
Bus	Kunststof: HDPE	20L																	
Bus	Kunststof: HDPE	60L																	
Vat	Kunststof: HDPE	200L																	
IBC	Kunststof: HDPE	1000L																	

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzing:

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone applicator.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor het gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

- 1) HANDMATIG SPRAYEN: elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de sprayflacon bij indien nodig.
 - 2) AUTOMATISCH SPRAYEN: Elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product.
- Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik chemisch resistente handschoenen (handschoenmateriaal moet door toelatingshouder in de productinformatie worden gespecificeerd) wanneer de speendesinfectie na het melken gebeurt door middel van handmatig sprayen.
Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Speendesinfectie, kant-en-klare dip- of spraymiddelen automatisch aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt automatisch op de spenen aangebracht na het melken door melkmachines met een geïntegreerd dip- of spraysysteem.

Dosering en frequentie van de toepassing

ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% -
Toepassen na het melken, 3 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bus	Kunststof: HDPE	5L
Bus	Kunststof: HDPE	10L
Bus	Kunststof: HDPE	20L
Bus	Kunststof: HDPE	60L
Vat	Kunststof: HDPE	200L
IBC	Kunststof: HDPE	1000L

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Er zijn geen gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Er zijn geen algemene gebruiksaanwijzingen. Lees de gebruik-specifieke instructies.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Indien een combinatie van desinfectie voor en na het melken noodzakelijk is, overweeg dan het gebruik van een ander product zonder jodium voor de desinfectie voor het melken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Directe/Indirecte effecten:

Volgens onze ervaring en de aan ons verstrekte informatie heeft het product geen schadelijke effecten bij gebruik en verwerking volgens de specificaties.

- Eerste hulp maatregelen:

Na contact met de ogen: grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Na contact met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kledij en schoenen uittrekken.

Na inslikken: Mond met water uitspoelen. Onmiddellijk arts raadplegen indien zich symptomen voordoen en/of grote hoeveelheden werden ingeslikt.

Na inademing: In de frisse lucht brengen

- Milieuvorzorgsmaatregelen

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Indammen. Absorberen met inert absorberend materiaal. Voorkomen dat product in afvoersystemen komt. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Na afloop van de behandeling dient u ongebruikt product en de verpakking volgens de lokale regelgeving af te voeren. Gebruikt product kan afhankelijk van de lokale regelgeving, op een gemeentelijk riool geloosd worden of naar het mestdepot worden afgevoerd. Voorkom lozing naar een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) systeem.

--

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslag: Rechtop, in de goed afgesloten oorspronkelijke verpakking bewaren. Bescherm tegen direct licht, temperaturen boven 30 °C en vorst.

Houdbaarheid: 1 jaar

6. Overige informatie

--

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Proactive Plus	Marktgebied: DK
Proactive Plus	Marktgebied: FI
Proactive Plus	Marktgebied: SE
Proactive Plus	Marktgebied: NO

Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

NL-0013188-0009 1-6

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		0
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,07

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 7: Metafamily 7

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-7

1.3 Productsoort(en)

PT 03 - Dierhygiëne

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15 - 0,15
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		0 - 0
Natrium jodide			7681-82-5	231-679-3	0,06 - 0,06

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Bevat natrium jodaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan bijtend zijn voor metalen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Voorkom lozing in het milieu.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Speendesinfectie, kant-en-klare dipmiddelen handmatig aangebracht

Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Speendesinfectie

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Bacteriën
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Gisten
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Virussen
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.

Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door handmatig dippen met een dipbeker.																								
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.																								
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel																								
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<table border="0"> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>5L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>10L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>20L</td> </tr> <tr> <td>Bus</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>60L</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>Vat</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>200L</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>IBC</td> <td>Kunststof: HDPE</td> <td>1000L</td> </tr> </table>	Bus	Kunststof: HDPE	5L	Bus	Kunststof: HDPE	10L	Bus	Kunststof: HDPE	20L	Bus	Kunststof: HDPE	60L				Vat	Kunststof: HDPE	200L				IBC	Kunststof: HDPE	1000L
Bus	Kunststof: HDPE	5L																							
Bus	Kunststof: HDPE	10L																							
Bus	Kunststof: HDPE	20L																							
Bus	Kunststof: HDPE	60L																							
Vat	Kunststof: HDPE	200L																							
IBC	Kunststof: HDPE	1000L																							

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzingen:

Het is aanbevolen om handschoenen te dragen tijdens het melken en de toepassing, voor een hygiënische melkwinning en om de huid te beschermen.

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone dipbeker.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

DIPPEN: dip elke speen in het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de dipbeker bij indien nodig.

Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Er zijn geen gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Speendesinfectie, kant-en-klare spraymiddelen handmatig aangebracht

Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Speendesinfectie

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Bacteriën
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Gisten
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Geen gegevens
Triviale naam: Virussen
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Binnen

Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren

Toepassingsmethode(n)

Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt na het melken op de spenen aangebracht door sprayen met behulp van een sprayflacon.

Dosering en frequentie van de toepassing

ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% -
Toepassen na het melken, 2 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bus	Kunststof: HDPE	5L
Bus	Kunststof: HDPE	10L
Bus	Kunststof: HDPE	20L
Bus	Kunststof: HDPE	60L
Vat	Kunststof: HDPE	200L
IBC	Kunststof: HDPE	1000L

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

Gebruiksaanwijzingen:

Voor handmatige toepassing: gebruik een schone applicator.

Zorg ervoor dat de spenen schoon zijn voor het gebruik. Breng de onverdunde oplossing onmiddellijk na het melken aan op elke speen:

- 1) HANDMATIG SPRAYEN: elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product. Zorg ervoor dat elke speen voor tenminste drie vierde van zijn lengte bedekt is met het product en vul de sprayflacon bij indien nodig.
- 2) AUTOMATISCH SPRAYEN: Elke speen gedurende 1 seconde sprayen met het product.

Laat de spenen gedurende minstens 5 min na de behandeling drogen en zorg ervoor dat de dieren rechtop blijven staan gedurende deze periode.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik chemisch resistente handschoenen (handschoenmateriaal moet door toelatingshouder in de productinformatie worden gespecificeerd) wanneer de speendesinfectie na het melken gebeurt door middel van handmatig sprayen.
Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Speendesinfectie, kant-en-klare dip- of spraymiddelen automatisch aangebracht

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Speendesinfectie
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Het product is bestemd voor desinfectie van de spenen na het melken. Het product wordt onmiddellijk na het melken aangebracht op de spenen van lacterende dieren.
Toepassingsmethode(n)	Desinfectie van de spenen van de uier na het melken, met kant-en-klare middelen. - Het product wordt automatisch op de spenen aangebracht na het melken door melkmachines met een geïntegreerd dip- of spraysysteem.
Dosering en frequentie van de toepassing	ongeveer 5 ml per koe; ongeveer 2.5 ml per schaap of geit - 0% - Toepassen na het melken, 3 maal per dag. De producten kunnen het hele jaar door tijdens de lactatieperiode gebruikt worden.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bus	Kunststof: HDPE	5L
Bus	Kunststof: HDPE	10L
Bus	Kunststof: HDPE	20L
Bus	Kunststof: HDPE	60L
Vat	Kunststof: HDPE	200L
IBC	Kunststof: HDPE	1000L

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar en wordt onverdund toegepast. Vóór gebruik moet het product naar een temperatuur boven 20 °C worden gebracht.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Er zijn geen gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen. Zie 5.2 voor algemene instructies.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.3 voor algemene instructies.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Er zijn geen gebruik-specifieke instructies. Zie 5.4 voor algemene instructies.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Er zijn geen algemene gebruiksaanwijzingen. Lees de gebruik-specifieke instructies.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Indien een combinatie van desinfectie voor en na het melken noodzakelijk is, overweeg dan het gebruik van een ander product zonder jodium voor de desinfectie voor het melken.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Directe/Indirecte effecten:

Volgens onze ervaring en de aan ons verstrekte informatie heeft het product geen schadelijke effecten bij gebruik en verwerking volgens de specificaties.

- Eerste hulp maatregelen:

Na contact met de ogen: grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Na contact met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kledij en schoenen uittrekken.

Na inslikken: Mond met water uitspoelen. Onmiddellijk arts raadplegen indien zich symptomen voordoen en/of grote hoeveelheden werden ingeslikt.

Na inademing: In de frisse lucht brengen

- Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Indammen. Absorberen met inert absorberend materiaal. Voorkomen dat product in afvoersystemen komt. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Na afloop van de behandeling dient u ongebruikt product en de verpakking volgens de lokale regelgeving af te voeren. Gebruikt product kan afhankelijk van de lokale regelgeving, op een gemeentelijk riool geloosd worden of naar het mestdepot worden afgevoerd. Voorkom lozing naar een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) systeem.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslag: Rechtop, in de goed afgesloten oorspronkelijke verpakking bewaren. Bescherm tegen direct licht, temperaturen boven 30 °C en vorst.

Houdbaarheid: 1 jaar

6. Overige informatie

--

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	Iobac RTU	Marktgebied: BE
	Proactive	Marktgebied: IT
Toelatingsnummer <small>(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)</small>	NL-0013188-0010 1-7	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,15
Alcohol ethoxylaar			68439-46-3		0

Natrium jodide

7681-82-5

231-679-3

0,06
