




# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  
Ufficio I - Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

I.5.i.d.2/899



Spett.le  
**LABORATORIOS ECONOVAR SL**  
C/Muntaner 179, 3° 1ª  
08036  
Barcellona

**OGGETTO: Prodotto biocida:** Sterminator scarafaggi trap, Foval gel scarafaggi trap, Zig Zag siringa antiscarafaggi, ECOGEL SCARAFAGGI, Trappola scarafaggi in gel trap, GEL ANTI SCARAFAGGI  
**Trasmissione decreto di modifica amministrativa.**

Si trasmette, in allegato, il D.D. di modifica del 27 FEB. 2020 relativo al prodotto biocida indicato in oggetto n. **IT/2018/00514/AUT**.

Si richiama l'attenzione in merito a quanto disposto dal Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze, delle miscele e successive modifiche e adeguamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Marcella Marletta

Referente tecnico: Renato Cabella – 06.5994 2807  
email: r.cabella-esterno@sanita.it

CC

9



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

I.5.i.d.2/899

IT/2018/00514/AUT

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 15 della Legge n. 97 del 06 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013";

**VISTO** il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare gli artt.19 e ss.;

**VISTA** l'istanza NA-ADC presentata sul Registro Europeo R4BP3 con case number BC-PL056303-35;

**VISTA** la documentazione presentata dalla società richiedente a sostegno della suddetta istanza;

**RITENUTA** la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

## DECRETA:

La modifica amministrativa del prodotto biocida:

<b>DENOMINAZIONE</b>	Sterminator scarafaggi trap, Foval gel scarafaggi trap, Zig Zag siringa antiscarafaggi, ECOGEL SCARAFAGGI, Trappola scarafaggi in gel trap, GEL ANTI SCARAFAGGI
<b>PRINCIPIO ATTIVO:</b>	Imidacloprid
<b>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO</b>	<b>LABORATORIOS ECONOVAR SL</b> C/Muntaner 179, 3 <sup>o</sup> 1 <sup>a</sup> 08036 Barcellona Spain
<b>NUMERO DI AUTORIZZAZIONE</b>	<b>IT/2018/00514/AUT</b>
<b>SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>31/12/2022</b>



A far data dalla notifica del presente decreto, la società **LABORATORIOS ECONOVAR SL** è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nell'allegato I (SPC - Sommario delle Caratteristiche del Prodotto) e nell'allegato II (Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto viene redatto in duplice originale, di cui un esemplare è notificato in via amministrativa alla ditta interessata e l'altro è conservato agli atti di questo Ufficio.

Roma, li **27 FEB. 2020**

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Marcella Marletta



ALLEGATO

**Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida**

**ECOGEL SCARAFAGGI**


Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (controllo degli animali nocivi)

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (controllo degli animali nocivi)

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (controllo degli animali nocivi)

Numero di autorizzazione:

Numero dell'approvazione del R4BP:



## 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

### 1.1. Nome(i) commerciale(i) del prodotto

Denominazione commerciale	ECOGEL SCARAFAGGI Zig Zag siringa antiscarafaggi GEL ANTI SCARAFAGGI Foval gel scarafaggi trap Trappola scarafaggi in gel trap Sterminator scarafaggi trap
---------------------------	---

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	
	Indirizzo	
Numero di autorizzazione		
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>		
Data di rilascio dell'autorizzazione		
Data di scadenza dell'autorizzazione		

### 1.3. Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante	Mylva S.A.
Indirizzo del fabbricante	Via Augusta 48, 08006 Barcelona (Catalonia) Spagna
Ubicazione dei siti produttivi	Sant Galderic 23, poligon industrial ponent , Sant pol de Mar, 08395 Barcelona (Catalonia) Spagna

### 1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Imidacloprid
Nome del fabbricante	Bayer SAS
Indirizzo del fabbricante	16 rue Jean-Marie Leclair, 90106 Lyon Cedex Francia
Ubicazione dei siti produttivi	16 rue Jean-Marie Leclair, 90106 Lyon Cedex Francia

## 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Principio attivo	138261-41-3	428-040-8	2.15

## 2.2. Tipo di formulazione

RB - Esca (pronta per l'uso)

## 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-Benzisotiazol-3 (EH)-one e 2-ottil-1,2-tiazol-3-one.. Puo' provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto in in conformità alle normative vigenti sui rifiuti pericolosi.. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## 4. USO/I AUTORIZZATO/I

### 4.1. Descrizione dell'uso

**Tabella 1. Uso # 1 – professionisti formati**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	<i>Esca insetticida in gel pronta all'uso da applicare in gocce</i> <i>Esca insetticida in gel pronta all'uso in erogatori per esche</i>
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Blattodea: German cockroach Adults and late nymphs Blatta orientalis Oriental cockroaches Adults and late nymphs Blattidae: American Cockroach Adults and late nymphs
Campo di applicazione	In ambiente chiuso -In luoghi inaccessibili: crepe, crepe, dietro i mobili, ecc ... dove possono essere presenti scarafaggi.  - In luoghi bui e umidi: sotto il lavandino, dietro il gabinetto, vicino allo scarico ...

	<p>-In luoghi di alta temperatura: dietro i motori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie ...</p> <p>-In luoghi con rifiuti alimentari o materiali organici: sotto o dietro gli armadietti della cucina, vicino al dustin, nel magazzino, nelle cantine, nei cortili ...</p>
Metodi di applicazione	<p>applicazione esca</p> <p>DOSI DI APPLICAZIONE DA APPLICARE IN EROGATORI PER ESCHE</p> <p>0,2 – 0,4 g/m<sup>2</sup>. Per raggiungere il dosaggio sopra indicato, collocare gli erogatori, contenenti 2,5 g di gel ciascuno, in funzione del livello di infestazione. · In caso di normale infestazione, collocare 2 erogatori per stanza (circa 5 g / 22 m<sup>2</sup>); · In caso di forte infestazione, collocare 4 erogatori per stanza (circa 10 g / 22 m<sup>2</sup>).</p> <p>DOSI DI APPLICAZIONE DA APPLICARE IN GOCCE</p> <p>Una goccia corrisponde a 0,04 g/m<sup>2</sup>. Attenersi ai dosaggi indicati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Blattella germanica</i>: 0,12 – 0,16 g/m<sup>2</sup> (3-4 gocce/m<sup>2</sup>)</li> <li>· <i>Blatta orientalis</i>: 0,16 – 0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 gocce/m<sup>2</sup>)</li> <li>· <i>Periplaneta americana</i>: 0,16 – 0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 gocce/m<sup>2</sup>)</li> </ul>
Tasso(i) e frequenza di applicazione	<p>Guarda in punto sopra "descrizione dettagliata del metodo" - 0</p> <p>Per infestazione normale, un'applicazione è efficace per tre mesi.</p> <p>Per un'infestazione elevata, ispeziona l'esca dopo un mese.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale addestrato</p> <p>Utilizzatore professionale</p> <p>Utilizzatore non professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p><i>erogatori per esca in plastica: 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 gr.</i></p> <p><i>siringa LDPE da 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 gr</i></p> <p><i>cartuccia da 15,20,25,30,35,40 e 50 gr</i></p>

#### 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare gocce di ECOGEL SCARAFFAGGI o collocare la stazione esca in luoghi di accesso difficili, come fessure, fessure, crepe, dietro i mobili ... dove le gocce non sono visibili e fuori dalla portata di bambini e animali.

Luoghi umidi scuri: sotto il lavandino, dietro il gabinetto, vicino alle fognature. Le gocce ECOGEL SCARAFFAGGI aderiscono a tutte le superfici, anche quelle verticali, e rimangono efficaci anche a temperature elevate.

Luoghi caldi: dietro motori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ...

Luoghi con cibo o residui organici: sotto o dietro gli armadi, vicino a bidone della spazzatura, dispense, scantinati, cortili, ...

Qualsiasi posto con crepe, crepe, griglie di ventilazione, soffitti finti

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

#### **INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

*In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere le lenti a contatto. In caso di contatto con la pelle, lavare con sapone e abbondante acqua, senza strofinare. Se necessario, portare la vittima in ospedale e mostrare l'etichetta del prodotto o il contenitore, quando possibile. Non lasciare sola la persona intossicata.*

*Informazioni per il medico: Trattamento sintomatico e di supporto.*

**IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA, TENERE A PORTATA DI MANO IL CONTENITORE O L'ETICHETTA E CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Non disperdere nell'ambiente.

Racogliere il materiale fuoriuscito.

smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative vigenti sui rifiuti pericolosi.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

E' raccomandabile conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 45°C.

#### 4.2. Descrizione dell'uso

**Tabella 2. Uso # 2 – professionali**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	

	<p><i>Esca insetticida in gel pronta all'uso da applicare in gocce</i>  <i>Esca insetticida in gel pronta all'uso in erogatori per esche</i></p>
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Blattodea:  German cockroach  Adults and late nymphs  Blatta orientalis  Oriental cockroaches  Adults and late nymphs  Blattidae:  American Cockroach  Adults and late nymphs</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso  -In luoghi inaccessibili: crepe, crepe, dietro i mobili, ecc ... dove possono essere presenti scarafaggi.    - In luoghi bui e umidi: sotto il lavandino, dietro il gabinetto, vicino allo scarico ...    -In luoghi di alta temperatura: dietro i motori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie ...    -In luoghi con rifiuti alimentari o materiali organici: sotto o dietro gli armadietti della cucina, vicino al dubstin, nel magazzino. nelle cantine, nei cortili ...</p>
Metodi di applicazione	<p>applicazione esca  <b>DOSI DI APPLICAZIONE DA APPLICARE IN EROGATORI PER ESCHE</b>    0,2 – 0,4 g/m<sup>2</sup>. Per raggiungere il dosaggio sopra indicato, collocare gli erogatori, contenenti 2,5 g di gel ciascuno, in funzione del livello di infestazione. · In caso di normale infestazione, collocare 2 erogatori per stanza (circa 5 g / 22 m<sup>2</sup>); · In caso di forte infestazione, collocare 4 erogatori per stanza (circa 10 g / 22 m<sup>2</sup>).    <b>DOSI DI APPLICAZIONE DA APPLICARE IN GOCCE</b>  Una goccia corrisponde a 0,04 g/m<sup>2</sup>. Attenersi ai dosaggi indicati di seguito:  · <i>Blattella germanica</i>: 0,12 – 0,16 g/m<sup>2</sup> (3-4 gocce/m<sup>2</sup>)  · <i>Blatta orientalis</i>: 0,16 – 0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 gocce/m<sup>2</sup>)  · <i>Periplaneta americana</i>: 0,16 – 0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 gocce/m<sup>2</sup>)</p>
Tasso(i) e frequenza di applicazione	<p>Guarda in punto sopra "descrizione dettagliata del metodo" - 0    Per infestazione normale, un'applicazione è efficace per tre mesi.    Per un'infestazione elevata, ispeziona l'esca dopo un mese.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale addestrato  Utilizzatore professionale</p>



	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p><i>erogatori per esca in plastica: 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 gr.</i></p> <p><i>siringa LDPE da 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 gr</i></p>

#### 4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare gocce di ECOGEL SCARAFFAGGI o collocare la stazione esca in luoghi di accesso difficili, come fessure, fessure, crepe, dietro i mobili ... dove le gocce non sono visibili e fuori dalla portata di bambini e animali.

Luoghi umidi scuri: sotto il lavandino, dietro il gabinetto, vicino alle fognature. Le gocce ECOGEL SCARAFFAGGI aderiscono a tutte le superfici, anche quelle verticali, e rimangono efficaci anche a temperature elevate.

Luoghi caldi: dietro motori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ...

Luoghi con cibo o residui organici: sotto o dietro gli armadi, vicino a bidone della spazzatura, dispense, scantinati, cortili, ...

Qualsiasi posto con crepe, crepe, griglie di ventilazione, soffitti finti

#### 4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

##### **INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

*In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere le lenti a contatto. In caso di contatto con la pelle, lavare con sapone e abbondante acqua, senza strofinare. Se necessario, portare la vittima in ospedale e mostrare l'etichetta del prodotto o il contenitore, quando possibile. Non lasciare sola la persona intossicata.*

*Informazioni per il medico: Trattamento sintomatico e di supporto.*

**IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA, TENERE A PORTATA DI MANO IL CONTENITORE O L'ETICHETTA E CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Non disperdere nell'ambiente.

Racogliere il materiale fuoriuscito.  
smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative vigenti sui rifiuti pericolosi.

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

E' raccomandabile conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 45°C.

#### 4.3. Descrizione dell'uso

**Tabella 3. Uso # 3 – non professionali**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	<i>Esca insetticida in gel pronta all'uso da applicare in gocce</i> <i>Esca insetticida in gel pronta all'uso in erogatori per esche</i>
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Blattodea: German cockroach Adults and late nymphs Blatta orientalis Oriental cockroaches Adults and late nymphs Blattidae: American Cockroach Adults and late nymphs
Campo di applicazione	In ambiente chiuso -In luoghi inaccessibili: crepe, crepe, dietro i mobili, ecc ... dove possono essere presenti scarafaggi.  - In luoghi bui e umidi: sotto il lavandino, dietro il gabinetto, vicino allo scarico ...  -In luoghi di alta temperatura: dietro i motori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie ...  -In luoghi con rifiuti alimentari o materiali organici: sotto o dietro gli armadietti della cucina, vicino al dustbin, nel magazzino, nelle cantine, nei cortili ...
Metodi di applicazione	applicazione esca DOSI DI APPLICAZIONE DA APPLICARE IN EROGATORI PER ESCHE

	<p>0,2 – 0,4 g/m<sup>2</sup>. Per raggiungere il dosaggio sopra indicato, collocare gli erogatori, contenenti 2,5 g di gel ciascuno, in funzione del livello di infestazione. · In caso di normale infestazione, collocare 2 erogatori per stanza (circa 5 g / 22 m<sup>2</sup>); · In caso di forte infestazione, collocare 4 erogatori per stanza (circa 10 g / 22 m<sup>2</sup>).</p> <p><b>DOSI DI APPLICAZIONE DA APPLICARE IN GOCCE</b>  Una goccia corrisponde a 0,04 g/m<sup>2</sup>. Attenersi ai dosaggi indicati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Blattella germanica</i>: 0,12 – 0,16 g/m<sup>2</sup> (3-4 gocce/m<sup>2</sup>)</li> <li>· <i>Blatta orientalis</i>: 0,16 – 0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 gocce/m<sup>2</sup>)</li> <li>· <i>Periplaneta americana</i>: 0,16 – 0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 gocce/m<sup>2</sup>)</li> </ul>
Tasso(i) e frequenza di applicazione	<p>Guarda in punto sopra "descrizione dettagliata del metodo" - 0</p> <p>Per infestazione normale, un'applicazione è efficace per tre mesi.</p> <p>Per un'infestazione elevata, ispeziona l'esca dopo un mese.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale addestrato  Utilizzatore professionale  Utilizzatore non professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p><i>erogatori per esca in plastica: 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 gr.</i></p> <p><i>siringa LDPE da 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 gr</i></p> <p><i>cartuccia da 15,20,25,30,35,40 e 50 gr</i></p>

#### 4.3.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare gocce di ECOGEL SCARAFFAGGI o collocare la stazione esca in luoghi di accesso difficili, come fessure, fessure, crepe, dietro i mobili ... dove le gocce non sono visibili e fuori dalla portata di bambini e animali.

Luoghi umidi scuri: sotto il lavandino, dietro il gabinetto, vicino alle fognature. Le gocce ECOGEL SCARAFFAGGI aderiscono a tutte le superfici, anche quelle verticali, e rimangono efficaci anche a temperature elevate.

Luoghi caldi: dietro motori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ...

Luoghi con cibo o residui organici: sotto o dietro gli armadi, vicino a bidone della spazzatura, dispense, scantinati, cortili, ...

Qualsiasi posto con crepe, crepe, griglie di ventilazione, soffitti finti

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

#### **INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

*In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere le lenti a contatto. In caso di contatto con la pelle, lavare con sapone e abbondante acqua, senza strofinare. Se necessario, portare la vittima in ospedale e mostrare l'etichetta del prodotto o il contenitore, quando possibile. Non lasciare sola la persona intossicata.*

*Informazioni per il medico: Trattamento sintomatico e di supporto.*

**IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA, TENERE A PORTATA DI MANO IL CONTENITORE O L'ETICHETTA E CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Non disperdere nell'ambiente.

Racogliere il materiale fuoriuscito.

smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative vigenti sui rifiuti pericolosi.

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

E' raccomandabile conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 45°C.

## **5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO<sup>1</sup>**

### **5.1. Istruzioni d'uso**

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. L'area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l'estensione dell'infestazione. Utilizzare solo in interni.

*Frequenza di applicazione: il prodotto va applicato una volta ogni 4 settimane. Se l'infestazione persiste, sostituire con nuovi erogatori per esca.*

---

<sup>1</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

*Frequenza del trattamento: il trattamento può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente.*

## **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

Per evitare fenomeni di resistenza, è consigliabile alternare trattamenti con prodotti basati su principi attivi con meccanismo d'azione differente. L'esca non deve essere posta in prossimità di alimenti, mangimi o bevande. Il prodotto va utilizzato solo fino a completo controllo dell'infestazione. Usare il prodotto alle dosi e agli intervalli raccomandati. Per un trattamento efficace, rispettare le buone pratiche di igiene: Rimuovere o impedire l'accesso ad eventuali fonti di cibo alternative; le esche dovranno rappresentare la più importante fonte di alimento disponibile per le blatte. Per una elevata efficacia, controllare l'esca una volta a settimana e riposizionarla se danneggiata o consumata. Il prodotto deve essere maneggiato in modo sicuro al fine di minimizzare il rischio di assunzione da parte di bambini o animali non bersaglio. Non gettare il prodotto a terra, in corsi d'acqua, nel lavandino o in scarichi fognari. Applicare solo in zone nascoste e lontano dall'acqua. Misure di protezione ambientale: evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente (acque superficiali, di falda, fognature, scarichi, ecc....) mediante la costruzione di barriere protettive, chiudendo gli scarichi. In caso di sversamento, contattare le autorità competenti. Il prodotto fuoriuscito deve essere assorbito con materiale inerte (sabbia, caolino), raccolto in appositi contenitori ed identificato come rifiuto pericoloso.

## **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere le lenti a contatto. In caso di contatto con la pelle, lavare con sapone e abbondante acqua, senza strofinare. Se necessario, portare la vittima in ospedale e mostrare l'etichetta del prodotto o il contenitore, quando possibile. Non lasciare sola la persona intossicata.

Informazioni per il medico: Trattamento sintomatico e di supporto.

**IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA, TENERE A PORTATA DI MANO IL CONTENITORE O L'ETICHETTA E CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

## **5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio: il prodotto, il suo contenitore e gli insetti morti devono essere smaltiti in conformità alle norme locali.

Condizioni di stoccaggio e validità del prodotto: il prodotto è stabile, all'interno del contenitore originale, fino a 2 anni se conservato in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole.

## **5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

E' raccomandabile conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 45°C.

## Allegato I - SPC

## Allegato II - Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione

- L'etichetta del prodotto biocida oggetto della presente autorizzazione dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.528/2012 riportando le informazioni di cui al sommario delle caratteristiche del prodotto riportato in Allegato I.
- Tutte le etichette del prodotto biocida devono riportare il numero di autorizzazione attribuito dal presente decreto, con la seguente dicitura:

***“PRODOTTO BIOCIDA (PT 18)***

***AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2018/00514/AUT”***

- Per ogni categoria di utilizzatore autorizzata (Professionisti/ Professionisti formati/ Utilizzatori non professionisti) deve essere predisposta una etichetta distinta.
- L'etichetta dovrà contenere l'indicazione dell'officina di produzione e sito produttivo del formulato autorizzato.
- Nell'etichetta l'esatta denominazione del biocida dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
- L'etichetta del prodotto non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell'utilizzatore e non devono riportare indicazioni riferite al prodotto che possano generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

E' consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.