



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/17-12/15  
URBROJ: 543-03-3-2/3-21-5  
Zagreb, 14. lipnja 2021.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 50. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda i članka 50. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09), povodom zahtjeva trgovačkog društva Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija, za većom i administrativnom izmjenom odobrenja za biocidni proizvod, donosi

### RJEŠENJE

U rješenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-543-04/17-12/15, URBROJ: 543-07-1-1-3/1-17-3 od 5. srpnja 2017. zamjenjuje se Sažetak svojstava biocidnog proizvoda iz točke II. toga rješenja Sažetkom svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja te se u točki VI. rješenja mijenja datum važenja iz 29.6.2021. u 31.12.2021.

### Obrazloženje

Rješenjem Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-543-04/17-12/15, URBROJ: 543-07-1-1-3/1-17-3 od 5. srpnja 2017. odobreno je stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda IMIDASECT ANTS pod uvjetima navedenim u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga toga rješenja. Nositelj odobrenja podnio je zahtjev za većom i administrativnom izmjenom odobrenja sukladno Prilogu Uredbe (EU) br. 354/2013 Glava III, vezano uz dodavanje nove ciljne vrste i dodavanja nove lokacije proizvodnog pogona proizvođača biocidnog proizvoda. Nadalje, datum do kojeg je rješenje važeće je 29.6.2021. Kako referentna država Njemačka neće do datuma prestanka važenja rješenja ocijeniti zahtjev za obnovom odobrenja i donijeti rješenje, produžila je rok važenja odobrenja do 31.12.2021. Stoga je potrebno produžiti rok važenja rješenja danog u Republici Hrvatskog na isti period potreban za ocjenu zahtjeva za obnovom odobrenja. Zahtjev za obnovom odobrenja podnesen je na vrijeme sukladno članku 31. Uredbe (EU) br. 528/2012 pod brojem u R4BP aplikaciji BC-WG056245-32 dana 28.12.2019. Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci. U ostalom dijelu navedeno rješenje ostaje nepromijenjeno. Izmjena će se upisati u Registar biocidnih proizvoda R4BP.

#### Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.



Dostaviti:

1. Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija
2. Pismohrana



## **Sažetak svojstava biocidnog proizvoda**

IMIDASECT ANTS

Vrsta proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih  
člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/17-12/15

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0017414-0000

## 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	IMIDASECT ANTS
-----------------	----------------

### 1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Sharda Europe B.V.B.A.
	Adresa	Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/17-12/15	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0017414-0000	
Datum odobrenja	5.7.17.	
Datum isteka odobrenja	31.12.2021.	

### 1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Sharda Cropchem Limited
Adresa proizvođača	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Indija DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3, 48410 Orozco (Vizcaya) Španjolska

### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Imidaklopid
Naziv proizvođača	Sharda Cropchem Limited
Adresa proizvođača	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD., 393 East Heping Road, - Shijizhuang Kina

## 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktivna tvar	138261-41-3	428-040-8	0,01

### 2.2. Vrsta formulacije

Gel

### 3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	H411 Otroavno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
Oznake obavijesti	P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš P391 Sakupiti proliveno/rasuto P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima

### 4. ODOBRENA UPORABA

#### 4.1. Opis uporabe

**Tablica 1. Uporaba br. 1 – Neprofesionalna upotreba**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Monomorium pharaonis Uobičajeno ime: Tropski mrav - Faraonski mrav Stadij razvoja: Jaja, ličinke, nimfe, kukuljice, imago, odrasli  Znanstveno ime: Linepithema humile Uobičajeno ime: Argentinski mrav Stadij razvoja: Jaja, ličinke, nimfe, kukuljice, imago, odrasli  Znanstveno ime: Lasius niger Uobičajeno ime: Crni mrav Stadij razvoja: Jaja, ličinke, nimfe, kukuljice, imago, odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru na otvorenom Zatvoreni prostori. Primjena na otvorenom kao barijera oko zgrada (cilj primjene: zaštita zdravlja).
Načini primjene	Metoda: otvorena primjena mamcima Detaljan opis: -  Metoda: Klopke s mamcima Detaljan opis: -
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 0.2 - 0.4 g/m <sup>2</sup> ; 0.2 g/m kretanja mrava (otvorena primjena - zatvoreni prostori), 0.2 g biocidnog proizvoda primijeniti direktno na otvor tunela ili staze kojima se mravi kreću u potrazi za hranom; 0.2 g/m kretanja mrava oko objekta (otvorena primjena - otvoreni prostori) Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Proizvod se može primijeniti neprekidno tijekom 2-3 mjeseca bez zamjene otvorenih mamaca ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine.  Stopa primjene: Maksimalno 0.35 g/m <sup>2</sup> (klopka s 0.75 g mamca na 2.5 m <sup>2</sup> ; klopka s 1 g mamca na 3 m <sup>2</sup> ; klopka s 1.2 g mamca na 3.5 m <sup>2</sup> , klopka s 1.4 g

	<p>mamca na 4 m<sup>2</sup>) (klopke s mamcima - zatvoreni prostori). Maksimalno 0.23 g/m staze kojom se mravi kreću oko objekta (klopka s 0.75 g mamca na 3.5 m; klopka s 1 g mamca na 4.5 m; klopka s 1.2 g mamca na 5.5 m, klopka s 1.4 g mamca na 6 m (klopke s mamcima - na otvorenom).</p> <p>Razrjeđivanje (%): -</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p>Proizvod se može primijeniti neprekidno tijekom 2-3 mjeseca bez zamjene otvorenih mamaca ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine.</p>
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Plastična šprica (HDPE, COEX) , 3 g, 5 g, 10 g, 15 g Klopka s mamcima, Plastika (HDPE, COEX) , 0.75 g, 1 g, 1.2 g, 1.4 g

#### 4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidi 5.1.

#### 4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2.

#### 4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3.

#### 4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

#### 4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5.

## 4.2. Opis uporabe

**Tablica 2. Uporaba br. 2 – Profesionalna upotreba**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<p>Znanstveno ime: <i>Monomorium pharaonis</i>  Uobičajeno ime: Tropski mrav - Faraonski mrav  Stadij razvoja: Jaja, ličinke, nimfe, kukuljice, imago, odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Linepithema humile</i>  Uobičajeno ime: Tropski mrav - Argentinski mrav  Stadij razvoja: Jaja, ličinke, nimfe, kukuljice, imago, odrasli</p>

	Znanstveno ime: <i>Lasius niger</i> Uobičajeno ime: Crni mrav Stadij razvoja: Jaja, ličinke, nimfe, kukuljice, imago, odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru na otvorenom Zatvoreni prostori. Primjena na otvorenom kao barijera oko zgrada (cilj primjene: zaštita zdravlja).
Načini primjene	Metoda: Otvorena primjena mamcima Detaljan opis: -  Metoda: Klopke s mamcima Detaljan opis: -
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 0.2 - 0.4 g/m <sup>2</sup> ; 0.2 g/m kretanja mrava (otvorena primjena - zatvoreni prostori), 0.2 g biocidnog proizvoda primijeniti direktno na otvor tunela ili staze kojima se mravi kreću u potrazi za hranom; 0.2 g/m kretanja mrava oko objekta (otvorena primjena - otvoreni prostori) Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Proizvod se može primijeniti neprekidno tijekom 2-3 mjeseca bez zamjene otvorenih mamaca ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine. Stopa primjene: Maksimalno 0.35 g/m <sup>2</sup> (klopka s 0.75 g mamca na 2.5 m <sup>2</sup> ; klopka s 1 g mamca na 3 m <sup>2</sup> ; klopka s 1.2 g mamca na 3.5 m <sup>2</sup> , klopka s 1.4 g mamca na 4 m <sup>2</sup> ) (klopke s mamcima - zatvoreni prostori). Maksimalno 0.23 g/m staze kojom se mravi kreću oko objekta (klopka s 0.75 g mamca na 3.5 m; klopka s 1 g mamca na 4.5 m; klopka s 1.2 g mamca na 5.5 m, klopka s 1.4 g mamca na 6 m (klopke s mamcima - na otvorenom).  Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Proizvod se može primijeniti neprekidno tijekom 2-3 mjeseca bez zamjene otvorenih mamaca ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine.
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	patrona, Plastika (HDPE, COEX) , 30 g, 35 g, 50 g, 75 g, 100 g Klopka s mamcima, Plastika (HDPE, COEX) , 0.75 g, 1 g, 1.2 g, 1.4 g

#### 4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidi 5.1.

#### 4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidi 5.3.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidi 5.4.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidi 5.5.

## **5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU<sup>1</sup>**

### **5.1. Upute za uporabu**

- 1) Prije primjene, ukloniti sve prirodne izvore hrane za mrave (otpad, ostatke hrane...) iz zaraženog područja kako bi se potaknuo unos gela.
- 2) Gdje su mravi prisutni u zatvorenom prostoru, primijeniti gel u obliku kapljica ili tankih linija blizu staza kojima se mravi kreću, na mjesta ulaska i u njihova legla.
- 3) Gdje su mravi prisutni na otvorenom, primijeniti gel u obliku kapljica ili tankih linija u legla ili na staze kojima se mravi kreću.
- 4) Na mjestima gdje je uočena samo sporadična pojava mrava, preporučuje se primjena klopki s mamcima.
- 5) Jednom tjedno provjeriti klopke s mamcima.
- 6) Tijekom pregleda provjeriti tretirano područje, i ako je potrebno zamijeniti gel.
- 7) Proizvod ne primjenjivati na površine koje upijaju.
- 8) Primijeniti proizvod podalje od izravnog sunčevog svjetla ili izvora topline (npr. ne primijeniti ispod radijatora).
- 9) Izbjegavati kontinuiranu upotrebu proizvoda.
- 10) Ako je zaraza i dalje prisutna unatoč primjeni proizvoda prema uputama za uporabu, obratiti se profesionalnoj službi za dezinfekciju.
- 11) Obavijestiti nositelja odobrenja ako je primjena neučinkovita.

### **5.2. Mjere za smanjenje rizika**

- 1) Izbjegavati bilo koji nepotrebni kontakt s pripravkom. Zloupotreba može biti štetna za zdravlje.
- 2) Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
- 3) Ne kontaminirati hranu, hranu za životinje, pribor za jelo i površine koje dolaze u kontakt s hranom.

---

<sup>1</sup> Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

- 4) Čuvati izvan dohvata djece.
- 5) Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
- 6) Primjena na otvorenom samo na asfaltiranim površinama (ne primjenjivati na golo tlo).
- 7) Ukloniti mamce ako infestacija prestane ili se eliminira.

**5.3. Pojedivosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

-

**5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Odložiti sadržaj / spremnik na siguran način u skladu s nacionalnim propisima.

EWC: 200119 - Europski kodeks otpada: pesticidi (samo STL)

EWC: 150110 - Europski kodeks otpada: ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je zagađena opasnim tvarima (samo STL)

**5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja: 24 mjeseca

**6. OSTALE INFORMACIJE**

Proizvod sadrži goroku tvar.