

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: IMIDASECT

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0011268-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0011268-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	2
5. Obecná pravidla pro používání	10
5.1. Pokyny pro používání	10
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	10
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	10
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	11
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	11
6. Další informace	11

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

IMIDASECT

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresa	Heedstraat 58 1730 Asse Belgie
Číslo povolení	CZ-0011268-0000	
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0011268-0000	
Datum udělení povolení	29/06/2016	
Datum skončení platnosti povolení	14/12/2026	

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Adresa výrobce	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indie
Umístění výrobních závodů	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indie
	DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Španělsko

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	37 - Imidaklopid
Název výrobce	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Adresa výrobce	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indie
Umístění výrobních závodů	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhang Čína

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	účinná látka	138261-41-3	428-040-8	2,194

2.2. Typ složení přípravku

GD - Gel k přímé aplikaci

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Uniklý produkt seberte.

Odstraňte obsah /obal bezpečným způsobem a v souladu s platnou legislativou.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Vnitřní použití, aplikace do prasklin a štěrbin, rus domácí, profesionální použití

Typ přípravku	Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Insekticid
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Blattella germanica Obecný název: Rus domácí Vývojové stadium: Nymfy, dospělci
Oblast použití	Vnitřní Vnitřní použití
Metoda(y) aplikace	Metoda: Aplikace v prasklinách a štěrbinách Podrobný popis: Aplikace v prasklinách a štěrbinách
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: Nízká infestace – aplikační dávka 0,1 g/m ² ; Vysoká infestace – aplikační dávka 0,2 g/m ² . 1 kapka 0,1 g je ekvivalentem průměru 5 mm. Ředění (%): Počet a načasování aplikace: Maximálně 6 aplikací během roku.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Kazeta, Plast (HDPE), 30 g, 35 g, 50 g, 100 g

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

- 1) Přípravek se smí aplikovat jen na omezená místa na povrchy, které se pravidelně nečistí, například za nebo pod lednicí, pod kuchyňský dřez, pod troubu nebo ohřívač vody, do všech prasklin a štěrbin, které mohou být útočištěm švábů.
- 2) Nevystavujte kapky nástrahy slunečnímu záření nebo tepelnému zdroji (např. radiátoru).
- 3) Neaplikujte na porézní povrchy. V případě, že to není možné, naneste přípravek na plastovou fólii.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.2 Popis použití

Použití 2 - Vnitřní použití, aplikace do prasklin a štěrbin, neprofesionální použití

Typ přípravku

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Insekticid

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: *Blattella germanica*
Obecný název: Rus domácí
Vývojové stadium: nymfy, dospělci

Latinský název: *Blatta orientalis*
Obecný název: Sváb obecný
Vývojové stadium: nymfy, dospělci

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní použití

Metoda(y) aplikace

Metoda: Aplikace v prasklinách a štěrbinách

Podrobný popis:

-

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: Nízká infestace – aplikační dávka 0,2 g/m²; Vysoká infestace – aplikační dávka 0,3 g/m². 1 kapka 0,1 g je ekvivalentem průměru 5 mm.

Ředění (%):

Počet a načasování aplikace:

Maximálně 6 aplikací během roku.

Kategorie uživatelů

Velikost balení a obalový materiál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Stříkačka, plast (HDPE) - 3g, 5g, 10g, 15g.

4.2.1 Návod k danému způsobu použití

- 1) Přípravek se smí aplikovat jen na omezená místa na povrchy, které se pravidelně nečistí, například za nebo pod lednicí, pod kuchyňský dřez, pod troubu nebo ohřívač vody, do všech prasklin a štěrbin, které mohou být útočištěm švábů.
- 2) V případě výskytu viditelně velkého množství škůdců nebo při očekávaném velkém výskytu škůdců aplikujte přípravek v dávkách pro "vysokou infestaci". V případě výskytu několika málo švábů nebo pouze v případě individuálního výskytu švábů aplikuje přípravek v dávkách pro "nízkou infestaci".
- 3) Nevystavujte kapky nástrahy slunečnímu záření nebo tepelnému zdroji (např. radiátoru).
- 4) Neaplikujte na porézní povrchy. V případě, že to není možné, naneste přípravek na plastovou fólii.

4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.3 Popis použití

Použití 3 - Vnitřní použití, aplikace do prasklin a štěrbin, šváb obecný, profesionální použití

Typ přípravku	Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Insekticid
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Blatta orientalis Obecný název: Šváb obecný Vývojové stadium: nymfy, dospělci
Oblast použití	Vnitřní Vnitřní použití
Metoda(y) aplikace	Metoda: Aplikace v prasklinách a štěrbinách Podrobný popis: -
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: Nízká infestace – aplikační dávka 0,2 g/m ² ; Vysoká infestace – aplikační dávka 0,3 g/m ² . 1 kapka 0,1 g je ekvivalentem průměru 5 mm. Ředění (%): Počet a načasování aplikace: Maximálně 6 aplikací během roku.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Kazety, Plast (HDPE), 30 g, 35 g, 50 g, 100 g

4.3.1 Návod k danému způsobu použití

- 1) Přípravek se smí aplikovat jen na omezená místa na povrchy, které se pravidelně nečistí, například za nebo pod lednicí, pod kuchyňský dřez, pod troubu nebo ohřívač vody, do všech prasklin a štěrbin, které mohou být útočištěm švábů.
- 2) Nevystavujte kapky nástrahy slunečnímu záření nebo tepelnému zdroji (např. radiátoru).
- 3) Neaplikujte na porézní povrchy. V případě, že to není možné, naneste přípravek na plastovou fólii.

4.3.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.3.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.3.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.3.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.4 Popis použití

Použití 4 - Vnitřní použití, zásobník s nástrahou

Typ přípravku	Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Insekticid
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Blattella germanica Obecný název: Rus domácí Vývojové stadium: nymfy, dospělci Latinský název: Blatta orientalis Obecný název: Šváb obecný Vývojové stadium: nymfy, dospělci
Oblast použití	Vnitřní Vnitřní použití
Metoda(y) aplikace	Metoda: Zásobníky s nástrahou Podrobný popis: -
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: Nízká infestace: dávka 0,2 g/m ² (jeden 0,75g zásobník s nástrahou na 4 m ² , jeden 1g zásobník s nástrahou na 5 m ² , jeden 1,2g zásobník s nástrahou na 6 m ² , jeden 1,4g zásobník s nástrahou na 7 m ²); vysoká infestace 0,3 g/m ² (jeden 0,75g zásobník s nástrahou na 2,5 m ² , jeden 1g zásobník s nástrahou na 3 m ² , jeden 1,2g zásobník s nástrahou na 4 m ² , jeden 1,4 g zásobník s nástrahou na 5 m ²) Ředění (%): Počet a načasování aplikace: Maximálně 6 aplikací během roku.
Kategorie uživatelů	profesionál Široká veřejnost (neprofesionál) Zásobník s nástrahou, Plast (HDPE), 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4g

Velikost balení a obalový materiál

4.4.1 Návod k danému způsobu použití

V případě výskytu viditelně velkého množství švábů nebo při očekávaném velkém výskytu škůdců aplikujte přípravek v dávkách pro "vysokou infestaci". V případě výskytu několika málo švábů nebo pouze v případě individuálního výskytu švábů aplikuje přípravek v dávkách pro "nízkou infestaci".

4.4.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- 1) Zásobníky s nástrahou jsou odolné proti neoprávněné manipulaci.
- 2) Neotvírejte zásobník s nástrahou násilím.

4.4.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.4.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.4.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.5 Popis použití

Použití 5 - Venkovní prostor, zásobník s nástrahou

Typ přípravku

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Insekticid

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: *Blattella germanica*
Obecný název: Rus domácí
Vývojové stadium: nymfy, dospělci

Latinský název: *Blatta orientalis*
Obecný název: Šváb obecný

	Vývojové stadium: nymfy, dospělci
Oblast použití	Venkovní Venkovní použití jako bariera kolem budov na vstupních místech, kudy by švábi pronikli dovnitř
Metoda(y) aplikace	Metoda: Zásobníky s nástrahou Podrobný popis: -
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: Celkový obvod 0,3 g/m (jeden zásobník 0,75 g s návnadou na 2,5 m, jeden zásobník 1 g s návnadou na 3 m, jeden zásobník 1,2 g s návnadou na 4 m, jeden 1,4 g zásobník s návnadou na 5 m). Ředění (%): Počet a načasování aplikace: Maximálně 6 aplikací během roku.
Kategorie uživatelů	profesionál Široká veřejnost (neprofesionál)
Velikost balení a obalový materiál	Zásobník s nástrahou, Plast (HDPE), 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.5.1 Návod k danému způsobu použití

Aplikujte zásobníky s nástrahou pouze na tvrdých površích, jako jsou terasy nebo dvory.

4.5.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- 1) Zásobníky s nástrahou jsou odolné proti neoprávněné manipulaci.
- 2) Neotvírejte zásobník s nástrahou násilím.
- 3) Aplikujte pouze v oblastech, které nejsou náchylné k ponoření nebo navlhnutí, tj. chráněné před deštěm, povodněmi a čistící vodou.
- 4) Nepoužívejte přípravek na místech, kde může uniknout do kanalizace.

4.5.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.5.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

4.5.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecná pravidla pro použití

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

- 1) Dodržujte návod k použití.
- 2) Před aplikací odstraňte švábům všechny zdroje potravy (odpadky, zbytky jídla apod.) z ošetřovaného prostoru, aby byla podpořena konzumace gelu.
- 3) Při kontrole ošetřené plochy, je-li to potřeba doplňte gel, jelikož švábi produkují sekrety a výměšky, kterými lákají příslušníky stejného druhu.
- 4) Přípravek lze používat nepřetržitě po dobu 3 měsíců bez výměny otevřených zásobníků s nástrahou nebo nespotřebovaných nástrah.
- 5) Informujte držitele povolení v případě, že ošetření je neúčinné.
- 6) K ochraně ptáků, domácích zvířat a savců je třeba denně odstraňovat mrtvé šváby z ošetřované oblasti.
- 7) Jednou týdně zkontrolujte zásobníky s nástrahou.
- 8) Pokud zamoření přetrvává i přes dodržování pokynů na etiketě, kontaktujte odborníka na deratizaci. Vyhněte se nepřetržitému používání přípravku.
- 9) Na konci ošetření sesbírejte zásobníky s nástrahou na likvidaci.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

- 1) Uchovávejte mimo dosah dětí.
- 2) Nástrahu umístěte mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat.
- 3) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- 4) Nepokládejte na potraviny, krmiva, kuchyňské nádoby a povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami, krmivy, nápoji a zvířaty.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

- 1) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu přípravku.
- 2) KONTAKT S KŮŽÍ: Svlékněte si veškerý kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte. Umyjte pokožku vodou. Objeví-li se podráždění pokožky nebo vyrážka: Vyhledejte lékařskou pomoc.
- 3) ZASAŽENÍ OČÍ: Objeví-li se příznaky, vypláchněte oči vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je to možné. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
- 4) POŽITÍ: Objeví-li se příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
- 5) VDECHNUTÍ: Neuplatňuje se
- 6) Tento biocidní přípravek obsahuje imidakloprid, který je nebezpečný pro včely.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

- 1) Nepoužitý přípravek nevylévejte na zem, do vodních toků, do potrubí (umyvadlo, WC...) ani do kanalizace.
- 2) Nepoužitý přípravek, jeho obal, zásobníky s nástrahou a veškerý ostatní odpad (tj. mrtvý hmyz) zlikvidujte předáním oprávněné osobě.
- 3) Zásobník s nástrahou před likvidací nečistěte.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

- 1) Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- 2) Doba skladovatelnosti: 24 měsíců. 3) Přípravek se musí skladovat mimo dosah světla.

6. Další informace

Přípravek obsahuje hořkou látku.

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402