

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Stichfrei Kids

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: AT-0023739-0000

R4BP 3-Referenznummer: AT-0023739-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	6
5.1. Anwendungsbestimmungen	6
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	7
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	7
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	8
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	8
6. Sonstige Informationen	9

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Stichfrei Kids

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers

Name	F.W. KLEVER GmbH
Anschrift	Hauptstrasse 20 84168 Aham Deutschland
Zulassungsnummer	AT-0023739-0000
R4BP 3-Referenznummer	AT-0023739-0000
Datum der Zulassung	02/07/2020
Ablauf der Zulassung	02/07/2030

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers

F.W. KLEVER GmbH

Anschrift des Herstellers

Hauptstraße 20 84168 Aham Deutschland

Standort der Produktionsstätten

Hauptstraße 20 84168 Aham Deutschland

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	1320 - Ethylbutylacetylaminopropionat
Name des Herstellers	Merck S.L.U.
Anschrift des Herstellers	Calle Maria de Molina 28006 Madrid Spanien
Standort der Produktionsstätten	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanien
Wirkstoff	1320 - Ethylbutylacetylaminopropionat
Name des Herstellers	Merck KGaA
Anschrift des Herstellers	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanien

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Ethylbutylacetylaminopropionat		Wirkstoffe	52304-36-6	257-835-0	10

2.2. Art der Formulierung

EW - Emulsion, Öl in Wasser

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Auf menschlicher Haut applizierbar zur Abwehr von Mücken - gebrauchsfertig - Verbraucher

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Gebrauchsfertige Lotion zur Abwehr von Mücken in gemäßigten Klimazonen
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culex spp, Culicidae: Culex spp, Culicidae: Anopheles spp Trivialname: Mücken Entwicklungsstadium: Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere)
Anwendungsbereich	Innen- Außenbereiche Andere Außenbereich oder in einem gut belüfteten Bereich
Anwendungsmethode(n)	Manuelle Anwendung - Das Produkt auf unbedeckte Körperteile gleichmäßig aufgetragen (Gesicht, Arme, Beine und Füße). Nicht auf den ganzen Körper auftragen.
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge für Mücken: 1,16 µl / cm ² - 0 - Aufwandmenge für Mücken: 1,16 µl / cm ² Dauer des Schutzes: 8 Stunden Anzahl der Anwendungen pro Tag: Erwachsene: 10,58 ml; maximal 2 Mal pro Tag aufgetragen Kind (6-12 Jahre): 5,87 ml; maximal 1 Mal pro Tag aufgetragen Kind (2-6 Jahre): 4,33 ml; maximal 1 Mal pro Tag aufgetragen Kleinkind (1-2 Jahre): 3,06 ml; maximal 1 Mal pro Tag aufgetragen Kleinkind (0-1 Jahre): 2,61 ml; maximal 1 Mal pro Tag aufgetragen Bei der erneuten Anwendung des Produktes ist die maximal zulässige Anzahl von Anwendungen pro Tag zu beachten.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Tube - mit PP-Kappe - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F;

HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Tube - mit PP-Kappe (PP) - (aus Aluminium mit PE-Innenschicht; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Flasche - mit Schraubverschluss, Klickverschluss oder Pumpe (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Für alle Verpackungsarten: Größe 25-250 ml mit einem Intervall von 5 ml

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Storage conditions: Tightly closed. Recommended storage temperature: ambient temperature.

4.2 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 2 - Auf menschlicher Haut applizierbar zur Abwehr von Zecken - gebrauchsfertig - Verbraucher

Art des Produkts

PT19 - Repellentien und Lockmittel

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Gebrauchsfertige Lotion zur Abwehr von Zecken in gemäßigten Klimazonen

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Ixodidae: Ixodes ricinus and Ixodes scapularis
Trivialname: Zecken
Entwicklungsstadium: Nymphen|Insekten

Anwendungsbereich

Innen-
Außenbereiche
Andere

Außenbereich oder in einem gut belüfteten Bereich

Anwendungsmethode(n)

Manuelle Anwendung -
Das Produkt auf unbedeckte Körperteile gleichmäßig aufgetragen (Gesicht, Arme, Beine und Füße). Nicht auf den ganzen Körper auftragen.

Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit

Aufwandmenge für Zecken: 1,01 ml / cm² - 0 -
Aufwandmenge für Zecken: 1,01 ml / cm²
Dauer des Schutzes: 7 Stunden
Anzahl der Anwendungen pro Tag:
Erwachsene: 9,20 ml; maximal 2 Mal pro Tag aufgetragen
Kind (6-12 Jahre): 5,10 ml; maximal 1 Mal pro Tag aufgetragen
Kind (2-6 Jahre): 3,77; maximal 1 Mal pro Tag aufgetragen
Kleinkind (1-2 Jahre): 2,66 ml; maximal 1 Mal pro Tag aufgetragen
Kleinkind (0-1 Jahre): 2,27 ml; maximal 1 Mal pro Tag aufgetragen

Bei der erneuten Anwendung des Produktes ist die maximal zulässige Anzahl von Anwendungen pro Tag zu beachten.

Anwenderkategorie(n)

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Tube - mit PP-Kappe - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Tube - mit PP-Kappe (PP) - (aus Aluminium mit PE-Innenschicht; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Flasche - mit Schraubverschluss, Klickverschluss oder Pumpe (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)

Für alle Verpackungsarten: Größe 25-250 ml mit einem Intervall von 5 ml

4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Das Produkt ist nicht für den Einsatz in tropischen Gebieten bestimmt.
Verwenden Sie das Abwehrmittel auf sichere Weise. Lesen Sie vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen.
Das Produkt gleichmäßig auf die unbedeckte Haut auftragen und die aufgetragene Flüssigkeit von Hand auf der Haut verteilen. Nur auf unbedeckte Körperpartien auftragen, beschränkt auf Arme, Beine, Füße und Gesicht.
Um das Gesicht zu behandeln, tragen Sie das Abwehrmittel auf die Handfläche und verteilen die Lotion auf die Gesichtshaut, wobei Sie darauf achten müssen, die Augen zu schützen. Nicht in oder um die Augen herum auftragen.
Nicht auf Schnittwunden, Wunden, frisch rasierete oder gereizte Haut auftragen. Nicht unter oder auf Kleidung verwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung.
Die Anwendung von Sonnenschutzmitteln oder kosmetischen Mitteln nach Gebrauch des Abwehrmittels reduziert die Wirksamkeit des Abwehrmittels erheblich.
Bei starker Transpiration und nach dem Schwimmen muss das Abwehrmittel erneut aufgetragen werden. Nur bei spürbar geringerer Wirkung und spätestens 10 Stunden nach der ersten Anwendung erneut auftragen.
Mechanischer Schutz (Kleidung, Moskitonetze) wird immer bevorzugt. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nur wie angegeben verwenden.
Vermeiden Sie den Kontakt mit synthetischen Materialien. Synthetische Materialien müssen während des Sprühens geschützt werden.
Benutzer müssen mitteilen, wenn die Behandlung nicht wirksam ist und dies direkt dem Zulassungsinhaber melden.
Die Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderen Insektenschutzmitteln wird nicht empfohlen.
Die Dauer des Schutzes ist rein indikativ. Umgebungsfaktoren (z. B. hohe Temperaturen oder starker Wind) können die Schutzdauer verändern.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nur auf unbedeckte Körperpartien auftragen, beschränkt auf Arme, Beine, Füße und Gesicht.
Bei Kindern unter 12 Jahren muss das Produkt von einem Erwachsenen aufgetragen werden. Nicht auf Kinderhände auftragen.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Produkte bei Kindern verwenden. Verwenden Sie die Produkte auf verantwortungsbewusste Weise.
Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie Lebensmittel berühren.
Weder direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futter oder Getränken, noch auf Oberflächen oder Geschirr anwenden, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futter oder Getränken kommen können. Um Verunreinigungen vorzubeugen, vermeiden Sie jeden Kontakt zwischen der behandelten Haut und Lebensmitteln.
Ausschließlich im Außenbereich oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Anweisungen für Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position lagern, die das Atmen erleichtert.

Bei Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen und zwischendurch das obere und untere Augenlid hochziehen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Mindestens 10 Minuten ununterbrochen spülen. Konsultieren Sie einen Arzt.

Bei Hautkontakt: Betroffene Haut mit viel Wasser spülen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Kleidung vor Wiederverwendung waschen und Schuhe vor erneutem Tragen gründlich reinigen. Konsultieren Sie einen Arzt.

Bei Einnahme: Mund mit Wasser ausspülen. Konsultieren Sie einen Arzt.

Wichtigste, sowohl akute als auch verzögerte Symptome und Folgen: keine

Angabe der erforderlichen medizinischen Direktversorgung und Spezialbehandlung: keine Informationen verfügbar

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

Umweltschutzmaßnahmen:

Lassen Sie das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Produkt und Produktreste sind der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zu übergeben. Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen. Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Bewahren Sie den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.
Empfohlene Temperatur für die Lagerung: 18-25 °C
Das Produkt sollte nicht langfristig bei Temperaturen > 40 °C gelagert werden.
Die geprüfte Lagerstabilität beträgt 18 Monate.

6. Sonstige Informationen

--
