

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: ANTI-GERM IO-SPRAY-27

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Číslo autorizácie: SK19-MRP-018-00-000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0013889-0002

Obsah

| | |
|--|----|
| Administratívne informácie | 1 |
| 1.1. Obchodné názvy výrobku | 1 |
| 1.2. Držiteľ autorizácie | 1 |
| 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov | 1 |
| 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok) | 2 |
| 2. Zloženie a úprava výrobku | 3 |
| 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku | 3 |
| 2.2. Typ úpravy | 4 |
| 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia | 4 |
| 4. Autorizované použite(ia) | 4 |
| 5. Všeobecné pokyny pre použitie | 12 |
| 5.1. Pokyny na používanie | 12 |
| 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika | 13 |
| 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia | 13 |
| 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu | 13 |
| 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok | 13 |
| 6. Ďalšie informácie | 13 |

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

ANTI-GERM IO-SPRAY-27

PRIMIOD

UDDER DIP SPRAY

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

| | |
|---------------------------------------|--|
| Názov/Meno | HYPRED SAS |
| Adresa | 55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francúzsko |
| Číslo autorizácie | SK19-MRP-018-00-000 1-2 |
| Referenčné číslo záznamu v R4BP 3 | SK-0013889-0002 |
| Dátum autorizácie | 04/06/2019 |
| Dátum skončenia platnosti autorizácie | 28/03/2029 |

Číslo autorizácie

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

Dátum autorizácie

Dátum skončenia platnosti autorizácie

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

| | |
|------------------------------------|---|
| Účinná látka | 1319 - Jód |
| Meno/Názov výrobcu | COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5 |
| Adresa výrobcu | Terrenos de Elena S/N S/N Huara, Región de Tarapacá Chile |
| Miesto výrobných priestorov | Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Chile |

| | |
|------------------------------------|--|
| Účinná látka | 1319 - Jód |
| Meno/Názov výrobcu | ACF MINERA SA |
| Adresa výrobcu | San Martín 499 Iquique Chile |
| Miesto výrobných priestorov | Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Chile |

| | |
|------------------------------------|---|
| Účinná látka | 1319 - Jód |
| Meno/Názov výrobcu | SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA |
| Adresa výrobcu | Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Chile |
| Miesto výrobných priestorov | Pedro de Valdivia (PV) Road B 180 Antofagasta Chile Nueva Victoria (NV) Road 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Chile |

| | |
|------------------------------------|---|
| Účinná látka | 1319 - Jód |
| Meno/Názov výrobcu | ISE CHEMICALS CORPORATION |
| Adresa výrobcu | 3-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku - Tokyo Japonsko |
| Miesto výrobných priestorov | Shirasato Plant 3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba Japonsko |

| | |
|------------------------------------|--|
| Účinná látka | 1319 - Jód |
| Meno/Názov výrobcu | ATACAMA MINERALS SCM |
| Adresa výrobcu | Coronel Pereira No 72 Of. 701 Las Condes Santiago Čile |
| Miesto výrobných priestorov | Atacama Minerals SCM Aguas Blancas Facility Antofagasta Čile |
| Účinná látka | 1319 - Jód |
| Meno/Názov výrobcu | Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd |
| Adresa výrobcu | 661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japonsko |
| Miesto výrobných priestorov | Chiba Plant, 2508 Minami Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japonsko |

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

| Bežný názov | Názov IUPAC | Funkcia | CAS | EC | Obsah (%) |
|---|--|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Jód | | Účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,27 |
| Kyselina fosforečná | kyselina ortofosforečná | Iná ako účinná látka | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0 |
| Laureth-11 kyselina karboxylová | Polyetylénglykol karboxymetyl-dodecyléter | Iná ako účinná látka | 27306-90-7 | | 0 |
| Butyldiglykol | 2-(2-butoxyetoxy)etanol | Iná ako účinná látka | 112-34-5 | 203-961-6 | 0 |
| Alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované propoxylované | - | Iná ako účinná látka | 120313-48-6 | | 0 |
| Izotridekanol, etoxylovaný | Poly(oxy-1,2-etándiyl), α -tridecyl- ω -hydroxy-, rozvetvený | Iná ako účinná látka | 69011-36-5 | | 0,988 |
| Dekán-1-ol, etoxylovaný (8 EO) | Dekán-1-ol, etoxylovaný | Iná ako účinná látka | 26183-52-8 | | 0,9 |

2.2. Typ úpravy

Iné tekutiny (pripravené na použitie)

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Noste ochranné rukavice.

Noste ochranné okuliare.

Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte starostlivosť.

Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Použitie 2.1 – Dezinfekcia strukov dojných zvierat: Dezinfekcia strukov ručným namáčaním po dojení

Typ výrobku

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nie je relevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: –
Bežný názov: Baktérie
Vývojové štádium: -

Vedecký názov: –
Bežný názov: Kvasinky
Vývojové štádium: -

| | |
|---|---|
| Oblasti použitia | Vnútorne Vonkajšie Dezinfekcia na veterinárnu hygienu: dezinfekcia strukov dojných zvierat (dojníc, byvolov, oviec a kôz) na použitie po dojení. |
| Spôsob(y) aplikácie | Spôsob: Ručné namáčanie pomocou namáčačej nádoby Detailný opis: - |
| Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie | Aplikačná dávka: Aplikačné dávky: Kravy a byvolý: 8 – 10 ml/ošetrovanie Ovcy: 4 – 5 ml/ošetrovanie Kozy: 5 – 6 ml/ošetrovanie Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: Aplikácia po dojení: 1 – 3x/deň (po každom dojení) |
| Kategória(ie) používateľov | Profesionálne |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | Kanister (HDPE): 1 – 35 kg Barel (HDPE): 35 – 240 kg IBC nádrž (HDPE): 1000 kg |

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

- 1) Na ručné namáčanie strukov by sa mala použiť namáčačia nádoba odolná proti vyliatiu.
- 2) Naplňte zásobník prípravkom RTU a namáčačiu nádobku naskrutkujte navrch.
- 3) Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.
- 4) Bezprostredne pred dojením struky dôkladne očistite jednorázovou papierovou utierkou/handričkou.
- 5) Po dojení stlačte zásobník a na každý struk zospodu nasuňte namáčačiu nádobku. Do dezinfekčného prostriedku sa musí ponoriť celý struk (3 – 5 cm).
- 6) V prípade potreby doplňte čerstvým dezinfekčným prostriedkom.
- 7) Po ošetrení nechajte zvieratá stáť aspoň päť minút. Prípravok ponechajte na strukoch do ďalšieho dojenia.
- 8) Po dezinfekcii vyprázdňte zásobník. Vyčistite zásobník a namáčačiu nádobku opláchnutím vodou.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Ak opatrenia na zmiernenie rizika nemožno nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami, použijú sa tieto opatrenia na zmiernenie rizika pre zamestnancov:
Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.
- 2) Na naplnenie prípravku do aplikačného zariadenia sa odporúča použiť dávkovaciu pumpu.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Použitie 2.2 – Dezinfekcia strukov dojnych zvierat: Dezinfekcia strukov ručným napeňovaním po dojení

| | |
|--|--|
| Typ výrobku | Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | nie je relevantné |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | Vedecký názov: – Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: - Vedecký názov: – Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: - |
| Oblasti použitia | Vnútorne Vonkajšie Dezinfekcia na veterinárnu hygienu: dezinfekcia strukov dojnych zvierat (dojníc, byvolov, oviec a kôz) na použitie po dojení. |
| Spôsob(y) aplikácie | Spôsob: Ručné napeňovanie pomocou napeňovacej nádoby Detailný opis: - |
| Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie | Aplikačná dávka: Kravy a byvol: 4 – 5 ml/ošetrenie Ovce: 2 – 2,5 ml/ošetrenie Kozy: 2,5 – 3 ml/ošetrenie Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: Aplikácia po dojení: 1 – 3x/deň (po každom dojení) |

Kategória(ie) používateľ'ov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Kanister (HDPE): 1 – 35 kg
Barel (HDPE): 35 – 240 kg
IBC nádrž (HDPE): 1000 kg

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

- 1) Naplňte zásobník prípravkom RTU a napeňovacia nádobka naskrutkujte navrch.
- 2) Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.
- 3) Bezprostredne pred dojením struky dôkladne očistite jednorázovou papierovou utierkou/handričkou.
- 4) Po dojení stlačte zásobník a na každý struk zospodu nasuňte napeňovacia nádobku. Do dezinfekčného prostriedku sa musí ponoriť celý struk (3 – 5 cm).
- 5) V prípade potreby doplňte čerstvým dezinfekčným prostriedkom.
- 6) Po ošetrení nechajte zvieratá stáť aspoň päť minút. Prípravok ponechajte na strukoch do ďalšieho dojenja.
- 7) Po dezinfekcii vyprázdňte zásobník. Vyčistite zásobník a napeňovacia nádobku opláchnutím vodou.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Ak opatrenia na zmiernenie rizika nemožno nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami, použijú sa tieto opatrenia na zmiernenie rizika pre zamestnancov:
Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.
- 2) Na naplnenie prípravku do aplikačného zariadenia sa odporúča použiť dávkovaciu pumpu.

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.3 Opis použitia

Použitie 3 - Použitie 2.3 – Dezinfekcia strukov dojných zvierat: Dezinfekcia strukov ručným postrekom použitím mechanického postrekovača po dojení

| | |
|--|---|
| Typ výrobku | Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | nie je relevantné |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | <p>Vedecký názov: – Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: -</p> <p>Vedecký názov: – Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: -</p> |
| Oblasti použitia | <p>Vnútorne</p> <p>Vonkajšie</p> <p>Dezinfekcia na veterinárnu hygienu: dezinfekcia strukov dojných zvierat (dojníc, byvolov, oviec a kôz) na použitie po dojení.</p> |
| Spôsob(y) aplikácie | <p>Spôsob: Ručný postrek pomocou mechanického postrekovača</p> <p>Detailný opis: -</p> |
| Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie | <p>Aplikačná dávka: Kravy a byvol: 12 – 15 ml/ošetrenie Ovce: 6 – 7,5 ml/ošetrenie Kozy: 7 – 9 ml/ošetrenie</p> <p>Riedenie (%): 0</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: Aplikácia po dojení: 1 – 3x/deň (po každom dojení)</p> |
| Kategória(ie) používateľ'ov | Profesionálne |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | <p>Kanister (HDPE): 1 – 35 kg</p> <p>Barel (HDPE): 35 – 240 kg</p> <p>IBC nádrž (HDPE): 1000 kg</p> |

4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

- 1) Naplňte zásobník prípravkom RTU a naskrutkujte naňho hornú časť mechanického postrekovača.
- 2) Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.
- 3) Bezprostredne pred dojením struky dôkladne očistite jednorázovou papierovou utierkou/handričkou.
- 4) Po dojení nastriekajte dezinfekčný prostriedok na struky mechanickým postrekovačom. Dezinfekčným prostriedkom sa musí pokryť každý struk po celej dĺžke struku (3 – 5 cm).
- 5) V prípade potreby doplňte čerstvým dezinfekčným prostriedkom.

- 6) Po ošetrení nechajte zvieratá stáť aspoň päť minút. Prípravok ponechajte na strukoch do ďalšieho dojenia.
7) Po dezinfekcii vyprázdňte zásobník. Vyčistite zásobník a mechanický postrekovač opláchnutím vodou.

4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Ak opatrenia na zmiernenie rizika nemožno nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami, použijú sa tieto opatrenia na zmiernenie rizika pre zamestnancov:
a) Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.
b) Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám počas fázy narábania s výrobkom (materiál rukavíc určí držiteľ autorizácie v rámci informácií o výrobku).
2) Na naplnenie prípravku do aplikačného zariadenia sa odporúča použiť dávkovaciu pumpu.

4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.4 Opis použitia

Použitie 4 - Použitie 2.4 – Dezinfekcia strukov dojnych zvierat: Dezinfekcia strukov ručným postrekom použitím elektrického postrekovača po dojení

Typ výrobku

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nie je relevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: –
Bežný názov: Baktérie
Vývojové štádium: -

Vedecký názov: –
Bežný názov: Kvasinky
Vývojové štádium: -

Oblasti použitia

Vnútorne

Vonkajšie

| | |
|---|--|
| | Dezinfekcia na veterinárnu hygienu: dezinfekcia strukov dojných zvierat (dojníc, byvolov, oviec a kôz) na použitie po dojení. |
| Spôsob(y) aplikácie | Spôsob: Ručný postrek pomocou elektrického postrekovača Detailný opis: - |
| Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie | Aplikačná dávka: Kravy a byvol: 12 – 15 ml/ošetrovanie Ovce: 6 – 7,5 ml/ošetrovanie Kozy: 7 – 9 ml/ošetrovanie Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: Aplikácia po dojení: 1 – 3x/deň (po každom dojení) |
| Kategória(ie) používateľov | Profesionálne |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | Kanister (HDPE): 1 – 35 kg Barel (HDPE): 35 – 240 kg IBC nádrž (HDPE): 1000 kg |

4.4.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

- 1) Otvorte nádobu obsahujúcu prípravok RTU a vložte nasávaciu trubicu elektrického postrekovača.
- 2) Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.
- 3) Bezprostredne pred dojením struky dôkladne očistite jednorázovou papierovou utierkou/handričkou.
- 4) Po dojení nastriekajte dezinfekčný prostriedok na struky elektrickým postrekovačom. Dezinfekčným prostriedkom sa musí pokryť každý struk po celej dĺžke struku (3 – 5 cm).
- 5) V prípade potreby vymeňte prázdnu nádobu za novú nádobu obsahujúcu prípravok RTU.
- 6) Po ošetrovaní nechajte zvieratá stáť aspoň päť minút. Prípravok ponechajte na strukoch do ďalšieho dojenja.
- 7) Po dezinfekcii vložte systém nasávacej trubice do vedra s vodou a pumpovaním vody opláchnite rozprašovač.

4.4.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Ak opatrenia na zmiernenie rizika nemožno nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami, použijú sa tieto opatrenia na zmiernenie rizika pre zamestnancov:
Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.
- 2) Na naplnenie prípravku do aplikačného zariadenia sa odporúča použiť dávkovaciu pumpu.

4.4.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.4.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

| |
|---|
| - |
|---|

4.4.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

| |
|---|
| - |
|---|

4.5 Opis použitia

Použitie 5 - Použitie 2.5 – Dezinfekcia strukov dojných zvierat: Dezinfekcia strukov automatickým postrekom robotom po dojení

| | |
|--|--|
| Typ výrobku | Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | nie je relevantné |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | Vedecký názov: – Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: - Vedecký názov: – Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: - |
| Oblasti použitia | Vnútorne Vonkajšie Dezinfekcia na veterinárnu hygienu: dezinfekcia strukov dojných zvierat (dojníc, byvolov, oviec a kôz) na použitie po dojení. |
| Spôsob(y) aplikácie | Spôsob: Automatický postrek robotom Detailný opis: - |
| Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie | Aplikačná dávka: Kravy a byvolky: 12 – 15 ml/ošetrovanie Ovcy: 6 – 7,5 ml/ošetrovanie Kozy: 7 – 9 ml/ošetrovanie Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: Aplikácia po dojení: 1 – 3x/deň (po každom dojení) |
| Kategória(ie) používateľ'ov | Profesionálne |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | Kanister (HDPE): 1 – 35 kg Barel (HDPE): 35 – 240 kg IBC nádrž (HDPE): 1000 kg |

4.5.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

- 1) Otvorte nádobu obsahujúcu prípravok RTU a vložte nasávaciu trubicu robotického dojacieho zariadenia.
 - 2) Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.
 - 3) Struky čistí robot automatickými kefkami.
 - 4) Po robotickom dojení sa dezinfekčný prostriedok automaticky nastrieka na struky z ramena dojacieho zariadenia.
 - 5) Po ošetrení nechajte zvieratá stáť aspoň päť minút. Prípravok ponechajte na strukoch do ďalšieho dojenja.
 - 6) Oplachovanie postrekovača sa vykonáva automaticky.

4.5.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na naplnenie prípravku do aplikačného zariadenia je potrebné použiť dávkovaciu pumpu.

4.5.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.5.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.5.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Pozrite konkrétny návod na použitie.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

- 1) Uchovávajúte mimo dosahu detí.
- 2) Keď sa vykonáva aj dezinfekcia pred dojením, dezinfekcia sa musí vykonať pomocou prípravku na báze inej účinnej látky (nie jódu).

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
V prípade rozliatia alebo úniku zabráňte šíreniu a zozbierajte uniknutý produkt na zneškodnenie. Zneškodnenie musí byť v súlade s miestnymi požiadavkami.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

- 1) Na konci ošetrovania nepoužitý výrobok, použité papierové utierky a obal zlikvidujte podľa miestnych požiadaviek.
- 2) Použitý výrobok sa môže spláchnuť do verejnej kanalizácie alebo zlikvidovať na hnojisku v závislosti od miestnych požiadaviek.
- 3) Zabráňte vypusteniu do samostatných čističiek odpadových vôd.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

- 1) Neskladujte pri teplote vyššej ako 30 °C.
- 2) Trvanlivosť 18 mesiacov.

6. Ďalšie informácie

-