



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22


**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID**  
Nr. RO/2019/0149/MRA/IT/2012/00043/AUT

In conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide si ale HOTARARII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, in baza documentelor depuse in dosarul tehnic, Comisia Nationala pentru Produse Biocide, in sedinta din data 28.06.2019, a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piata in Romania, conform prevederilor legale in vigoare.

**I. TIPUL AUTORIZATIEI**

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : ITALIA
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr. : I/2012/00043/AUT



II. Data emiterii autorizatiei: 28.06.2019  
III. Data expirării autorizatie: 31.12.2022

**IV.**

**DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID : MURIN DIFE BLOCK / VEBITOX DIFE BLOCK**

**V.**

**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI : Vebi Instituto Biochimico s.r.l.**  
Via Desman 43, 35010, S.Eufemia di Borgorico (PD)

**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: Vebi Instituto Biochimico s.r.l.**  
Via Desman 43, 35010, S.Eufemia di Borgorico (PD)

**NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : Vebi Instituto Biochimico s.r.l.**  
Via Desman 43, 35010, S. Eufemia di Borgorico (PD)  
Loc de productie : Vebi Instituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43 35010 S. Eufemia di Borgorico(PD)

**NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: Activa SRL/Dr. Tezza SRL**  
Via Feltre 32 20132 milano Italia  
Loc de productie : Via tre Ponti 22 Santa Maria di Zevio 37050 Verona Italia



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
 Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**

TIPUL DE PRODUS : TB 4 Biocicide

**VII.**

**CATEGORIILE DE UTILIZATORI :** Profesioniști.  
 Profesioniști instruiți.

**VIII.**

**TIPUL PREPARATULUI:** momeală sub formă de cuburi parafinate

**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ**

**1) Substanța activă**

Denumire comerciala	Difenacoum
Denumirea IUPAC	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphtyl)-4-hydroxycoumarin
Numar CAS	56073-07-5
Numar CE	259-978-4
Continut de substanță activă	0,005%

**2) Substanța inactivă/nonactivă – nu se specifică**

**COPIE**

**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI**

Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice*

Simboluri	GHS0 8
Fraze de pericol (H)	H360D- Poate dăuna fătului. H373- Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.
Fraze de prudență (P)	P102 -A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P202- A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P280- Purtați mănuși de protecție. P308+P313- ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. P501- Eliminați produsul și recipientul în conformitate cu reglementările locale.
Pictograma	

**COPIE**

**XI. AMBALAREA**

Pentru profesioniști: Bloc de momeală de 10 g și 20 g.  
 Dimensiuni pachet: de la 1,5 la 25 de kg.  
 În cazul pachetelor de peste 10 kg, este obligatorie ambalarea în pungi separate de maxim 5 sau 10 kg.  
 Materialul de ambalare:



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
 Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**

- Plic plastic: coextrudat/ PEID/polietilenă
- Plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- Plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- Conservă/Tablă, hârtie, carton,
- Cutie, hârtie, carton cu plicuri de plastic coextrudat/ PEID/polietilenă
- Găleată: PEID

Tip de ambalaj: cutie de carton, plic (plastic: PP, MAT20 + PET MET 12 + PE45), galeata.

Pentru profesioniști instruiți: Bloc de momeală de 10 g și 20 g.

Dimensiuni pachet: de la 1,5 la 25 de kg.

În cazul pachetelor de peste 10 kg, este obligatorie ambalarea în pungi separate de maxim 5 sau 10 kg.

Materialul de ambalare:

- plic plastic: coextrudat/ PEID/polietilenă
- plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- Plic plastic: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- Conservă/Tablă, hârtie, carton,
- Cutie, hârtie, carton cu plicuri de plastic coextrudat/ PEID/polietilenă
- Găleată: PEID

Tip de ambalaj: cutie de carton, plic (plastic: PP, MAT20 + PET MET 12 + PE45), galeata.

**COPIE**

**XII. POSIBILE EFECTE ADVERSE DIRECTE SAU INDIRECTE**

Asupra sănătății umane: Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale. În cazuri severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau în urină.

Asupra sănătății animalelor:

**PERICULOS PENTRU FAUNA SĂLBATICĂ.**

Din cauza modalității de acțiune întârziată, rodenticidele anticoagulante necesită 4 până la 10 zile de la administrarea momeii pentru a fi eficiente.

Rozătoarele sunt purtătoare de boli. De aceea, nu se recomandă atingerea rozătoarelor decedate cu mâinile neprotejate, se vor utiliza mănuși de protecție sau instrumente, precum cleștii.

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Prin ingerare, simptomele, care pot apărea ulterior, pot include sângerarea nazală sau a gingiilor. În cazuri grave, se pot manifesta hematoame și

**COPIE**

prezența de sânge în fecale și urină.  
 Antidot: Vitamină K administrată numai de personal medical / veterinar.

La expunerea oricărei persoane, nu se provoacă vărsături. În caz de înghițire, se consulta imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta produsului. Se contactează un medic veterinar în caz de ingestie de către un animal de companie.

Stațiile de intoxicație trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: "nu se deplasează sau nu se deschide"; "conține o momeală rodenticidă"; "numele produsului sau numărul autorizației"; "substanță activă (e)" și "în caz de incident, apelați la un centru de otrăvire.

Asupra mediului: Sol: Trebuie evitată cât mai mult expunerea solului la produsul formulat precum și evitarea patrunderii în sol, ținând cont de proprietățile PBT ale difenacoumului. Pe baza

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



**COPIE**

Formașor disponibil nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor.

Apa: Substanța activă îndeplinește criteriile de PBT: este persistentă în apă, cu tendință de bioacumulare în organisme și foarte toxică.

Aer: Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

Organisme acvatice; Produsul prezintă un risc acceptabil pentru organismele acvatice.

Alte organisme țintă: Produsul nu prezintă risc neacceptabil pentru organismele din mediul terestru. Fără efecte semnificative asupra proceselor de respirație/nitrificare din sol.

**XIII. ORGANISMELE DĂUNĂTOARE VIZATE**

Activitatea	Metoda de testare / Protocolul de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
Rodenticidă, anticoagulant, toxină cu acțiune prin ingestie	Testare în condiții de teren test de hrănire la alegere conform TNFG pentru TP14. Doze utilizate: 200g momeală, îmbatrănită/sație de intoxicare, 8 stații de intoxicare.	<i>Mus musculus</i>	Difenacoum 0.005% g/g Momeală îmbatrănită	Mortalitate 100% în 11,5 zile
Rodenticidă, anticoagulant, toxină cu acțiune prin ingestie	Testare în condiții de teren test de hrănire la alegere conform TNFG pentru TP14. Doze utilizate: 200g momeală, îmbatrănită/sație de intoxicare, 8 stații de intoxicare.	<i>Rattus rattus</i>	Difenacoum 0.005% g/g Momeală proaspătă	Mortalitate 100% în 10 zile
Rodenticidă, anticoagulant, toxină cu acțiune prin ingestie	Testare în condiții de teren test de hrănire la alegere conform TNFG pentru TP14. Doze utilizate: 100g momeală, îmbatrănită/sație de intoxicare, 14 stații de intoxicare.	<i>Rattus norvegicus</i>	Difenacoum 0.005% g/g Momeală îmbatrănită	Mortalitate 100% în 37 zile

**COPIE**

**COPIE**

Observație: În cazul rezistenței organismelor țintă la difenacoum se folosesc alte metode alternative.



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID E**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

## COPIE

### IV. INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :

Utilizat în interior și în jurul clădirilor pentru combaterea infestărilor cu șoarece de casă (*Mus musculus*), șobolan brun (*Rattus norvegicus*) și șobolan negru (*Rattus rattus*). Substanța activă este anticoagulant, toxină cu acțiune prin ingestie ce provoacă mortalitate rodentelor. Momeala rodenticidă trebuie așezată în stații de intoxicare adecvate, protejate de intemperii și împotriva ingestiei accidentale de către specii nevizate. Doze recomandate: pentru șoarece de casă: 40g/ stație de intoxicare la 5-10m în funcție de gradul de infestare; pentru șobolani: 60-100g/ stație de intoxicare la 5-10m în funcție de gradul de infestare. Se verifică la 3 zile apoi la 7 zile și se înlocuiește momeala consumată sau deteriorată. Produsul se utilizează maxim 35 zile, apoi se evaluează eficacitatea. În cazul rezistenței organismelor țintă la difenacoum se folosesc alte metode alternative. Momeala neconsumată se colectează pentru dispunerea/tratarea finală de către personal autorizat. Se utilizează mănuși de protecție.

Metoda de aplicare: Produsul se utilizează ca momeală rodenticidă gata de utilizare sub formă de cuburi parafinate pentru uz profesional în interiorul și în jurul clădirilor pentru combaterea infestărilor cu șoarece de casă (*Mus musculus*), șobolan brun (*Rattus norvegicus*) și șobolan negru (*Rattus rattus*). Substanța activă este anticoagulant, toxină cu acțiune prin ingestie ce provoacă mortalitate rodentelor. Momeala rodenticidă trebuie așezată în stații de intoxicare adecvate, protejate de intemperii și împotriva ingestiei accidentale de către specii nevizate. Se verifică la 3 zile apoi la 7 zile și se înlocuiește momeala consumată sau deteriorată. Produsul se utilizează maxim 35 zile, apoi se evaluează eficacitatea. În cazul rezistenței organismelor țintă la difenacoum se folosesc alte metode alternative. Momeala neconsumată se colectează pentru dispunerea/tratarea finală de către personal autorizat. Se utilizează mănuși de protecție.

Doze recomandate: pentru șoarece de casă: 40g/ stație de intoxicare la 5-10m în funcție de gradul de infestare; pentru șobolani: 60-100g/ stație de intoxicare la 5-10m în funcție de gradul de infestare. Intervalul de timp pentru primul acces al oamenilor sau animalelor în zonele în care s-a folosit produsul biocid: nu este cazul.

Perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate: nu este cazul.

### XV. INSTRUCIUNI DE PRIM AJUTOR

În caz de contact cu pielea: Zonele corpului care au venit în contact cu produsul, trebuie spălate imediat și abundent cu apă curentă. Spălați cu multă apă și săpun. Spălați complet corpul (duș sau baie). Îndepărtați imediat hainele contaminate și eliminați-le în mod sigur.

În caz de contact cu ochii: În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.

În caz de ingerare: Nu provocați în nici un caz vomă. Obțineți asistență medicală imediat.

În caz de inhalare: Conduceți accidentatul la aer liber și țineți-l la cald și în repaus. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare: În caz de accident sau stare proastă consultați imediat un medic (dacă este posibil arătați instrucțiunile de folosire sau fișa de securitate).

Antidot: vitamina K1, administrată numai de personal medical.



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

# COPIE

## VI. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Respectiv pentru utilizarea produsului biocid :

Impiedicati patrunderea in sol/subsol. Impiedicati varsarea in apele de suprafata sau in reseaua de canalizare . Retineti apa de spalat contaminata si eliminati-o. In cazul in care punctele de momeala sunt apropiate apelor de suprafata(rauri, iazuri, cai navigabile, baraje, canale de irigare) sau a sistemelor de drenare a apei, evitati ca momeala sa intre in contact cu apa.Nu se reutilizeaza ambalajul si nu se elibereaza in medi produsul biocid.Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.In caz de utilizare externa, statiile de intoxicare trebuie sa fie acoperite si plasate in locuri strategice, pentru a reduce la minim riscul de expunere a speciilor nevizate .Nu lasati produsul la indemana copiilor, pasarilor, animalelor de companie si animalelor de ferma si a altor animale care nu sunt vizate .Periculos pentru animalele salbatice .

Masuri in caz de dispersie accidentala

In caz de scurgere de gaz sau penetrare in cursuri de apa, sol sau sistemul de canalizare, informati autoritatile raspunzatoare.In cazul in care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie sa se ia masuri imediate pentru colectarea lui si curatarea zonei.Material corespunzator pentru strangere : material absorbant, organic, nisip. Retineti apa de spalat contaminata si eliminati-o.

Metode de decontaminare ;

Capcanele se inspecteaza cel putin o data la 2-3 zile pentru soare sau 5-7 zile pentru sobolani, la inceperea tratamentului si cel putin saptamanal ulterior, pentru a verifica daca momeala este acceptata si daca se mentine integritatea capcanelor, precum si pentru a indeparta rozatoarele moarte .In cazul in care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie sa se ia masuri imediate pentru colectarea lui si curatarea zonei.Material corespunzator pentru strangere ; material absorbant, organic, nisip

## XVII. MASURI PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI A HRANEI PENTRU ANIMALE

Înainte de utilizare, se recomanda citirea si respectarea instructiunilor de pe ambalajul produsului, precum și informațiile care îl însoțesc sau care sunt furnizate la punctul de vânzare.

Înainte de a poziționa momelile inspectați zona infestată se efectueaza o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile în care acestea își desfășoară activitatea și pentru a stabili cauza probabilă și amploarea infestării.

Se indeparteaza sursele de hrană ușor accesibile de rozătoare (de exemplu boabe vărsate sau resturi alimentare). Nu curățați zona infestată înainte de tratament deoarece această acțiune deranjează populația de rozătoare și acceptarea momelii devine mai dificilă.

Produsul trebuie utilizat numai în cadrul sistemului de management integrat al infestațiilor (IPM) care include și alte măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control.

Se ia în considerare măsuri preventive de control (de exemplu: închiderea găurilor, îndepărtarea, pe cât posibil, a tuturor surselor de hrană și apă), pentru a putea controla cantitatea de produs consumată și pentru a reduce posibilitatea reinfestării.

Recipientele cu momeală trebuie amplasate în imediata vecinătate a locurilor în care a fost observată anterior activitatea rozătoarelor (de exemplu zone de trecere, cuiburi, garduri pentru intrarea animalelor, deschideri, vizuini etc.).

Dacă este posibil, se fixeaza recipientele cu momeală pe pământ sau alte structuri.

Pe recipientele pentru momeli trebuie aplicată o etichetă clară, care să indice faptul că acestea conțin



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
 Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**

Produsele rodenticide și ea nu trebuie aruncate sau deschise.  
 Atunci când produsul este utilizat în spații publice, zonele tratate trebuie indicate pe toată durata tratamentului. Lângă momeli trebuie amplasat un indicator pentru a semnaliza riscul de otrăvire primară și secundară datorită anticoagulantului, precum și măsurile de prim ajutor care trebuie acordate în caz de otrăvire.  
 Momeala trebuie aplicată astfel încât să nu poată fi scoasă din recipientul pentru momeală.  
 Nu se amplasează produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și altor animale nevizate.  
 Produsul se depozitează departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de uneltele sau suprafețele care pot intra în contact cu produsul.  
 În timpul manipulării produsului se poartă mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (UNI EN 374).  
 Nu se mănâncă, nu se bea și nu se fumează în timpul utilizării produsului. Măinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului trebuie spalate.  
 În cazul în care cantitatea de momeală consumată este scăzută în comparație cu dimensiunea evidentă a infestării, se evaluează re poziționarea punctelor de momeală în alte locuri și posibilitatea de a schimba tipul de momeală.  
 Dacă, după o perioadă de tratament de 35 de zile, momealile conținute în momeală și momeala observă o reducere a activității rozătoarelor, trebuie stabilită cauza cea mai probabilă. Dacă alte elemente au fost deja excluse, este probabil că sunt prezente rozătoare rezistente: prin urmare, trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant sau a unui rodenticid anticoagulant mai eficient, dacă este disponibil. Luați în considerare și utilizarea capcanelor ca măsură alternativă de control.  
 La sfârșitul perioadei de tratament momealile rămase sau recipientele cu momeli sunt îndepărtate conform cerințelor locale.  
 Nu se deschid plicurile interioare care conțin momeala.  
 Pe recipientele cu momeală trebuie aplicată o etichetă cu următoarele informații: „a nu se deplasa sau deschide”; „conține un produs rodenticid”; „MURIN DIFE BLOCK ”; „substanța(ele) activă(e)” și „în caz de accident consultați un centru de dispecerat pentru otrăviri”.

**COPIE**

**XVIII. INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ pentru**

**COPIE**

Eliminarea deseurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 207/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați. Eliminarea rozătoarelor moarte și momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu legislația în vigoare. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mâini sau instrumente (clești) atunci când le îndepărtați. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile)  
 Ambalaj: Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid

**XIX. CONDITIILE DE DEPOZITARE :** Evitați temperaturile peste 50°C. a se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra recipientul original închis etans și ferit de lumina directă a soarelui. A se păstra în locuri unde nu au acces copii, pasarile, animalele de companie și animalele de fermă.



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
 Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**COPIE**

DECRET DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 24 luni.

**XX. ALTE INFORMATII:**

Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momeii.

- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli.

Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați.

- Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.

Respectarea restricțiilor pentru utilizarea produsului biocid :

Impiedicați patrunderea în sol/subsol. Impiedicați varsarea în apele de suprafață sau în rețeaua de canalizare . Retineți apa de spălat contaminată și eliminați-o. În cazul în care punctele de momeala sunt apropiate apelor de suprafață(rauri, iazuri, cai navigabile, baraje, canale de irigare) sau a sistemelor de drenare a apei, evitați ca momeala să intre în contact cu apa.Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediul produsul biocid. Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare. În cazul utilizării externe, stațiile de intoxicație trebuie să fie acoperite și presărate în curșate, pentru a reduce la minim riscul de expunere a speciilor nevizate .Nu lăsați produsul în îndesări, copiiiilor pasrilor, animalelor de companie și animalelor de fermă și a altor animale care nu sunt vizate .Periculos pentru animalele sălbatice .

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

Acest certificat reprezintă reînnoirea certificatului pentru autorizarea produsului biocid nr.

RO/2019/0149/MRA/IT/2012/00043/AUT  
**COPIE**

PRESEDINTE,  
 Dr. Chim. Gabriela Cilinca