

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Biotoll Ratimor rágcsálóirtó blokk

Terméktípus(ok)

PT14: Rágcsálóirtó szerek

Az engedély száma: HU-2013-MA-14-00055-0000

R4BP eszközszám: HU-0001904-0000

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	Biotoll Ratimor Rágcsálóirtó blokk Ratimor Rágcsálóirtó blokk
------------------	--

1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	Unichem d.o.o.
	Cím	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Szlovénia
Az engedély száma		HU-2013-MA-14-00055-0000
<i>R4BP eszközszám</i>		HU-0001904-0000
Az engedély megadásának dátuma		16/09/2013
Az engedély lejáratának dátuma		31/12/2026

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	Unichem d.o.o.
A gyártó címe	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Szlovénia
Gyártási helyek	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Szlovénia

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Bromadiolon
A gyártó neve	Activa s.r.l
A gyártó címe	Via Feltre 32 20132 Milanó Olaszország
Gyártási helyek	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Olaszország

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	hatóanyag	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. A formuláció típusa(i)

RB Halcsalétek (felhasználásra kész)

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	<p>H360D: Károsíthatja a születendő gyermeket.</p> <p>H372: Károsítja a szerveket ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (vér).</p> <p>H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.</p>
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	<p>P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.</p> <p>P202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.</p> <p>P264: A használatot követően a(z) kéz-t alaposan meg kell mosni.</p> <p>P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.</p> <p>P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.</p> <p>P405: Elzárva tárolandó.</p> <p>P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.</p>

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat - Házi egerek és/vagy patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - beltéri

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: egyéb: házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: egerek irtásakor: legfeljebb 40 gramm csalétek/etetőhely; patkányok irtásakor: legfeljebb 200 gramm csalétek/etetőhely Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: egerek irtásakor: • kismértékű ártalom esetén: 5 méterenként legfeljebb 40 gramm csalétek; • nagymértékű ártalom esetén: 2 méterenként legfeljebb 40 gramm csalétek. patkányok irtásakor: • kismértékű ártalom esetén: 10 méterenként legfeljebb 200 gramm csalétek; • nagymértékű ártalom esetén: 5 méterenként legfeljebb 200 gramm csalétek.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 3 kg. Maximális külső csomag mérete 25 kg-ig.

- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) vagy PE/PP vagy papír/PE külső zacskókban kartonpapírból vagy farostlemezről készült külső csomagolásban. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) HDPE vagy polipropilén (PP) vödörben. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozban. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozokban PE zsákokkal vagy bélésanyaggal. Legfeljebb 20 kg.
- előtöltött vagy újratölthető, illetéktelen felnyitás ellen védett HDPE vagy PP csalétekállomásba csomagolva egy vagy több 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (egerek ellen legfeljebb 40g, patkányok ellen legfeljebb 200 g etetőállomásonként). A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.
- HDPE vagy PP csalétekállomásban (újratölthető vagy egyszer használatos) egy vagy két 100 grammos blokk, vagy egy, kettő, három vagy négy 50 grammos blokk, vagy 10db 20 grammos blokk, vagy 8db 25 grammos blokk. A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) PE vagy PP csomagokban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) dobozban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) nátronpapír zsákban. Legfeljebb 25 kg.

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A kezelési időszak után távolítsuk el a megmaradó terméket.

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.1.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóirtásról.
- Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

- A terméket ne használja tartósan csalétekként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás kimutatására.
- Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

4.1.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőállomásokat vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.1.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2. A felhasználások leírása

2. táblázat - Házi egerek és/vagy patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - kültéren épületek körül

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: egyéb: házi egér Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	kültéri felhasználás Kültéren épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: egerek irtásakor: legfeljebb 40 gramm csalétek/etetőhely; patkányok irtásakor: legfeljebb 200 gramm csalétek/etetőhely Hígítás (%): -

	<p>A kezelések száma és időzítése: egerek irtásakor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kismértékű ártalomnál: 5 méterenként legfeljebb 40 gramm; • nagymértékű ártalomnál: 2 méterenként legfeljebb 40 gramm. <p>patkányok irtásakor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kismértékű ártalomnál: 10 méterenként legfeljebb 200 gramm; • nagymértékű ártalomnál: 5 méterenként legfeljebb 200 gramm.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	<p>A csomag mérete legalább 3 kg. Maximális külső csomag mérete 25 kg-ig.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) vagy PE/PP vagy papír/PE külső zacskókban kartonpapírból vagy farostlemezből készült külső csomagolásban. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) HDPE vagy polipropilén (PP) vödörben. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozban. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozokban PE zsákokkal vagy bélésanyaggal. Legfeljebb 20 kg. - előtöltött vagy újratölthető, illetéktelen felnyitás ellen védett HDPE vagy PP csalétekállomásba csomagolva egy vagy több 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (egerek ellen legfeljebb 40g, patkányok ellen legfeljebb 200 g állomásonként). A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg. - HDPE vagy PP csalétekállomásban (újratölthető vagy egyszer használatos) egy vagy két 100 grammos blokk, vagy egy, kettő, három vagy négy 50 grammos blokk, vagy 10db 20 grammos blokk, vagy 8db 25 grammos blokk. A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) PE vagy PP csomagokban. Legfeljebb 25 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) dobozban. Legfeljebb 25 kg.

- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) nátronpapír zsákban. Legfeljebb 25 kg.

4.2.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.
- Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.
- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket.
- A csalétket úgy kell kihelyezni, hogy gyermekek és nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.

4.2.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.2.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóirtásról.
- Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- A terméket ne használja tartósan csalétként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás kimutatására.
- Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.
- Ne alkalmazza a terméket közvetlenül üregekben.

4.2.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárkok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelébe helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.2.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.3. A felhasználások leírása

3. táblázat - Patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - kültéri nyílt területeken és hulladéklerakókban

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	kültéri felhasználás Kültéren - nyílt területen Kultéren - hulladéklerakók területén
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: legfeljebb 200 gramm csalétek/etetőhely Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: Kismértékű ártalomnál: 10 méterenként legfeljebb 200 gramm. Nagymértékű ártalomnál: 5 méterenként legfeljebb 200 gramm.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 3 kg. Maximális külső csomag mérete 25 kg-ig. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) vagy PE/PP vagy papír/PE külső zacskókban kartonpapírból vagy farostlemezből készült külső csomagolásban. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) HDPE vagy polipropilén (PP) vödörben. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozban. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozokban PE zsákokkal vagy bélésanyaggal. Legfeljebb 20 kg. - előtöltött vagy újratölthető, illetéktelen felnyitás ellen védett HDPE vagy PP csalétekállományba csomagolva egy vagy több 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (legfeljebb 200 g blokk etetőállomásonként). A csalétekállományok külső kartondobozba vagy műanyag

hőhegesztett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.

- HDPE vagy PP csalétekállomásban (újratölthető vagy egyszer használatos) egy vagy két 100 grammos blokk, vagy egy, kettő, három vagy négy 50 grammos blokk, vagy 10db 20 grammos blokk, vagy 8db 25 grammos blokk. A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) PE vagy PP csomagokban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) dobozban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) nátronpapír zsákban. Legfeljebb 25 kg.

4.3.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.
- Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.
- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket.
- A csalétket úgy kell kihelyezni, hogy gyermekek és nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.

4.3.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.3.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat.
- Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- A terméket ne használja tartósan csalétekként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására.
- Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

4.3.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.3.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.3.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.4. A felhasználások leírása

4. táblázat - Patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - csatornában

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célgazdaság(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: egyéb: vándorpatkány Fejlődési szakasz: egyéb: fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület(ek)	egyéb: Egyéb Csatornák
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban vagy eltakart és védett rágcsálóirtó pontokon alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.Csatornarendszerben történő alkalmazáskor a csalétket úgy kell kihelyezni és rögzíteni, hogy a víz / szennyvíz ne érhesse el vagy moshassa el.Kizárólag olyan csatornahálózatban helyezze ki a terméket, amely kapcsolódik a szennyvíztisztító telephez.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: legfeljebb 200 gramm Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási dózis patkányok irtásakor csatornában: legfeljebb 200 gramm csatornafedelenként.
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 3 kg. Maximális külső csomag mérete 25 kg-ig. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) vagy PE/PP vagy papír/PE külső

zacskókban kartonpapírból vagy farostlemezéből készült külső csomagolásban. Legfeljebb 20 kg.

- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) HDPE vagy polipropilén (PP) vödörben. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozban. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozokban PE zsákokkal vagy bélésanyaggal. Legfeljebb 20 kg.
- előtöltött vagy újratölthető, illetéktelen felnyitás ellen védett HDPE vagy PP csalétekállomásba csomagolva egy vagy több 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (legfeljebb 200 g etetőállomásonként). A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.
- HDPE vagy PP csalétekállomásban (újratölthető vagy egyszer használatos) egy vagy két 100 grammos blokk, vagy egy, kettő, három vagy négy 50 grammos blokk, vagy 10db 20 grammos blokk, vagy 8db 25 grammos blokk. A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) PE vagy PP csomagokban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) dobozban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) nátronpapír zsákokban. Legfeljebb 25 kg.

4.4.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A csalétket úgy kell elhelyezni, hogy ne érje víz, és ne mosódhasson ki.

4.4.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.4.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ne alkalmazzuk a terméket pulzáló / ritmusos utántöltési rendszerű kezelésekben.

4.4.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.4.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.4.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

- Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.
- Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.
- Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékokat). Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.
- A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.
- A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsálói aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).
- Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.
- Az etetőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni.
- A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról.
- A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.
- A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.
- Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során.
- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.
- A kezelt területek ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján. E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal.
- Ha a csalétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló méretéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.
- Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsálói aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot. Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegye fontolóra nem véralvadásgátló rágcsálóirtó, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadásgátló rágcsálóirtó használatát. Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálóirtásról.
- Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn.
- A termék 35 nap után kizárólag a fertőzöttség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább
- A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadásgátlókat! Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadásgátló hatóanyagot használjon.
- Az eltartat és védett rágcsálóirtó pontokon használt csapdákat vagy szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel.
- A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

- megjegyzés:– A termékinformáció (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen figyelmeztet arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett foglalkozásszerű felhasználóknak”).

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

- A termék véralvadást gátló anyagot tartalmaz. Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevezetés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.
- Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.
- Továbbá:
 - Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.
 - Szembe kerülés esetén: ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány percen át öblögesse a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.
 - Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon száján át. Tilos hánytatni! Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét.
- Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljon állatorvoshoz.
- Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtót tartalmaz”; „termék neve és az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)
- Veszélyes a vadon élő állatokra.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és etetőállomásokat veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Az irtószert tartalmazó csomagolás zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.
- Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
- Szavatossági idő: 2 évig

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

- A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágszálóirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását.
- A rágszálók betegséget hordozhatnak. Eltávolításuk során az elpusztult rágszálókat ne érintse meg pusztán kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.
- A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

Biotoll Ratimor rágszálóirtó blokk/ Ratimor Rágszálóirtó blokk

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

II. forgalmi kategóriájú irtószer

Engedélytulajdonos: Unichem d.o.o. (Vrhnika, Szlovénia)

NNK engedélyszám: HU-2013-MA-14-00055-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: 2.2., 3.1., 4.1-4.4 (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei.

A műanyag rágszálóirtó dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Biotoll Ratimor rágszálóirtó blokk/ Ratimor Rágszálóirtó blokk

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

Ellenszere: K1-vitamin

Engedélyes: Unichem d.o.o. (Vrhnika, Szlovénia)

NNK engedélyszám: HU-2013-MA-14-00055-0000