



Bratislava, 16. mája 2018  
Naša značka: 14904/2018-3052-26288  
Ref. číslo: bio/1215/O/18/RM

## ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti číslo BC-MK024525-38 žiadateľa Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko zo dňa 30.05.2016 o obnovu autorizácie číslo SK16-MRS-003-2003/15 podľa čl. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu (ďalej len „nariadenie o obnovách“) rozhodlo tak, že

### **o b n o v u j e a u t o r i z á c i u b i o c í d n e h o v ý r o b k u**

*Názov biocídneho výrobku:* **Ratimor Brodifacoum Wax Blocks**

*Číslo autorizácie biocídneho výrobku:* **SK16-MRS-003**

*Platnosť autorizácie do:* **09. apríla 2023**

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu obnovy autorizácie biocídneho výrobku č. IE/BPA 70515 platnej do 09.04.20123 vydané príslušným orgánom referenčného členského štátu Írsko dňa 09.04.2018,

a zároveň ruší rozhodnutie o autorizácii č. bio/716/O/16/RM zo dňa 27.05.2016 v znení rozhodnutia č. bio/6/O/17/RM o predĺžení platnosti a Dodatok k rozhodnutiu o autorizácii č. bio/378/O/18/DM zo dňa 13.02.2018 a nahrádza ich týmto rozhodnutím o obnove autorizácie biocídneho výrobku,

a stanovuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocídnych výrobkov autorizovaných rozhodnutím o autorizácii č. bio/716/O/16/RM zo dňa 27.05.2016 v znení rozhodnutia č. bio/6/O/17/RM o predĺžení platnosti a Dodatkom k rozhodnutiu o autorizácii č. bio/378/O/18/DM zo dňa 13.02.2018 pod pôvodným autorizačným číslom SK16-MRS-003-2003/15 na trhu a ich použitie do 31.10.2018.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Žiadateľ Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko doručení žiadosti číslo BC-MK024525-38 zo dňa 30.05.2016 prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (ďalej len „R4BP“) v súlade s čl. 71 nariadenia o biocídnych výrobkoch a na základe nariadenia o obnovách požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) ako príslušný orgán dotknutého členského štátu o obnovu autorizácie biocídneho výrobku udelenej vzájomným uznaním vnútroštátnej autorizácie pod číslom autorizácie SK16-MRS-003-2003/15.

Príslušný orgán referenčného členského štátu Írsko v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku obnovil autorizáciu dňa 09.04.2018 pod číslom IE/BPA 70515 s platnosťou do 09.04.2023.

Preskúmaním žiadosti MH SR zistilo, že žiadosť o obnovu spĺňa požiadavky ustanovené nariadením o obnovách, a že zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku je v súlade s dohodnutým zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku.

Na základe toho MH SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídneho výrobku v súlade s čl. 69 nariadenia o biocídnych výrobkoch a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s čl. 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Toto rozhodnutie o obnove autorizácie biocídneho výrobku ruší a nahrádza predchádzajúce rozhodnutie o autorizácii č. bio/716/O/16/RM zo dňa 27.05.2016 v znení rozhodnutia č. bio/6/O/17/RM o predĺžení platnosti a Dodatok k rozhodnutiu o autorizácii č. bio/378/O/18/DM zo dňa 13.02.2018.

Keďže pri obnove autorizácie došlo k zmene čísla autorizácie, MH SR zároveň stanovuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocídnych výrobkov pod pôvodným autorizačným číslom SK16-MRS-003-2003/15 na trhu a ich použitie do 31.10.2018.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Ročné platby sú splatné bez výzvy ministerstva hospodárstva každoročne do 30. júna kalendárneho roka. Ak ročná platba nie je zaplatená v plnej výške v uvedenej lehote, možno ju zaplatiť v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, pričom príslušná sadzba ročnej platby je dvojnásobná. Ak ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe autorizácie nie je zaplatená ani v plnej dvojnásobnej sume v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení autorizácie a rozhodnutie o zrušení bezodkladne vyznačí v Registri pre biocídne výrobky. Proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva podľa predchádzajúcej vety nemožno podať rozklad. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

V súlade s ustanoveniami čl. 40 nariadenia o biocídnych výrobkoch a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu, je možná obnova autorizácie biocídneho výrobku.

#### **Poučenie:**

Podľa čl. 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP) považuje za oznámenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



RNDr. Ján Čepček, PhD.  
riaditeľ

Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: **Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko**

# Príloha 1

Bratislava, 16. mája 2018

Naša značka: 14904/2018-3052-26288

Ref. číslo: bio/1125/O/18/RM

## ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCIDNEHO VÝROBKU

Názov výrobku		Ratimor Brodifacoum Wax Blocks				
<b>1. Administratívne informácie</b>						
<b>1.1. Obchodné názvy výrobku</b>						
Oblasť trhu		Slovensko				
Obchodné názvy		Ratimor Brodifacoum Wax Blocks Glodacid Plus parafínové bloky Brodifakum parafínové bloky				
<b>1.2. Držiteľ autorizácie</b>		<b>Názov</b>		Unichem d.o.o.		
		<b>Adresa</b>		Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko		
Číslo autorizácie		SK16-MRS-003				
R4BP žiadosť o obnovu autorizácie č.		BC-MK024525-38				
Dátum rozhodnutia o obnove autorizácie		16. mája 2018				
Dátum skončenia platnosti autorizácie		09. apríla 2023				
<b>1.3. Výrobca výrobku</b>						
Názov výrobcu		Unichem d.o.o.				
Adresa výrobcu		Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovinsko				
Miesto výrobných priestorov		Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovinsko				
<b>1.4. Výrobca účinnej látky</b>						
Názov látky		Brodifakum				
Názov výrobcu		PelGar International Limited				
Adresa výrobcu		Unit 13, Newman Lane Industrial Estate GU34 2QR Hampshire Spojené kráľovstvo				
Miesto výrobných priestorov		Pražská 54 280 02 Kolín Česká republika				
<b>2. Zloženie a úprava výrobku</b>						
<b>2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku</b>						
<i>BAS</i>	<i>EC</i>	<i>CAS</i>	<i>Bežný názov</i>	<i>Názov IUPAC</i>	<i>Funkcia</i>	<i>Obsah (%)</i>
11	259-980-5	56073-10-0	Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	účinná látka	0,0029
Typ úpravy				RB – Návnada na priame použitie		

<b>3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia</b>	
<i>Výstražné upozornenia</i>	H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
<i>Bezpečnostné upozornenia</i>	P260 Nevdychujte prach. P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite nádobu a nepoužitú návnadu ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi nariadeniami.

<b>4. Autorizované použitia</b>	
<b>4.1. Myš domová – široká verejnosť – vnútorné priestory</b>	
<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<i>Oblasti použitia</i>	Vnútorné, vnútorné priestory
<i>Kategória používateľov</i>	Široká verejnosť – (neprofesionálne)
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)</i>	Myš domová - <i>Mus Musculus</i> (dospelé jedince a mláďatá)
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<i>Dávkovanie</i>	Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Časový rozvrh</i>	Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre.
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Voľné bloky (5g – 20g): (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 100g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 100g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP kontajneroch až do 100g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP vedrách až do 100g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 100g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 100g - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 20g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš). Deratizačné

	<p>staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 100g</p> <p>- balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 20g. Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 100g</p>
<i>4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</i>	
Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.	
<i>4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</i>	
Pozri časť 5.2.	
<i>4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia</i>	
Pozri časť 5.3.	
<i>4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu</i>	
Pozri časť 5.4.	
<i>4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok</i>	
Pozri časť 5.5.	
<b>4.2. Potkany – široká verejnosť – vnútorné priestory</b>	
<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<i>Oblasti použitia</i>	Vnútorné, vnútorné priestory
<i>Kategória používateľov</i>	Široká verejnosť – (neprofesionálne)
<i>Cielové organizmy (vrátane vývojového štádia)</i>	Potkan hnedý – <i>Rattus norvegicus</i> (dospelé jedince a mláďatá) Potkan tmavý – <i>Rattus rattus</i> (dospelé jedince a mláďatá)
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<i>Dávkovanie</i>	Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Časový rozvrh</i>	Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Voľné bloky (5g – 60g): - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP

	<p>baleniach až do 300g</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP kontajneroch až do 300g</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP vedrách až do 300g</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 300g</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 300g</li> <li>- balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g</li> <li>- balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši alebo potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g. Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g</li> <li>- balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g. Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g</li> </ul>
--	---

#### 4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

#### 4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozri časť 5.2.

#### 4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri časť 5.3.

#### 4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri časť 5.4.

#### 4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri časť 5.5.

### 4.3. Potkany – široká verejnosť – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Oblasti použitia	Vonkajšie, vonku okolo budov

<i>Kategória používateľov</i>	Široká verejnosť – (neprofesionálne)
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)</i>	Potkan hnedý – <i>Rattus norvegicus</i> (dospelé jedince a mláďatá) Potkan tmavý – <i>Rattus rattus</i> (dospelé jedince a mláďatá)
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<i>Dávkovanie</i>	Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Časový rozvrh</i>	Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Voľné bloky (5g – 60g): - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP kontajneroch až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) balené v PE alebo PP vedrách až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 300g - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 300g - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši alebo potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g. Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g. Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 300g
<i>4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</i>	
Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.	

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.
<i>4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</i>
Pozri časť 5.2.
<i>4.3.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia</i>
Pozri časť 5.3.
<i>4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu</i>
Pozri časť 5.4.
<i>4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok</i>
Pozri časť 5.5.

<b>4.4. Myš domová – profesionáli – vnútorné priestory</b>	
<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<i>Oblasti použitia</i>	Vnútorné, vnútorné priestory
<i>Kategória používateľov</i>	Profesionáli
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)</i>	Myš domová - <i>Mus Musculus</i> (dospelé jedince a mláďatá)
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<i>Dávkovanie</i>	Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Časový rozvrh</i>	Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre.
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné bloky (5g - 20g): - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 2 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do



	<p>25 kg</p> <p>- balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 20g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</p> <p>- balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 20g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</p>
<b>4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</b>	
<p>Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.</p> <p>Dodržujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.</p>	
<b>4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</b>	
Pozri časť 5.2.	
<b>4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia</b>	
<p>Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.</p>	
<b>4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu</b>	
Pozri časť 5.4.	
<b>4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok</b>	
Pozri časť 5.5.	
<b>4.5. Potkany – profesionáli – vnútorné priestory</b>	
<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<i>Oblasti použitia</i>	Vnútorné, vnútorné priestory
<i>Kategória používateľov</i>	Profesionáli
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)</i>	Potkan hnedý – <i>Rattus norvegicus</i> (dospelé jedince a mláďatá) Potkan tmavý – <i>Rattus rattus</i> (dospelé jedince a mláďatá)
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<i>Dávkovanie</i>	Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Časový rozvrh</i>	Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.

<p><i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i></p>	<p>Minimálna veľkosť balenia 3 kg.  Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg.  Voľné bloky (5g - 60g):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg</li> <li>- balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg</li> <li>- balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do 25 kg</li> <li>- balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</li> <li>- balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</li> </ul>
<p><i>4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.  Dodržujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.</p>	
<p><i>4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Pozri časť 5.2.</p>	
<p><i>4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia</i></p>	
<p>Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.</p>	
<p><i>4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu</i></p>	
<p>Pozri časť 5.4.</p>	
<p><i>4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok</i></p>	
<p>Pozri časť 5.5.</p>	

<b>4.6. Myš domová a/alebo potkany – profesionáli – vonku okolo budov</b>	
<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<i>Oblasti použitia</i>	Vonkajšie, vonku okolo budov
<i>Kategória používateľov</i>	Profesionáli
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)</i>	Myš domová - <i>Mus Musculus</i> (dospelé jedince a mláďatá) Potkan hnedý – <i>Rattus norvegicus</i> (dospelé jedince a mláďatá) Potkan tmavý – <i>Rattus rattus</i> (dospelé jedince a mláďatá)
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
<i>Dávkovanie</i>	Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku. Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Časový rozvrh</i>	Myši: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre. Potkany: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné bloky (5g - 60g): - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany

	(plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.
<b>4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</b>	
<p>Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.</p> <p>Deratizačné staničky sa majú kontrolovať [v prípade myší – najmenej každé 2 až 3 dni] [v prípade potkanov – len každých 5 až 7 dní] na začiatku procesu deratizácie, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.</p> <p>Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.</p> <p>Dodržiajte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.</p>	
<b>4.6.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</b>	
Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.	
<b>4.6.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia</b>	
Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo k styku s vodou.	
<b>4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu</b>	
Pozri časť 5.4.	
<b>4.6.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok</b>	
Pozri časť 5.5.	
<b>4.7. Myš domová a/alebo potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory</b>	
<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<i>Oblasti použitia</i>	Vnútorné, vnútorné priestory
<i>Kategória používateľov</i>	Vyškolení profesionáli
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)</i>	Myš domová - <i>Mus Musculus</i> (dospelé jedince a mláďatá) Potkan hnedý – <i>Rattus norvegicus</i> (dospelé jedince a mláďatá) Potkan tmavý – <i>Rattus rattus</i> (dospelé jedince a mláďatá)
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Návnada na okamžité použitie do zakrytých a chránených miest s návnadou.
<i>Dávkovanie</i>	Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku. Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Časový rozvrh</i>	Myši: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre.

	<p>Potkany: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.</p>
<p><i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i></p>	<p>Minimálna veľkosť balenia 3 kg.  Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg.  Voľné bloky (5g - 60g):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg</li> <li>- balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg</li> <li>- balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do 25 kg</li> <li>- balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</li> <li>- balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</li> </ul>
<p><i>4.7.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.  Dodržujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.  Ak sa používa pri pulznom umiestňovaní návnad: Nahraďte skonsumovanú návnadu až po 3 dňoch, a potom maximálne v 7 dňových intervaloch. Pozbierajte rozsypanú návnadu a mŕtve hlodavce.</p>	
<p><i>4.7.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov [v súlade s uplatniteľným kódexom osvedčených postupov, ak existuje].  Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.  Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.  Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti</p>	

hlodavcov.
4.7.3. <i>Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia</i>
Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.
4.7.4. <i>Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu</i>
Pozri časť 5.4.
4.7.5. <i>Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok</i>
Pozri časť 5.5.

<b>4.8. Myš domová a/alebo potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov</b>	
<i>Typ výrobku</i>	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
<i>Presný opis autorizovaného použitia</i>	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
<i>Oblasti použitia</i>	Vonkajšie, vonku okolo budov
<i>Kategória používateľov</i>	Vyškolení profesionáli
<i>Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)</i>	Myš domová - <i>Mus Musculus</i> (dospelé jedince a mláďatá) Potkan hnedý – <i>Rattus norvegicus</i> (dospelé jedince a mláďatá) Potkan tmavý – <i>Rattus rattus</i> (dospelé jedince a mláďatá)
<i>Spôsob aplikácie</i>	Aplikácia návnady
<i>Opis spôsobu aplikácie</i>	Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Návnada na okamžité použitie do zakrytých a chránených miest s návnadou. Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu.
<i>Dávkovanie</i>	Myši: 10-20g návnady na deratizačnú staničku. Potkany: 10-60g návnady na deratizačnú staničku.
<i>Riedenie</i>	-
<i>Časový rozvrh</i>	Myši: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre. Potkany: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
<i>Veľkosti balenia a obalový materiál</i>	Minimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné bloky (5g - 60g): - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg</li> <li>- (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do 25 kg</li> <li>- balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</li> <li>- balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 60g (až do 20g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 60g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</li> </ul>
--	---

#### 4.8.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Ak sa používa pulzné umiestnenie návnad: Nahradte skonsumovanú návnadu až po 3 dňoch, a potom maximálne v 7-dňových intervaloch. Pozbierajte rozsypanú návnadu a mŕtve hlodavce.

Pri použití vonku návnada musí byť umiestnená v zakrytých a chránených miestach s návnadou, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat.

Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu: Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat a detí. Zakryte alebo zablokujte vstupy do brlohov s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a vysypania návnady.

Dodržujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

#### 4.8.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov [v súlade s uplatniteľným kódexom osvedčených postupov, ak existuje].

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

#### 4.8.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.8.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu
Pozri časť 5.4.
4.8.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok
Pozri časť 5.5.

<b>4.9. Potkany – profesionáli – kanalizácie</b>	
Typ výrobku	Výrobky typu 14 – Rodenticídy
Presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Oblasti použitia	Kanalizácie
Kategória používateľov	Vyškolení profesionáli
Cieľové organizmy (vrátane vývojového štádia)	Potkan hnedý – <i>Rattus norvegicus</i> (dospelé jedince a mláďatá)
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady
Opis spôsobu aplikácie	Návnada na okamžité použitie, ktorá sa má upevniť alebo použiť v deratizačných staničkách, aby sa na zabránilo kontaktu návnady s odpadovou vodou. Návnada na okamžité použitie, ktorá sa má upevniť alebo použiť v zakrytých a chránených miestach s návnadou, aby sa na zabránilo kontaktu návnady s odpadovou vodou.
Dávkovanie	Pri zamorení potkanmi v kanalizácii použiť 10 - 200g návnady na šachtu. Pri vysokom zamorení použiť 200g na šachtu.
Riedenie	-
Časový rozvrh	Pri zamorení potkanmi v kanalizácii použiť 10 - 200g návnady na šachtu. Pri vysokom zamorení použiť 200g na šachtu.
Veľkosti balenia a obalový materiál	Mínimálna veľkosť balenia 3 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné bloky (10g - 200g): - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - (s hákom/drôtom alebo bez nich) bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 10g až do 200g (až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana).



	<p>Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</p> <p>- balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 10g až do 200g (až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</p>
<p><i>4.9.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Návnady sa musia umiestňovať tak, aby neprišli do kontaktu s vodou a neboli odplavené. Dodržujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.</p>	
<p><i>4.9.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie</i></p>	
<p>Umiestnite návnady len do stokových systémov, ktoré sú pripojené na čistiareň odpadových vôd. Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad. Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.</p>	
<p><i>4.9.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia</i></p>	
<p>Pozri časť 5.3.</p>	
<p><i>4.9.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu</i></p>	
<p>Pozri časť 5.4.</p>	
<p><i>4.9.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok</i></p>	
<p>Pozri časť 5.5.</p>	

## **5. Všeobecné pokyny na používanie**

### **5.1. Pokyny na používanie**

#### Široká verejnosť:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zväziť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď je to možné, deratizačné staničky musia byť pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných ne cieľových zvierat.

Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu a deratizačné staničky a zabráňte ich kontaktu s pokožkou.

Zabráňte kontaktu s pokožkou pri odstraňovaní zvyškov návnady.

### Profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad).

Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozri oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etike).

[Ak to vyžadujú národné pravidlá alebo legislatíva] Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (EN 374).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu a deratizačné staničky.

### Trénovaní profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad).

Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa

otvoriť (pozri oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

[Ak to vyžadujú národné pravidlá alebo legislatíva] Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (EN 374).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Frekvencia kontroly deratizovanej oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uváženie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie. Táto frekvencia by mala byť v súlade s odporúčaniami príslušného kódexu osvedčených postupov.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, ak je dostupný, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu.

Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

## **5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika**

### Široká verejnosť:

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov).

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“)
- používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“)

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. Odstráňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázdne obaly zlikvidovať podľa miestnych predpisov.

### Profesionáli:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov [v súlade s uplatniteľným kódexom osvedčených postupov, ak existuje].

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát týždenne). [Ak je to náležité, uveďte ak sa vyžaduje častejšia alebo každodenná kontrola].

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

- Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulantných účinných látok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“)
- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“)
- používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“)

Používaním tohto výrobku by sa hľadavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. Odstráňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázdne obaly zlikvidovať podľa miestnych predpisov.

#### Trénovanie profesionálov:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadne nezúčastnené osoby o deratizácii hlodavcov [v súlade s uplatniteľným kódexom osvedčených postupov, ak existuje].

V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie.

Na striedavé použitie zvážte použitie neantikoagulantného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi aplikáciami neumývajte vodou stanice na návnadu ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrýtych a chránených miestach s návnadou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. Odstráňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázdne obaly zlikvidovať podľa miestnych predpisov.

### **5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce d'asna. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom
- zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút
- orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí

Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnie domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody zavolajte do toxikologického centra [telefón: 00421 2 54 77 41 66]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

### **5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Tento materiál a jeho obal sa musí zlikvidovať bezpečne. Balenie, zvyšky nepoužitej návnady a mŕtve hlodavce zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Ak je potrebné, poraďte sa s profesionálnym odpadovým operátorom alebo

miestnym úradom. Odporúča sa používanie rukavíc.

#### **5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajúte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajúte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat. Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu.

Doba použiteľnosti: 2 roky.

#### **6. Ďalšie informácie**

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady. Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo. Farbivo môže byť buď Durazol red 2BN 110 liquid alebo Ecozol blue N liquid v koncentrácii 0,08% w/w.

V prípade kombinovaného balenia pre myši a potkany pre neprofesionálnych užívateľov je maximálne množstvo návnad na jedno balenie 300 g.

*- koniec dokumentu -*

