

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

DESANT parafinski bloki

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi

Številka dovoljenja: SI-0007995-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0007995-0000

Poglavlje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	DESANT parafinski bloki
--------------	-------------------------

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	BIOTEH d.o.o.
	Naslov	Preserska cesta 9 1235 Radomlje Slovenija
Številka dovoljenja		SI-0007995-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0007995-0000
Datum dovoljenja		05/02/2014
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		31/12/2026

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Babolna Bio Ltd,
Naslov proizvajalca	Szállás utca 6, 1107 Budapest, Madžarska
Kraj proizvodnih obratov	Köves J út 1-3, 2943 Bábolna, Madžarska

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Brodifakum
Ime proizvajalca	Activa Srl,
Naslov proizvajalca	Via Feltre 32, 20132 Milan, Italija
Kraj proizvodnih obratov	Tezza S.r.l , via Tre Ponti 22, 37050 S.Maria di Zevio, Italija

Poglavlje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	aktivna snov	56073-10-0	259-980-5	0,005

2.2. Vrsta(-e) formulacije

RB Gotova vaba

Poglavlje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H360D: Lahko škoduje nerojenemu otroku. H373: Lahko škoduje organom (srčno-žilni sistem) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti {1:navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti:}.
Previdnostni stavki	P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P280: Nositi zaščitne rokavice. P308 + P313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poglavlje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Hišne miši – poklicna uporaba – v stavbah

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V stavbah.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podrobni opis: Gotova vaba, pripravljena za uporabo v zaščitnih postajah oziroma škatlicah.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 40 g vabe na postajo. Če je potrebna več kot ena postaja, naj bo razdalja med postajami 5 metrov. Število in časovni razpored uporabe: Če je potrebna več kot ena postaja, naj bo razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba ; strokovnjak
Velikosti in material embalaže	- 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnem vedru. Skupna neto masa vabe do 20 kg. - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnih vrečkah, pakiranih v zunanjem kartonsko embalažo. Skupna neto masa vabe do 25 kg. - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnih vrečkah, pakiranih v kartonski sod. Skupna neto masa vabe do 25 kg.

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Postaje je potrebno pregledovati na 2-3 dni od začetka tretiranja, kasneje najmanj enkrat tedensko. Umazane, poškodovane ali zaužite vabe je potrebno zamenjati s svežimi. Postopek se ponavlja, dokler vabe ne ostanejo nedotaknjene in v bližini vab ni opaziti več sledi dejavnosti miši. Sproti je treba na varen način odstranjevati trupla glodavcev (lokálni odstranjevalec odpadkov).
- Sledite morebitnim dodatnim navodilom dobre prakse.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Da bi preprečili sekundarno zastrupljanje živali, med tretiranjem redno iščite in odstranjujte pогинule glodavce.

Z uporabo tega proizvoda naj bi glodavce odstranili v 35 dneh. Iz informacij o proizvodu (etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno priporočilo, da mora uporabnik v primeru suma na zmanjšano učinkovitost do konca obdobja tretiranja (aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) povprašati za nasvet dobavitelja proizvoda ali poklicati usposobljeni servis za deratizacijo.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj v bližini kanalizacije poskrbite, da vabe ne bodo prišle v stik z vodo.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.1.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

- Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Podgane – poklicna uporaba – v stavbah

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: juveniles to adults Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: roof rat Razvojna faza: drugo: other juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V stavbah.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podrobni opis: Gotova vaba, pripravljena za uporabo v zaščitnih postajah oziroma škatlicah.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 60-100 g vabe na postajo. Če je potrebna več kot ena postaja, naj bo razdalja med postajami vsaj 5 metrov.

	<p>Število in časovni razpored uporabe: Če je potrebna več kot ena postaja, naj bo razdalja med postajami vsaj 5 metrov.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba ; strokovnjak
Velikosti in material embalaže	<ul style="list-style-type: none"> - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnem vedru. Skupna neto masa vabe do 20 kg. - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnih vrečkah, pakiranih v zunanjem kartonsko embalažo. Skupna neto masa vabe do 25 kg. - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnih vrečkah, pakiranih v kartonski sod. Skupna neto masa vabe do 25 kg.

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Postaje je potrebno pregledovati na 5-7 dni od začetka tretiranja, kasneje najmanj enkrat tedensko. Umazane, poškodovane ali zaužite vabe je potrebno zamenjati s svežimi. Postopek se ponavlja, dokler vabe ne ostanejo nedotaknjene in v bližini vab ni opaziti več sledi dejavnosti miši. Sproti je treba na varen način odstranjevati trupla glodavcev (lokalni odstranjevalec odpadkov).
- Sledite morebitnim dodatnim navodilom dobre prakse.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.2.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Da bi preprečili sekundarno zastrupljanje živali, med tretiranjem redno iščite in odstranjujte poginule glodavce. Z uporabo tega proizvoda naj bi glodavce odstranili v 35 dneh. Iz informacij o proizvodu (etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno priporočilo, da mora uporabnik v primeru suma na zmanjšano učinkovitost do konca obdobja tretiranja (aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) povprašati za nasvet dobavitelja proizvoda ali poklicati usposobljeni servis za deratizacijo.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj v bližini kanalizacije poskrbite, da vabe ne bodo prišle v stik z vodo.

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.2.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

- Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

4.3. Opis uporabe

Tabela 3. Hišne miši in podgane – poklicna uporaba – okrog stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: juveniles to adults Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: roof rat Razvojna faza: drugo: other juveniles to adults Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Zunaj, okrog stavb.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podrobni opis: Gotova vaba, pripravljena za uporabo v zaščitnih postajah oziroma škatlicah.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Miši: 40 g vabe na postajo. Podgane: 60-100 g vabe na postajo. Če je potrebna več kot ena postaja, naj bo razdalja med postajami 5 metrov. Število in časovni razpored uporabe: Če je potrebna več kot ena postaja, naj bo razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba ; strokovnjak
Velikosti in material embalaže	- 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnem vedru. Skupna neto masa vabe do 20 kg. - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnih vrečkah, pakiranih v zunanjko kartonsko embalažo. Skupna neto masa vabe do 25 kg. - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnih vrečkah, pakiranih v kartonski sod. Skupna neto masa vabe do 25 kg.

4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Vabe zaščitite pred vplivi okolja (dež, sneg ipd.). Postaje z vabami postavite na mesta, ki niso izpostavljena poplavam.
- Postaje je potrebno pregledovati na 2-3 dni od začetka tretiranja miši in na 5-7 dni od začetka tretiranja podgan, kasneje najmanj enkrat tedensko. Umazane, poškodovane ali zaužite vabe je potrebno zamenjati

s svežimi. Postopek se ponavlja, dokler vabe ne ostanejo nedotaknjene in v bližini vab ni opaziti več sledi dejavnosti miši in podgan. Sproti je treba na varen način odstranjevati trupla glodavcev (lokalni odstranjevalec odpadkov).

- Sledite morebitnim dodatnim navodilom dobre prakse.

Da bi preprečili sekundarno zastrupljanje živali, med tretiranjem redno iščite in odstranjujte poginule glodavce. Z uporabo tega proizvoda naj bi glodavce odstranili v 35 dneh. Iz informacij o proizvodu (etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno priporočilo, da mora uporabnik v primeru suma na zmanjšano učinkovitost do konca obdobja tretiranja (aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) povprašati za nasvet dobavitelja proizvoda ali poklicati usposobljeni servis za deratizacijo.

4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.3.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Na nastavljeni vab neposredno v gnezdo.

4.3.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preprečite stik z vodo pri postavljanju postaj v bližini rek, ribnikov, jezov, vodnih kanalov, namakalnih jarkov ali izsuševalnih sistemov.

4.3.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.3.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladniščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladniščenja

- Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

4.4. Opis uporabe

Tabela 4. Hišne miši in podgane - usposobljeni strokovnjki - v stavbah

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: roof rat Razvojna faza: drugo: other juveniles to adults Znanstveno ime: Rattus norvegicus

	<p>Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: juveniles to adults</p> <p>Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: juveniles to adults</p>
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V stavbah.
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Uporaba vabe</p> <p>Podrobni opis: Gotova vaba, pripravljena za uporabo v zaščitnih postajah ozziroma škatlicah, ali nameščena na posebnih mestih, kjer je zaščitena pred neciljnimi organizmi in ljudmi.</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Podgane: visoka infestacija - 100 g vabe na postajo, nizka infestacija - 60 g vabe na postajo. Miši: 40 g vabe na postajo.</p> <p>Število in časovni razpored uporabe:</p> <p><i>Podgane</i> - Visoka infestacija: 100 g vabe na postajo. - Nizka infestacija: 60 g vabe na postajo.</p> <p><i>Miši</i> - 40 g vabe na postajo</p>
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	<ul style="list-style-type: none"> - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnem vedru. Skupna neto masa vabe do 20 kg. - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnih vrečkah, pakiranih v zunanjo kartonsko embalažo. Skupna neto masa vabe do 25 kg. - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnih vrečkah, pakiranih v kartonski sod. Skupna neto masa vabe do 25 kg.

4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Po končanem tretiranju odstranite preostalo vabo.
- Pri trajno nastavljeni vabi:
 - Kjer je možno, je priporočljiv pregled tretiranega območja vsake 4 tedne, da bi se izognili pojavu morebitne rezistence.
 - Sledite morebitnim dodatnim navodilom dobre prakse.

4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.4.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred tretiranjem obvestite morebitne navzoče osebe (npr. uporabnike tretiranih površin in okolice) o kampanji za nadzor glodavcev.
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (npr. zamašite luknje, odstranite hrano in pijačo), s čimer omogočite boljše delovanje rodenticida in zmanjšate verjetnost ponovne invazije glodavcev.
- Da bi zmanjšali tveganje za sekundarno zastrupitev, v času tretiranja odstranjujte mrtve glodavce v skladu s priporočili in navodili dobre prakse.

-
- Ne uporabljajte izdelka za impulzno tretiranje.
 - Ne uporabljajte izdelka za trajno deratizacijo ali monitoring.

4.4.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preprečite stik z vodo pri postavljanju postaj v bližini rek, ribnikov, jezov, vodnih kanalov, namakalnih jarkov ali izsuševalnih sistemov.

4.4.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.4.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

- Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

4.5. Opis uporabe

Tabela 5. Hišne miši in podgane - usposobljeni strokovnjaki – okrog stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: roof rat Razvojna faza: drugo: other juveniles to adults Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: juveniles to adults Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Zunaj, okrog stavb.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podrobni opis: Gotova vaba, pripravljena za uporabo v zaščitnih postajah oziroma škatlicah, ali nameščena na posebnih mestih, kjer je zaščitena pred neciljnimi organizmi in ljudmi.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Podgane: visoka infestacija - 100 g vabe na postajo, nizka infestacija - 60 g vabe na postajo. Miši: 40 g vabe na postajo. Število in časovni razpored uporabe: <i>Podgane</i> - Visoka infestacija: 100 g vabe na postajo. - Nizka infestacija: 60 g vabe na postajo. <i>Miši</i> - 40 g vabe na postajo
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	- 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnem vedru. Skupna neto masa vabe do 20 kg. - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnih vrečkah, pakiranih v zunanjо kartonsko embalažo. Skupna neto masa vabe do 25 kg. - 20 g ali 25 g parafinski bloki v plastičnih vrečkah, pakiranih v kartonski sod. Skupna neto masa vabe do 25 kg.

4.5.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Po končanem tretiranju odstranite preostalo vabo.

- Za tretiranje odprtih površin morajo biti mesta z vabo ustrezno zakrita in strateško izbrana, da zmanjšamo izpostavljenost necilnim organizmom.
- Sledite morebitnim dodatnim navodilom dobre prakse.

4.5.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.5.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred tretiranjem obvestite morebitne navzoče osebe (npr. uporabnike tretiranih površin in okolice) o kampanji za nadzor glodavcev.
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (npr. zamašite luknje, odstranite hrano in pijačo), s čimer omogočite boljše delovanje rodenticida in zmanjšate verjetnost ponovne invazije glodavcev.
- Da bi zmanjšali tveganje za sekundarno zastrupitev, v času tretiranja odstranjujte mrtve glodavce v skladu s priporočili in navodili dobre prakse.
- Ne uporabljamte izdelka za impulzno tretiranje.
- Ne vnašajte izdelka v gnezda.
- Na uporabljamte izdelka za trajno deratizacijo ali monitoring.

4.5.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preprečite stik z vodo pri postavljanju postaj v bližini rek, ribnikov, jezov, vodnih kanalov, namakalnih jarkov ali izsuševalnih sistemov.

4.5.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.5.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

- Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

Poglavlje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

- Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Pred nastavljanjem vab opravite pregled prizadetega območja. Opredelite vrsto glodavcev, mesta aktivnosti in določite verjeten razlog ter obseg napada škodljivcev.
- Odstranite hrano, ki je glodavcem na voljo (npr. razsuto zrnje, odpadki hrane). Pred nastavljanjem vab napadenega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev, zaradi česar vabo težje sprejmejo.
- Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienске ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje vab in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- Postaje z vabami postavite v neposredno bližino območij, kjer je ste opazili aktivnost glodavcev, npr. na poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rove itd.
- Kjer je mogoče, pritrdirite postaje na tla ali stene.
- Postaje morajo biti jasno označene, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (glede označevanja postaj glejte točko 5.3).
- Kadar uporabljate proizvod na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena. V bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo ukrepov v primeru zastrupitve.
- Vaba mora biti v postajah pritrjena tako, da je ni mogoče odvleči iz postaje.
- Postaje namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
- Postaje namestite izven dosega hrane, pijače in krme za živali, in tudi izven dosega pripomočkov ali površin, s katerimi so sicer v stiku.
- Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije.
- Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Po uporabi si umijte roke in druge izpostavljene dele telesa.
- Pogostost obiskov tretiranega območja mora biti usklajena z upravljavcem poslopja glede na raziskavo, izvedeno pred začetkom tretiranja. Ta pogostost mora biti skladna z veljavnim kodeksom dobre prakse.
- Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi proizvoda.
- Če se uživanje vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je potrebno ugotoviti verjeten razlog. Če obstaja verjetnost, da so glodavci na vabo odporni, uporabite močnejši antikoagulacijski rodenticid ali rodenticid, ki ni antikoagulacijski. Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativnem ukrepu nadzora.
- Ob koncu obdobja učinkovanja odstranite preostalo vabo in postaje za nastavljanje vab.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev, v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse.
- Z informacij o proizvodu (etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno, da je proizvod na voljo samo za poklicne uporabnike.
- Izdelka ne smete uporabljati na področju, kjer je bila zaznana rezistenca na aktivno snov.
- Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda, razen če imate dovoljenje za stalno tretiranje področja z določeno vabo.
- Ne uporabljajte drugih antikoagulantov s primerljivo ali šibkejšo učinkovitostjo. Za kolobarjenje razmislite o uporabi rodenticida, ki ne temelji na antikoagulantu, v kolikor je na voljo, ali o uporabi močnejšega antikoagulanta.
- V času tretiranja ne umivajte postaj za nastavljanje vab z vodo.
- Za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve odstranjujte poginule glodavce najmanj dvakrat tedensko v obdobju tretiranja.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Ta proizvod vsebuje antikoagulant. V primeru zaužitja se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni. V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.
- Antidot je vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.
- Pri stiku s kožo: kožo temeljito umijte najprej z vodo in nato še z milom in vodo.
- Pri stiku z očmi: odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni veki ter oko temeljito izperite s tekočino za izpiranje oči ali s čisto vodo. Oči imejte odprte vsaj 10 minut.
- Pri stiku z ustimi: usta previdno izperite z vodo. Nezavestni osebi nikoli ne dajajte ničesar skozi usta. Ne izzivajte bruhanja. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo izdelka. V kolikor je vabo zaužila domača žival, se posvetujte z veterinarjem.
- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: "Ne premikajte in ne odpirajte."; "Vsebuje rodenticid."; "ime proizvoda in številka dovoljenja"; "naziv in vsebnost aktivne snovi" in "V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112."
- Nevarno za divje živali.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po končanem obdobju tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z lokalno zakonodajo s področja ravnjanja z odpadki.

Priporočljiva je uporaba rokavic.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Hraniti v suhem, hladnem in dobro zračenem prostoru, v originalni zaprti embalaži, stran od direktne sončne svetlobe.
- Hraniti zunaj dosega otrok, ptic, domačih in hlevskih živali.
- Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

Poglavlje 6. DRUGE INFORMACIJE

Rodenticid učinkuje z zamikom od 4 do 10 dni po zaužitju.

Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se piginulih glodavcev z golimi rokami. Zaščitite se z rokavicami ali uporabite posebne prijemalne klešče in piginule glodavce zavrzite med komunalne odpadke v dvojni plastični vrečki, da preprečite sekundarno zastrupljanje živali.

Po končanem tretiranju je potrebno preostalo nastavljen vabo varno odstraniti.

Vabi je dodano grenčilo (denatonijev benzoat), ki odvrača domače živali in otroke od morebitnega zaužitja.