



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/19-12/30
URBROJ: 543-07-1-1-4/1-19-2
Zagreb, 14. listopada 2019.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija**, u predmetu međusobnog priznavanja odobrenja za biocidne proizvode, donosi

RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu V Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **Ratimor Plus žitni mamac**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Biocidni proizvod može se prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenih proizvoda uz osiguranu odgovarajuću stručnu pomoć.

V. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

VI. Ovo rješenje važi do **31/08/2020**.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za sekvencijalnim međusobnim priznavanjem odobrenja izdanog od strane referentne države članice Slovenije.

Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Biocidni proizvod može se za opću uporabu prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenih proizvoda uz osiguranu odgovarajuću stručnu pomoć. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 31. kolovoza 2020., a u skladu s sukladno datumu važenja odobrenja referentne države.

Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Dostaviti:

1. Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija
2. Arhiva



MINISTAR

prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med.



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Ratimor Plus žitni mamac

Vrsta proizvoda 14 – Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/19-12/30

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0021617-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Trgovački naziv | Ratimor Plus žitni mamac |
|-----------------|--------------------------|

1.2. Nositelj odobrenja

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| Naziv i adresa nositelja odobrenja | Naziv | Unichem d.o.o. |
| | Adresa | Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija |
| Broj odobrenja | KLASA: UP/I-543-04/19-12/30 | |
| Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP) | HR-0021617-0000 | |
| Datum odobrenja | 14/10/2019 | |
| Datum isteka odobrenja | 31/08/2020 | |

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

| | |
|-----------------------------|--|
| Naziv proizvođača | Unichem d.o.o |
| Adresa proizvođača | Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Slovenija |
| Lokacija proizvodnih pogona | Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Slovenija |

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

| | |
|-----------------------------|--|
| Aktivna tvar | Bromadiolon |
| Naziv proizvođača | PelGar International Limited |
| Adresa proizvođača | Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, GU34 2QR Alton, Hampshire Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Lokacija proizvodnih pogona | Prazska 54, 28 002 Kolin Češka |

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EC broj | Sadržaj (%) |
|------------------|---|--------------|------------|-----------|-------------|
| Bromadiolon | 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one | Aktivna tvar | 28772-56-7 | 249-205-9 | 0.0029 |

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu) – žitni mamac

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

| | |
|-------------------|---|
| Oznaka upozorenja | H373 Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti . EUH208 Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju. |
| Oznake obavijesti | P102 Čuvati izvan dohvata djece. P260 Ne udisati prašinu. P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtki ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada. |

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Opća javnost - suzbijanje kućnih miševa u zatvorenom

| | |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika) |
| Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe | Nije mjerodavno za rodenticide. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | <i>Mus musculus</i> Kućni miš odrasle i mlade jedinke |
| Područje primjene | u zatvorenom prostoru |
| Načini primjene | primjena mamaca Mamac spreman za uporabu [u vrećicama za rasuti mamac] koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na neovlašteno otvaranje. |
| Količine kod primjene i učestalost | Kod infestacije miševima treba upotrijebiti 10 g do 40 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra. Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku svaka 2-3 dana, kasnije jednom tjednom |
| Kategorije korisnika | široka javnost (amaterska uporaba) |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | 1. Mamci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g): - pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 50 g; - pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 50 g; - pakirano u vreće od natron papira u količini do 50 g; - pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili vanjskoj vreći od natron papira |

ili kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 50 g;

- pakirano u PP ili PE kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 50 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 50 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 50 g;
- jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševе i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 50 g;

2. Mamac u vrećicama od PP/papira, PET/PE, PE/papir ili PE/aluminija (10 g - 50 g):

- pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 50 g;
- pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 50 g;
- pakirano u HDPE kutije, u količini do 50 g;
- pakirano u vreće od natron papira, u količini do 50 g;
- pakirano u omot, u količini do 50 g;
- pakirano u pleteni omot od PP ili višeslojni omot od papira, u količini do 50 g;
- pakirano u PP ili PE cijevi do 50 g;
- jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševе i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 50 g;
- pakirano u vrećice od PET/PE, PP/PE ili papir/PE, u količini do 50 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 50 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 50 g;
- vrećice (od PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirane u vanjskom kartonskom omotu ili kartonskoj kutiji ili u vanjskoj vreći od natron papira ili (HDPE/PP) kante s poklopcem u količini do 50 g;

3. Ostalo pakiranje:

- rasuti mamac u prethodno napunjene ili punive zaštitne kutije za mamce za miševе i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili toplinom zapečaćenoj plastičnoj posudi ili toplinom zapečaćenoj foliji, u količini do 50 g;
- rasuti mamac na poslužavniku (od PVC ili polistirena ili polipropilena ili PET) sa toplinom zapečaćenom poklopcem (od PET/polipropilena ili polipropilena), koji se koristi za zaštitne kutije za mamce za miševе i štakore, u količini do 50 g.

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku svaka 2-3 dana, kasnije jednom tjednom, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamicima.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidi 5.2

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidi 5.3

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidi 5.4

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidi 5.5

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Opća javnost - suzbijanje štakora u zatvorenom

| | |
|---|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika) |
| Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe | Nije mjerodavno za rodenticide |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | <i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor odrasle i mlade jedinke <i>Rattus rattus</i> Crni štakor odrasle i mlade jedinke |
| Područje primjene | u zatvorenom prostoru |
| Načini primjene | primjena mamaca Mamac spreman za uporabu [u vrećicama za rasuti mamac] koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na neovlašteno otvaranje. |
| Količine kod primjene i učestalost | Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti 10g do 200 g mamca po mjestu postavljanja. - 0 Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara. Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku 5-7 dana, kasnije jednom tjednom. |
| Kategorije korisnika | široka javnost (amaterska uporaba) |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | 1. Mamci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g): - pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 150 g; - pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 150 g; - pakirano u vreće od natron papira u količini do 150 g; - pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili |

papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili vanjskoj vreći od natron papira ili kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 150 g;

- pakirano u PP ili PE kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 150 g;
- jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;

2. Mamac u vrećicama od PP/papira, PET/PE, PE/papira ili PE/aluminija (10 g - 150 g):

- pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u HDPE kutije, u količini do 150 g;
- pakirano u vreće od natron papira, u količini do 150 g;
- pakirano u omot, u količini do 150 g;
- pakirano u pleteni omot od PP ili višeslojni omot od papira, u količini do 150 g;
- pakirano u PP ili PE cijevi do 150 g;
- jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;
- pakirano u vrećice od PET/PE, PP/PE ili papir/PE, u količini do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 150 g;
- vrećice (od PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirane u vanjskom kartonskom omotu ili kartonskoj kutiji ili u vanjskoj vreći od natron papira ili (HDPE/PP) kante s poklopcem u količini do 150 g;

3. Ostalo pakiranje:

- rasuti mamac u prethodno napunjene ili punive zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili toplinom zapečaćenoj plastičnoj posudi ili toplinom zapečaćenoj foliji, u količini do 150 g;
- rasuti mamac na poslužavniku (od PVC ili polistirena ili polipropilena ili PET) sa toplinom zapečaćenom poklopcem (od PET/polipropilena ili polipropilena), koji se koristi za zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, u količini do 150 g.

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku 5-7 dana, kasnije jednom tjednom, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Uporaba br. 3 – Opća javnost - suzbijanje štakora na otvorenom, oko zgrada

| | |
|---|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika) |
| Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe | Nije mjerodavno za rodenticide |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | <i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor odrasle i mlade jedinke <i>Rattus rattus</i> Crni štakor odrasle i mlade jedinke |
| Područje primjene | na otvorenom Na otvorenom, oko zgrada |
| Načini primjene | primjena mamaca Mamac spreman za uporabu [u vrećicama za rasuti mamac] koji se koristi u kutijama s mamcem koje su otporne na neovlašteno otvaranje. |
| Količine kod primjene i učestalost | Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti 10g do 200 g mamca po mjestu postavljanja. - 0 Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara. Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku 5-7 dana, kasnije jednom tjednom. |
| Kategorije korisnika | široka javnost (amaterska uporaba) |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | I. Mameci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g): - pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 150 g; - pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 150 g; - pakirano u vreće od natron papira u količini do 150 g; - pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili vanjskoj vreći od natron papira ili kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 150 g; - pakirano u PP ili PE kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 150 g; - pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 150 g; - pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 150 g; - jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punjive plastične |

(HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševе i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;

2. Mamac u vrećicama od PP/papira, PET/PE, PE/papir ili PE/aluminija (10 g - 150 g):

- pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u HDPE kutije, u količini do 150 g;
- pakirano u vreće od natron papira, u količini do 150 g;
- pakirano u omot, u količini do 150 g;
- pakirano u pleteni omot od PP ili višeslojni omot od papira, u količini do 150 g;
- pakirano u PP ili PE cijevi do 150 g;
- jedna ili više vrećica pakirana u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševе i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;

- pakirano u vrećice od PET/PE, PP/PE ili papir/PE, u količini do 150 g;

- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 150 g;

- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 150 g;

- vrećice (od PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirane u vanjskom kartonskom omotu ili kartonskoj kutiji ili u vanjskoj vreći od natron papira ili (HDPE/PP) kante s poklopcem u količini do 150 g;

3. Ostalo pakiranje:

- rasuti mamac u prethodno napunjene ili punive zaštitne kutije za mamce za miševе i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili toplinom zapečaćenoj plastičnoj posudi ili toplinom zapečaćenoj foliji, u količini do 150 g;
- rasuti mamac na poslužavniku (od PVC ili polistirena ili polipropilena ili PET) sa toplinom zapečaćenom poklopcem (od PET/polipropilena ili polipropilena), koji se koristi za zaštitne kutije za mamce za miševе i štakore, u količini do 150 g.

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Kada se mamci postavljaju na otvorenom kutije za mamce treba staviti na područja koja ne mogu biti poplavljena.

Svaki mamac koji je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom u zaštitnoj kutiji za mamce treba zamijeniti.

Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku 5-7 dana, kasnije jednom tjednom, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzamacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidi 5.2

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidi 5.3

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidi 5.4

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidi 5.5

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Prije uporabe treba pročitati Upute za uporabu pripravka, pridržavati ih se, kao i sve informacije koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje.

Prije uporabe rodenticida treba uzeti u obzir mogućnost suzbijanja glodavaca ne-kemijskim metodama (na primjer zamke).

Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi).

Nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to uznemiruje populaciju glodavaca i otežava prihvaćanje mamaca.

Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta primijećene aktivnosti glodavaca (na primjer: putovi kretanja, jazbine, mjesta hranjenja, rupe itd).

Gdje je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti za tlo ili drugu površinu.

Ne otvarati vrećice koje sadrže mamce.

Kutije s mamcem treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljanih životinja.

Kutije s mamcem treba postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim.

Kutije s mamcem ne smije se stavljati blizu sustava za odvod vode, jer mogu doći u dodir s vodom.

Tijekom uporabe proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.

Nakon provedenog tretmana treba ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcima.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.

Ne koristiti proizvod kao trajne mamce za sprečavanje infestacije glodavcima ili praćenje aktivnosti glodavaca.

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja (pr. „koristiti samo u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja”),

- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (pr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama za proizvod”).

Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. Informacije o proizvodu (tj.

Uputa i/ili deklaracija) jasno preporučuju da u slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina (DDD).

Uginule glodavce treba potražiti i ukloniti barem onoliko često koliko se provjeravaju zaštitne kutije s mamcima. Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadrži antikoagulans. Ako se proguta, simptomi, koji mogu biti odgođeni, mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima može doći do pojave modrica i prisutnosti krvi u izmetu ili urinu.

Antidot: Vitamin K1, koji smiju primijeniti samo medicinski/veterinarski stručnjaci.

U slučaju dermalne izloženosti: isprati kožu vodom, a zatim oprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta pripravka s očima treba isprati oči tekućinom ili vodom za ispiranje očiju, držati očne kapke otvorene bar 10 minuta.

U slučaju gutanja mamca: pažljivo isprati usta vodom. Nikada ne davati ništa na usta osobi bez svijesti. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati spremnik ili deklaraciju proizvoda.

Ako je pripravak progutao kućni ljubimac treba se obratiti veterinarskom kirurgu.

Kutije s mamcima moraju biti označeni sljedećim informacijama: "ne micati ili otvarati"; "sadrži rodenticid"; "naziv proizvoda ili broj ovlaštenja"; "aktivne tvari" i "u slučaju nesreće nazovite broj 112 ili Centar za kontrolu otrovanja 01-23-48-342".

Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju tretmana treba odložiti zbrinuti neiskorištene mamce i ambalažu u skladu s lokalnim zahtjevima.

Preporuča se uporaba rukavica.

Ne dodirivati mrtve glodavce golim rukama, koristiti rukavice ili alate, kao što su kliješta.

Otrovane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla.

Čuvajte zaključano.

Pohraniti na mjestu koje je nepristupačno djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

Rok uporabe: 24 mjeseca.

6. OSTALE INFORMACIJE

- Zbog odgođenog djelovanja antikoagulantnih rodenticida, nakon njihova uzimanja, potrebno je od 4 do 10 dana do pojave vidljivih simptoma otrovanja.

- Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, prilikom njihova odlaganja koristiti rukavice ili alate kao što su kliješta.

- Ovaj proizvod sadrži gorku tvar i boju.

- Najveća dopuštena količina za neprofesionalne korisnike u slučaju kombiniranih pakiranja za miševe i štakore je do 150 g mamaca po pakiranju za žitni mamac.

Za miševe i štakore: Često provjeravajte mjesta postavljanja mamaca tijekom prvih 10-14 dana i zamijenite svaki mamac koji su grizli glodavci ili koji je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom.

- H i P oznake u skladu s Uredbom CLP (EU) 1272/2008:

P314: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P501: Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.