

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Contec Sterile 70% IPA SBC570I

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020460-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0020460-0001

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	6
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	6
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	7
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	9
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	9
6. Informazzjoni oħra	10

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Contec 70% IPA FBC570I
Contec Sterile 70% IPA SBT170IW
Contec Sterile 70% IPA SBT0570IW
Contec 70% IPA FBT170I

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Contec Europe
	Indirizz	ZI Du Prat Avenue Paul Duplaix 56000 Vannes Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020460-0000 1-1	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0020460-0001	
Data tal-awtorizzazzjoni	26/12/2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/11/2029	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Contec Cleanroom (UK) Ltd
Indirizz tal-manifattur	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway NE63 8QW Ashington, Northumberland Ir-Renju Unit
Post ta' 'siti ta' manifattura	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway NE63 8QW Ashington, Northumberland Ir-Renju Unit

Isem tal-manifattur	Contec Inc.
Indirizz tal-manifattur	525 Locust Grove SC 29303 Spartanburg Istat Uniti
Post ta' 'siti ta' manifattura	525 Locust Grove SC 29303 Spartanburg Istat Uniti

Isem tal-manifattur	Contec Cleanroom Technology (Suzhou) Co., Ltd. China
Indirizz tal-manifattur	17 Longyun Road, Suzhou Industrial Park 215024 Suzhou Ċina
Post ta' 'siti ta' manifattura	17 Longyun Road, Suzhou Industrial Park 215024 Suzhou Ċina

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Brenntag GmbH
Indirizz tal-manifattur	Stinnes Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Germanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Haven 3222, Vondelingenweg 601 3196 KK Vondelingenplaat Olanda

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	62,9

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL (kwalunkwe likwidu ieħor) – soluzzjoni/sprej bil-grillu tal-RTU

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.
Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjipx.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Evita li tibra' bin-nifs fwar.
Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.
Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xaġħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehħihom. Kompli laħlaħ.
Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma tħossokx f'sikktek..
Jekk l-irritazzjoni ta' l-ġhajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib.
F'każ ta' nar:Uża foam rezistenti għall-alkoħol biex titfi.
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk.
Aħžen f'post imsakkar.
Armi l-kontenut fi l-kontenitur skont ma jitolbu r-regolamenti lokali..

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu professjonali

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Dizinfettant għall-użu kontra l-batterji, il-mycobacteria u l-ħmira fuq uċuħ ibsin u mhux porużi fi kmamar iġġenji għall-bijoteknoloġija, il-farmaċewtiċi, il-manifattura ta' strumenti mediċi, l-industriji tal-kura tas-saħħa u applikazzjonijiet kritiċi oħra tax-xjenzi tal-ħajja; żoni tal-preparazzjoni tal-ikel u tat-tmiġ industrijali." Temperatura ta' użu aċċettabbli: temperatura tal-kamra (20±2°C)
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterju isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Mycobacteriaceae isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar u msiħ Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: 50 ml tal-prodott għal kull m2 tal-wiċċ. Dilwizzjoni (%): Numru u ħin tal-applikazzjoni: Sprejjar: Ħin tal-kuntatt ta' minuta waħda għall-batterji, il-mycobacteria u l-ħmira Imsiħ: Ħin tal-kuntatt ta' minuta waħda għall-batterji u l-mycobacteria Ħin tal-kuntatt ta' 3 minuti għall-ħmira

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun tal-isprej bil-grillu tal-HDPE – 0.5 – 1L

Flixxun tal-mili mill-ġdid bit-tapp tal-HDPE - 5L

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara sezzjoni 5.1

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara sezzjoni 5.2

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5.3

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5.4

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5.5

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Uża f'temperatura tal-kamra. Għal uċuħ viżibbilment maħmuġin, huwa meħtieġ tindif qabel id-dizinfazzjoni.

Applika l-prodott fuq biċċa tal-imsiħ iġjenika ta' kwalità xierqa. Aċċerta ruħek li l-biċċa tkun saturata biżżejjed u b'mod uniformi qabel timsaħ il-wiċċ li jrid jtnaddaf.

Aċċerta ruħek li l-wiċċ ikun kopert b'mod uniformi bis-solvent imbagħad timsaħ biex tixxotta b'biċċa tal-imsiħ iġjenika sterili.

Ħinijiet tal-kuntatt: Sprejja għal minuta waħda għall-batterji, il-mycobacteira u l-ħmira

Imsaħ għal minuta waħda għall-batterji u l-mycobacteria 3 minuti għall-ħmira.

Biċċiet tal-imsiħ użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Aħsel idejk u l-ġilda esposta qabel l-ikel u wara l-użu.

Evita l-kuntatt mal-ġhajnejn.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti negattivi diretti jew indiretti possibbli:

Ugigħ ta' ras, mejt, allucinazzjonijiet, dipressjoni respiratorja, depressjoni tas-CNS jew koma.

Irritazzjoni severa tal-għajnejn u/jew ħsara okulari.

Dardir, rimettar, dijarea u gastrite emorraġika.

Periklu ta' aspirazzjoni pulmonari jista' jwassal għal pulmonite, pressjoni baxxa u ipoglicemija.

Mizuri tal-ewwel għajjnuna:

Biegħed l-individwu mis-sors ta' esponiment u neħhi kwalunkwe lbies kontaminat/imcappas.

Kuntatt mal-għajnejn: JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib

Kuntatt mal-ġilda; aħsel il-parti affettwata b'ħafna ilma u sapun. Togħroxx.

Jekk jinbela': TIPPROVOKAX ir-rimettar u qatt tagħti xi haġa fil-ħalq lil individwi debboli jew li jkun intilef minn sensih; jekk l-individwu jkun intilef minn sensih poġġih f'pożizzjoni (ta' rkupru) laġenba fuq ix-xellug bir-ras baxxuta u l-irkopptejn milwija.

Żomm l-individwu kalm u mistrieħ, ikkonserva t-temperatura tal-ġisem u kkontrolla n-nifs. Jekk meħtieġ ara għandux polz u ibda respirazzjoni artifizjali.

Hu l-individwu fi klinika jew sptar u gorr il-pakkett jew it-tikketta meta dan ikun possibbli.

QATT THALLI L-INDIVIDWU WAĦDU!

Rakkomandazzjoni għal personal mediku u tal-kura tas-saħħa:

Immonitorja s-sinjali vitali u pprovidi trattament sintomatiku u ta' appoġġ.

Eżamina bi proċedura endoskopika fil-każ ta' ingestjoni.

Immonitorja għal glicemija u ketoni.

L-użu ta' ipekakwana huwa kontrindikata

JEKK TIKKONSULTA TABIB ŻOMM IL-PAKKETT JEW IT-TIKKETTA DISPONIBBLI U ĊEMPEL IĊ-ĊENTRU TA' KONTROLL TAL-AVVELENAMENT LOKALI fuq 112

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Armi l-kontenut/il-kontenitur skont ir-regolamenti nazzjonali.
Tużax mill-ġdid il-kontenitur vojta għal xi skop ieħor.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zomm f'post frisk, niexef u b'ventilazzjoni tajba fil-kontenitur originali.
Zomm 'il bogħod minn sorsi ta' tqabbid.
Zomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.
Zomm il-kontenitur magħluq sew.
Zmien kemm idum tajjeb: sentejn

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih ġie maqbul il-valur referenzjarju Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utenti professjonali li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott