

Sammendrag av produktegenskaper for en biocid produktfamilie

Familienavn: TEAT DISINFECTANTS BIOCIDAL PRODUCT FAMILY OF CVAS

Produkttype(r): PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Godkjenningsnummer: EU-0018724-0000

**R4BP 3-
asset_referansenummer:** NO-0019970-0000

Innholdsfortegnelse

Del I. - Første informasjonsnivå	1
1. Administrative opplysninger	1
2. Produktfamilie sammensetning og formulering	3
Del II.- Andre informasjonsnivå - meta-SPC	3
1. Meta SPC administrativ informasjon - meta SPC 1	4
2. Meta SPC oppbygging	4
3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC	4
4. Godkjent bruk i meta-SPC	5
5. Generell bruksanvisning for meta SPC	9
6. Annen informasjon	10
7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC	10
1. Meta SPC administrativ informasjon - meta SPC 2	11
2. Meta SPC oppbygging	12
3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC	12
4. Godkjent bruk i meta-SPC	12
5. Generell bruksanvisning for meta SPC	16
6. Annen informasjon	18
7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC	18
1. Meta SPC administrativ informasjon - meta SPC 3	19
2. Meta SPC oppbygging	19
3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC	20
4. Godkjent bruk i meta-SPC	20
5. Generell bruksanvisning for meta SPC	24
6. Annen informasjon	25
7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC	25
1. Meta SPC administrativ informasjon - meta SPC 4	27
2. Meta SPC oppbygging	27
3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC	28

4. Godkjent bruk i meta-SPC	28
5. Generell bruksanvisning for meta SPC	38
6. Annen informasjon	39
7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC	39
1. Meta SPC administrativ informasjon - meta SPC 5	40
2. Meta SPC oppbygging	40
3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC	41
4. Godkjent bruk i meta-SPC	41
5. Generell bruksanvisning for meta SPC	50
6. Annen informasjon	52
7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC	52
1. Meta SPC administrativ informasjon - meta SPC 6	53
2. Meta SPC oppbygging	53
3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC	54
4. Godkjent bruk i meta-SPC	54
5. Generell bruksanvisning for meta SPC	61
6. Annen informasjon	63
7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC	63
1. Meta SPC administrativ informasjon - meta SPC 7	64
2. Meta SPC oppbygging	64
3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC	65
4. Godkjent bruk i meta-SPC	65
5. Generell bruksanvisning for meta SPC	78
6. Annen informasjon	79
7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC	79
1. Meta SPC administrativ informasjon - meta SPC 8	80
2. Meta SPC oppbygging	81
3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC	81
4. Godkjent bruk i meta-SPC	81
5. Generell bruksanvisning for meta SPC	85

6. Annen informasjon	87
7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC	87
1. Meta SPC administrativ informasjon - meta SPC 9	89
2. Meta SPC oppbygging	89
3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC	90
4. Godkjent bruk i meta-SPC	90
5. Generell bruksanvisning for meta SPC	103
6. Annen informasjon	104
7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC	104

Del I. - Første informasjonsnivå

1. Administrative opplysninger

1.1. Familienavn

TEAT DISINFECTANTS BIOCIDAL PRODUCT FAMILY OF CVAS

1.2. Produkttype(r)

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

1.3. Innehaver av godkjenningen

Navn og adresse til innehaver
av godkjenningen

Navn

CVAS Development GmbH

Adresse

Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Tyskland

Godkjenningsnummer

EU-0018724-0000

R4BP 3-
asset_referansenummer

NO-0019970-0000

Godkjenningsdato

18/12/2018

Godkjenningens
utløpsdato

30/11/2028

1.4. Produsent(er) av biocidprodukt(er)

Navn på produsent

Calvatis GmbH

Adresse til produsent

Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Tyskland

Adresse til produsentsted

Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Tyskland

Navn på produsent

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Adresse til produsent

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubuern Tyskland

Adresse til produsentsted

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubuern Tyskland

1.5. Produsent(er) av aktivt stoff(er)

Aktivt stoff

1319 - Iodine

Navn på produsent

Cosayach Nitratos S.A.

Adresse til produsent

Amunategui 178 not applicable Santiago Chile

Adresse til produsentsted

S.C.M. Cosayach Cala Cala not applicable Pozo Almonte Chile

Aktivt stoff

1319 - Iodine

Navn på produsent

ACF Minera S.A.

Adresse til produsent

San Martin No 499 not applicable Iquique Chile

Adresse til produsentsted

Lagunas mine not applicable Pozo Almonte Chile

Aktivt stoff

1319 - Iodine

Navn på produsent

SQM S.A.

Adresse til produsent

Los Militares 4290, Piso 4 not applicable Las Condes Chile

Adresse til produsentsted

Nueva Victoria plant not applicable Pedro de Valdivia plant Chile

Aktivt stoff

1319 - Iodine

Navn på produsent

Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd

Adresse til produsent

661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japan

Adresse til produsentsted

2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japan

Aktivt stoff

1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine

Navn på produsent

Norkem Limited (manufacturer of PVP-iodine)

Adresse til produsent

Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannia

Adresse til produsentsted

Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannia

2. Produktfamilie sammensetning og formulering

2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av familien

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0 - 0,54
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		0 - 4,16
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0,33

2.2. Formuleringstype(r)

AL - Enhver annen væske

Del II.- Andre informasjonsnivå - meta-SPC

1. Meta SPC administrativ informasjon

1.1. Meta SPC identitet

meta SPC 1

1.2. Suffiks til godkjenningsnummeret

1-1

1.3 Produkttype(r)

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

2. Meta SPC oppbygging

2.1.Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av meta SPC

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0 - 0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		1,16 - 1,5
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Formuleringstype(r) for meta SPC

Formulering(er)

AL - Enhver annen væske

3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

4. Godkjent bruk i meta-SPC

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Bruksnr. # 1.1 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell dypping

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	Ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Manuell dypping med en dyppekopp - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføeringsutstyret anbefales.
Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast dyppekoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
Etter melking, klem beholderen og sett dyppekoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
Fyll koppen på dyppeenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og dyppekoppen ved å skylle med vann.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Bruksnr. # 1.2 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk dypping

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	Ikke relevant.
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Automatisk dypping - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske dyppesystemet. Unngå utslipp av overflødig væske.
Etter melking slås vakumet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml dypp når spenekoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske dyppesystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.
I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkeøkt for buskapen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.
Hele prosessen er automatisert.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

5. Generell bruksanvisning for meta SPC

5.1. Bruksanvisning

Se den bruksspesifikke bruksanvisningen.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Se bruksspesifikke risikoreduseringstiltak.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding: Tilfør frisk luft; rådfør deg med lege dersom symptomer forekommer.

Etter hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe, og skyll grundig.

Etter øyekontakt: Skyll med åpne øyne i flere minutter under rennende vann (minst 15 minutter).

Etter svelging: Skyll munnen, og drikk deretter rikelig med vann. Ring lege umiddelbart.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen kjente farlige reaksjoner.

Kjemisk stabilitet: Produktet er kjemisk stabilt under normale omgivelsesomstendigheter (omgivelsestemperatur).

Mulighet for farlige reaksjoner: Ved tiltenkt bruk forventes ingen farlige reaksjoner.

Forhold som skal unngås: Ikke fastsatt.

Uforenlige materialer: Ikke fastsatt.

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter.

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:

Bruk verneklær.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Hold tennkilder unna – ikke røyk!

Miljømessige forholdsregler: Må ikke havne i avløpssystem, overflatevann eller grunnvann.

Metoder og materialer for oppdemming og opprensing: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagmugg).

Avhend innsamlet materiale i henhold til forskriftene.

5.4. Avfallshåndtering

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Metoder for avfallsdeponering:

Farlig avfall (AVV) må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Produktet må ikke slippes ut i kloakksystemet.

Må spesialbehandles i samsvar med offentlige forskrifter.

På slutten av behandlingen må du avhende emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav. Ved avsluttet behandling, avhend ubrukt produkt og emballasje til godkjent avfallsmottak.(setning brukt for HYPRED)

Brukt produkt kan spyles til den kommunale kloakken eller kastes i gjødseloppbevaringen, avhengig av lokale krav. Unngå utslipp til et individuelt renseanlegg for avløpsvann.

Anbefalt rensemiddel: Vann, evt. vaskemiddel om nødvendig.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet: 18 måneder

Produkter må beskyttes mot frost, oppbevares ved en temperaturer under 30 °C og skjermes fra direkte sollys.

6. Annen informasjon

Ikke relevant

7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC

7.1 Handelsnavn, godkjeningsnummer og spesifikk sammensetning for hvert enkelt produkt

Handelsnavn

Dip es barriere	Markedsområde: EU
Dip es barriere 1.4	Markedsområde: EU
Iod Dip F 14 P	Markedsområde: EU
Godkjenningsnummer (R4BP 3-asset_referansenummer - Nasjonal godkjenning) NO-0019970-0001 1-1	

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		1,16
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

1. Meta SPC administrativ informasjon**1.1. Meta SPC identitet**

meta SPC 2

1.2. Suffiks til godkjenningsnummeret

1-2

1.3 Produkttype(r)

2. Meta SPC oppbygging

2.1.Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av meta SPC

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0 - 0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		1,56 - 2,5
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Formuleringstype(r) for meta SPC

Formulering(er)

AL - Enhver annen væske

3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC

Faresetninger

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå utslipp til miljøet.

Innhold til godkjent avfallsmottak

beholder leveres til godkjent avfallsmottak

4. Godkjent bruk i meta-SPC

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Bruksnr. # 2.1 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell dypping

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Manuell dypping med en dyppekopp - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføeringsutstyret anbefales.
Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast dyppekoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
Etter melking, klem beholderen og sett dyppekoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
Fyll koppen på dyppeenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og dyppekoppen ved å skylle med vann.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Bruksnr. # 2.2 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk dypping

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Automatisk dypping -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet

Kuer: 5 ml per behandling - 0% -

Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)

Profesjonell

Pakningstørrelse og emballasje

Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg

Trommel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske dyppesystemet. Unngå utslipp av overflødig væske.
Etter melking slås vakuomet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml dypp når spenekoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske dyppesystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.
I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkeøkt for buskapen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.
Hele prosessen er automatisert.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

5. Generell bruksanvisning for meta SPC

5.1. Bruksanvisning

Se den bruksspesifikke bruksanvisningen.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Se bruksspesifikke risikoreduseringstiltak.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding: Tilfør frisk luft; rådfør deg med lege dersom symptomer forekommer.

Etter hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe, og skyll grundig.

Etter øyekontakt: Skyll med åpne øyne i flere minutter under rennende vann (minst 15 minutter).

Etter svelging: Skyll munnen, og drikk deretter rikelig med vann. Ring lege umiddelbart.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen kjente farlige reaksjoner.

Kjemisk stabilitet: Produktet er kjemisk stabilt under normale omgivelsesomstendigheter (omgivelsestemperatur).

Mulighet for farlige reaksjoner: Ved tiltenkt bruk forventes ingen farlige reaksjoner.

Forhold som skal unngås: Ikke fastsatt.

Uforenlige materialer: Ikke fastsatt.

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter.

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:

Bruk verneklær.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Hold tennkilder unna – ikke røyk!

Miljømessige forholdsregler: Må ikke havne i avløpssystem, overflatevann eller grunnvann.

Metoder og materialer for oppdemming og opprensing: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universallbindemidler, sagmugg). Avhend innsamlet materiale i henhold til forskriftene.

5.4. Avfallshåndtering

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Metoder for avfallsdeponering: Farlig avfall (AVV). Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Produktet må ikke slippes ut i kloakksystemet. Må spesialbehandles i samsvar med offentlige forskrifter.

Ved avsluttet behandling, avhend ubrukt produkt og emballasje til godkjent avfallsmottak.(setning brukt for HYPRED)

På slutten av behandlingen må du avhende emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav.

Brukt produkt kan spyles til den kommunale kloakken eller kastes i gjødseloppbevaringen, avhengig av lokale krav.

Unngå utslipp til et individuelt renseanlegg for avløpsvann.

Anbefalt rensemiddel: Vann, evt. vaskemiddel om nødvendig.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet: 18 måneder
Produkter må beskyttes mot frost, oppbevares ved en temperaturer under 30 °C og skjermes fra direkte sollys.

6. Annen informasjon

Ikke relevant

7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC

7.1 Handelsnavn, godkjenningsnummer og spesifikk sammensetning for hvert enkelt produkt

Handelsnavn

Dip es Iø-film

Markedsområde: EU

Dip es Iø-film 3.0

Markedsområde: EU

Iod-Dip Iø-film 30

Markedsområde: EU

Godkjenningsnummer

(R4BP 3-asset_referansenummer - Nasjonal godkjenning)

NO-0019970-0002 1-2

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		2,5

eddiksyre	Acetic acid	64-19-7	200-580-7	0
-----------	-------------	---------	-----------	---

1. Meta SPC administrativ informasjon

1.1. Meta SPC identitet

meta SPC 3

1.2. Suffiks til godkjenningsnummeret

1-3

1.3 Produkttype(r)

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

2. Meta SPC oppbygging

2.1.Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av meta SPC

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0 - 0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		1,56 - 4,16
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Formuleringstype(r) for meta SPC

Formulering(er)

AL - Enhver annen væske

3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC**Faresetninger**

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå utslipp til miljøet.

Innhold til godkjent avfallsmottak

beholder leveres til godkjent avfallsmottak

4. Godkjent bruk i meta-SPC**4.1 Beskrivelse av bruken****Bruk 1 - Bruksnr. # 3.1 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell dypping****Produkttype**

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative cellerVitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler**Bruksområde**

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Manuell dypping med en dyppekopp -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet

Kuer: 5 ml per behandling - 0% -

Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)

Profesjonell

Pakningstørrelse og emballasje

Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg
Trommel (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.

Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast dyppekoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.

Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.

Etter melking, klem beholderen og sett dyppekoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.

Fyll koppen på dyppeenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og dyppekoppen ved å skylle med vann.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Bruksnr. # 3.2 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk dypping

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Automatisk dypping -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet

Kuer: 5 ml per behandling - 0% -

Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)

Pakningstørrelse og emballasje

Profesjonell

Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg
Trommel (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske dyppesystemet. Unngå utslipp av overflødig væske.

Etter melking slås vakuumpet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml dypp når spenekoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske dyppesystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.

I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkeøkt for buskapen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.

Hele prosessen er automatisert.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

5. Generell bruksanvisning for meta SPC

5.1. Bruksanvisning

Se den bruksspesifikke bruksanvisningen.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Se bruksspesifikke risikoreduseringstiltak.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding: Tilfør frisk luft; rådfør deg med lege dersom symptomer forekommer.

Etter hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe, og skyll grundig.

Etter øyekontakt: Skyll med åpne øyne i flere minutter under rennende vann (minst 15 minutter).

Etter svelging: Skyll munnen, og drikk deretter rikelig med vann. Ring lege umiddelbart.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen kjente farlige reaksjoner.

Kjemisk stabilitet: Produktet er kjemisk stabilt under normale omgivelsesomstendigheter (omgivelsestemperatur).

Mulighet for farlige reaksjoner: Ved tiltenkt bruk forventes ingen farlige reaksjoner.

Forhold som skal unngås: Ikke fastsatt.

Uforenlige materialer: Ikke fastsatt.

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter.

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Bruk verneklær.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Hold tennkilder unna – ikke røyk!

Miljømessige forholdsregler: Må ikke havne i avløpssystem, overflatevann eller grunnvann.

Metoder og materialer for oppdemming og opprensing: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagmugg). Avhend innsamlet materiale i henhold til forskriftene.

5.4. Avfallshåndtering

5.4. Avfallshåndtering

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Metoder for avfallsdeponering: Farlig avfall (AVV). Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Produktet må ikke slippes ut i kloakksystemet. Må spesialbehandles i samsvar med offentlige forskrifter.

På slutten av behandlingen må du avhende emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav. Brukt produkt kan spyles til den kommunale kloakken eller kastes i gjødseloppbevaringen, avhengig av lokale krav. Unngå utslipp til et individuelt renseanlegg for avløpsvann.

Anbefalt rensemiddel: Vann, evt. vaskemiddel om nødvendig.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet: 18 måneder

Produkter må beskyttes mot frost, oppbevares ved en temperaturer under 30 °C og skjermes fra direkte sollys.

6. Annen informasjon

Ikke relevant

7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC

7.1 Handelsnavn, godkjeningsnummer og spesifikk sammensetning for hvert enkelt produkt

Handelsnavn

Dip es barriere S	Markedsområde: EU
Dip es barriere 3.0	Markedsområde: EU
Iod-Dip F 30 P	Markedsområde: EU

Godkjenningsnummer

(R4BP 3-asset_referansenummer - Nasjonal godkjenning)

Baktostop Barrier color	Markedsområde: EU
NO-0019970-0003 1-3	

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		2,5
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

Handelsnavn

Dip es barriere RS	Markedsområde: EU
Dip es barriere 5.0	Markedsområde: EU
Iod-Dip F 50 P	Markedsområde: EU
BaktoStop barier	Markedsområde: EU
NO-0019970-0004 1-3	

Godkjenningsnummer

(R4BP 3-asset_referansenummer - Nasjonal godkjenning)

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		4,16
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

1. Meta SPC administrativ informasjon

1.1. Meta SPC identitet

meta SPC 4

1.2. Suffiks til godkjenningsnummeret

1-4

1.3 Produkttype(r)

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

2. Meta SPC oppbygging

2.1.Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av meta SPC

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0 - 0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		1,56 - 2,5
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Formuleringstype(r) for meta SPC

Formulering(er)

AL - Enhver annen væske

3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC

Faresetninger

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå utslipp til miljøet.

Innhold til godkjent avfallsmottak

beholder leveres til godkjent avfallsmottak

4. Godkjent bruk i meta-SPC

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Bruksnr. # 4.1 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell dypping

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte	Manuell dypping med en dyppekopp - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
 Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.
 Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast dyppekoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
 Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
 Etter melking, klem beholderen og sett dyppekoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
 Fyll koppen på dyppeenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
 La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
 Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og dyppekoppen ved å skylle med vann.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Bruksnr. # 4.2 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med sprayflaske

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	Ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Manuell spraying med en sprayflaske - Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
 Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.
 Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast toppen av sprayflasken på beholderen.
 Unngå utslipp av overflødig væske.
 Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
 Etter melking, spray desinfeksjonsmiddelet på spenene ved hjelp av sprayflasken, og sørg for at ca. 3 cm av spenen rundt spenekanalen er dekket med desinfeksjonsmiddelet.
 Fyll beholderen på sprayflasken med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
 La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
 Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og sprayflasken ved å skylle med vann.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

Bruk kjemikaliebestandige hansker (hanskematerialet skal angis av godkjenningssinnehaveren i produktinformasjonen) for spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med en sprayflaske.
 Unngå å arbeide i spraytåke.

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3 Beskrivelse av bruken

Bruk 3 - Bruksnr. # 4.3 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med en elektrisk sprøytepistol

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Manuell spraying med en elektrisk sprøytepistol -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
 Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og sett inn en oppsugingsslange til den elektriske sprøytepipetten. Unngå utslipp av overflødig væske.
 Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
 Etter melking, spray desinfeksjonsmiddelet på spenene ved hjelp av den elektriske sprøytepipetten, og sørg for at ca. 3 cm av spenen rundt spenekanalen er dekket med desinfeksjonsmiddelet.
 Skift ut den tomme kannen etter behov, med en ny kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet.
 La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
 Etter desinfeksjonen setter du oppsugingsslangesystemet i en bøtte med vann, og skyller sprøytepipetten ved å pumpe vannet gjennom sprøytepipetten.

4.3.2 Beskyttelsestiltak

Bruk kjemikaliebestandige hansker (hanskematerialet skal angis av godkjenningssinnehaveren i produktinformasjonen) for spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med en elektrisk sprøytepipette.
 Unngå å arbeide i spraytåke.
 Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.3.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4 Beskrivelse av bruken

Bruk 4 - Bruksnr. # 4.4 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk dypping

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Automatisk dypping -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
 Åpne en canne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske dyppesystemet. Unngå utslipp av overflødig væske.
 Etter melking slås vakuomet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml dypp når spenekoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske dyppesystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.
 I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkeøkt for buskapen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.
 La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
 Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.
 Hele prosessen er automatisert.

4.4.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.4.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5 Beskrivelse av bruken

Bruk 5 - Bruksnr. # 4.5 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk spraying med robot

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Automatisk spraying med robot - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.5.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
 Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til robotmelkeenheten. Unngå utslipp av overflødig væske.
 Spenene rengjøres av en robot med automatiske børster.
 Etter robotmelking sprayer desinfeksjonsmiddelet automatisk på spenene fra et melkeorgan.
 La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
 Skyllingen av sprøytepipetten er automatisk.

4.5.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.5.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

5. Generell bruksanvisning for meta SPC

5.1. Bruksanvisning

Se den bruksspesifikke bruksanvisningen.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Se bruksspesifikke risikoreduseringstiltak.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding: Tilfør frisk luft; rådfør deg med lege dersom symptomer forekommer.

Etter hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe, og skyll grundig.

Etter øyekontakt: Skyll med åpne øyne i flere minutter under rennende vann (minst 15 minutter).

Etter svelging: Skyll munnen, og drikk deretter rikelig med vann. Ring lege umiddelbart.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen kjente farlige reaksjoner.

Kjemisk stabilitet: Produktet er kjemisk stabilt under normale omgivelsesomstendigheter (omgivelsestemperatur).

Mulighet for farlige reaksjoner: Ved tiltenkt bruk forventes ingen farlige reaksjoner.

Forhold som skal unngås: Ikke fastsatt.

Uforenlige materialer: Ikke fastsatt.

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter.

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:

Bruk verneklær.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Hold tennkilder unna – ikke røyk!

Miljømessige forholdsregler: Må ikke havne i avløpssystem, overflatevann eller grunnvann.

Metoder og materialer for oppdemming og opprensing: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagmugg). Avhend innsamlet materiale i henhold til forskriftene.

5.4. Avfallshåndtering

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Metoder for avfallsdeponering: Farlig avfall (AVV). Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Produktet må ikke slippes ut i kloakksystemet. Må spesialbehandles i samsvar med offentlige forskrifter.

På slutten av behandlingen må du avhende emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav. Brukt produkt kan spyles til den kommunale kloakken eller kastes i gjødseloppbevaringen, avhengig av lokale krav. Unngå utslipp til et individuelt renseanlegg for avløpsvann.

Anbefalt rensemiddel: Vann, evt. vaskemiddel om nødvendig.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet: 18 måneder

Produkter må beskyttes mot frost, oppbevares ved en temperaturer under 30 °C og skjermes fra direkte sollys.

6. Annen informasjon

Ikke relevant

7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC

7.1 Handelsnavn, godkjenningsnummer og spesifikk sammensetning for hvert enkelt produkt

Handelsnavn

Dip es silver

Markedsområde: EU

Godkjenningsnummer

(R4BP 3-asset_referansenummer - Nasjonal godkjenning)

NO-0019970-0005 1-4

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		2,5
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

1. Meta SPC administrativ informasjon

1.1. Meta SPC identitet

meta SPC 5

1.2. Suffiks til godkjenningsnummeret

1-5

1.3 Produkttype(r)

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

2. Meta SPC oppbygging

2.1.Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av meta SPC

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0 - 0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		1,16 - 1,16
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Formuleringstype(r) for meta SPC

Formulering(er)

AL - Enhver annen væske

3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

4. Godkjent bruk i meta-SPC

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Bruksnr. # 5.1 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell dypping

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Manuell dypping med en dyppekopp -
Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
 Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.
 Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast dyppekoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
 Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
 Etter melking, klem beholderen og sett dyppekoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
 Fyll koppen på dyppeenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
 La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
 Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og dyppekoppen ved å skylle med vann.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Bruksnr. # 5.2 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med sprayflaske

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Manuell spraying med en sprayflaske - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell

Pakningstørrelse og emballasje

Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg

Trommel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.

Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast toppen av sprayflasken på beholderen.

Unngå utslipp av overflødig væske.

Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.

Etter melking, spray desinfeksjonsmiddelet på spenene ved hjelp av sprayflasken, og sørg for at ca. 3 cm av spenen rundt spenekanalen er dekket med desinfeksjonsmiddelet.

Fyll beholderen på sprayflasken med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og sprayflasken ved å skylle med vann.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

Unngå å arbeide i spraytåke.

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3 Beskrivelse av bruken

Bruk 3 - Bruksnr. # 5.3 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med en elektrisk sprøytetipistol

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Manuell spraying med en elektrisk sprøytetipistol - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og sett inn en oppsugingsslange til den elektriske sprøytepipetten. Unngå utslipp av overflødig væske.

Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.

Etter melking, spray desinfeksjonsmiddelet på spenene ved hjelp av den elektriske sprøytepipetten, og sørg for at ca. 3 cm av spenen rundt spenekanalen er dekket med desinfeksjonsmiddelet.

Skift ut den tomme kannen etter behov, med en ny kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etter desinfeksjonen setter du oppsugingsslangesystemet i en bøtte med vann, og skyller sprøytepipetten ved å pumpe vannet gjennom sprøytepipetten.

4.3.2 Beskyttelsestiltak

Unngå å arbeide i spraytåke.

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.3.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4 Beskrivelse av bruken

Bruk 4 - Bruksnr. # 5.4 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk dypping

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Automatisk dypping - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske dyppesystemet. Unngå utslipp av overflødig væske.

Etter melking slås vakuumpet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml dypp når spenekoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske dyppesystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.

I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkeøkt for buskapen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.

Hele prosessen er automatisert.

4.4.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.4.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5 Beskrivelse av bruken

Bruk 5 - Bruksnr. # 5.5 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk spraying med robot

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Automatisk spraying med robot - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.5.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Åpne en canne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til robotmelkeenheten. Unngå utslipp av overflødig væske.
Spenene rengjøres av en robot med automatiske børster.
Etter robotmelking sprayer desinfeksjonsmiddelet automatisk på spenene fra et melkeorgan.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Skylingen av sprøytepipetten er automatisk.

4.5.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.5.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

5. Generell bruksanvisning for meta SPC

5.1. Bruksanvisning

Se den bruksspesifikke bruksanvisningen.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Se bruksspesifikke risikoredueringstiltak.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding: Tilfør frisk luft; rådfør deg med lege dersom symptomer forekommer.

Etter hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe, og skyll grundig.

Etter øyekontakt: Skyll med åpne øyne i flere minutter under rennende vann (minst 15 minutter).

Etter svelging: Skyll munnen, og drikk deretter rikelig med vann. Ring lege umiddelbart.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen kjente farlige reaksjoner.

Kjemisk stabilitet: Produktet er kjemisk stabilt under normale omgivelsesomstendigheter (omgivelsestemperatur).

Mulighet for farlige reaksjoner: Ved tiltenkt bruk forventes ingen farlige reaksjoner.

Forhold som skal unngås: Ikke fastsatt.

Uforenlige materialer: Ikke fastsatt.

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter.

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:

Bruk verneklær.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Hold tennkilder unna – ikke røyk!

Miljømessige forholdsregler: Må ikke havne i avløpssystem, overflatevann eller grunnvann.

Metoder og materialer for oppdemming og opprensing: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagmugg).

Avhend innsamlet materiale i henhold til forskriftene.

5.4. Avfallshåndtering

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Metoder for avfallsdeponering: Farlig avfall (AVV). Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Produktet må ikke slippes ut i kloakksystemet. Må spesialbehandles i samsvar med offentlige forskrifter.

På slutten av behandlingen må du avhende emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav. Brukt produkt kan spyles til den kommunale kloakken eller kastes i gjødseloppbevaringen, avhengig av lokale krav. Unngå utslipp til et individuelt renseanlegg for avløpsvann.

Anbefalt rensemiddel: Vann, evt. vaskemiddel om nødvendig.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet: 18 måneder
Produkter må beskyttes mot frost, oppbevares ved en temperaturer under 30 °C og skjermes fra direkte sollys.

6. Annen informasjon

Ikke relevant

7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC

7.1 Handelsnavn, godkjenningsnummer og spesifikk sammensetning for hvert enkelt produkt

Handelsnavn	Dip es SF	Markedsområde: EU
	Dip es SF 3.0	Markedsområde: EU
	Iod Dip S 30 P	Markedsområde: EU
	Dip es SF 1.4	Markedsområde: EU
	Iod-Dip S 14 P	Markedsområde: EU
	EUTADIPP	Markedsområde: EU
Godkjenningsnummer (R4BP 3-asset_referansenummer - Nasjonal godkjenning)	NO-0019970-0006 1-5	

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		1,16
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

1. Meta SPC administrativ informasjon

1.1. Meta SPC identitet

meta SPC 6

1.2. Suffiks til godkjenningsnummeret

1-6

1.3 Produkttype(r)

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

2. Meta SPC oppbygging

2.1.Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av meta SPC

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0 - 0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		1,16 - 1,16
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Formuleringstype(r) for meta SPC

Formulering(er)

AL - Enhver annen væske

3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

4. Godkjent bruk i meta-SPC

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Bruksnr. #6.1 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon før melking ved manuell skumming

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk før melking

Bruksmåte

Manuell skumming med en skumkopp -
Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring før melking: 2–3 ganger/dag (før hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
 Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.
 Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast skumkoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
 Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk før desinfiseringen før melking.
 Før melking, klem beholderen og sett skumkoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
 La produktet være på spenene i minst 60 sekunder.
 Fyll koppen på skummingsenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
 Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
 Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og skumkoppen ved å skylle med vann.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Dette produktet kan brukes til kombinert desinfeksjon før og etter melking. Det bør imidlertid ikke brukes i kombinasjon med et annet jodbasert produkt.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Bruksnr. # 6.2 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell skumming

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Manuell skumming med en skumkopp -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet

Kuer: 5 ml per behandling - 0% -

Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)

Profesjonell

Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg

Pakningstørrelse og emballasje

Trommel (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.
Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast skumkoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
Etter melking, klem beholderen og sett skumkoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
Fyll koppen på skummingsenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og skumkoppen ved å skylle med vann.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

Dette produktet kan brukes til kombinert desinfeksjon før og etter melking. Det bør imidlertid ikke brukes i kombinasjon med et annet jodbasert produkt.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3 Beskrivelse av bruken

Bruk 3 - Bruksnr. # 6.3 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk skumming

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Automatisk skumming - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske skummingssystemet. Unngå utslipp av overflødig væske.

Etter melking slås vakuemet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml skum når speneskumkoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske skummingssystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.

I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkekøkt for buskapen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.

Hele prosessen er automatisert.

4.3.2 Beskyttelsestiltak

Dette produktet kan brukes til kombinert desinfeksjon før og etter melking. Det bør imidlertid ikke brukes i kombinasjon med et annet jodbasert produkt.

4.3.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4 Beskrivelse av bruken

Bruk 4 - Bruksnr. #6.4 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon før og etter melking ved manuell skumming

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk før og etter melking
Bruksmåte	Manuell skumming med en skumkopp - Se bruksanvisning
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring før etter melking: 4–6 ganger/dag (før og etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.
Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast skumkoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før spenedesinfeksjon før melking.
Før melking, klem beholderen og sett skumkoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet. La produktet være på spenene i minst 60 sekund.
Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking. Etter melking, gjenta desinfiseringen ved skumming som beskrevet over.
Fyll koppen på skummingsenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og skumkoppen ved å skylle med vann.

4.4.2 Beskyttelsestiltak

Dette produktet kan brukes til kombinert desinfeksjon før og etter melking. Det bør imidlertid ikke brukes i kombinasjon med et annet jodbasert produkt.

4.4.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

5. Generell bruksanvisning for meta SPC

5.1. Bruksanvisning

5.1. Bruksanvisning

Se den bruksspesifikke bruksanvisningen.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Se bruksspesifikke risikoredueringstiltak.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding: Tilfør frisk luft; rådfør deg med lege dersom symptomer forekommer.

Etter hudkontakt: Vask umiddelbart med vann og såpe, og skyll grundig.

Etter øyekontakt: Skyll med åpne øyne i flere minutter under rennende vann (minst 15 minutter).

Etter svelging: Skyll munnen, og drikk deretter rikelig med vann. Ring lege umiddelbart.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen kjente farlige reaksjoner.

Kjemisk stabilitet: Produktet er kjemisk stabilt under normale omgivelsesomstendigheter (omgivelsestemperatur).

Mulighet for farlige reaksjoner: Ved tiltenkt bruk forventes ingen farlige reaksjoner.

Forhold som skal unngås: Ikke fastsatt.

Uforenlige materialer: Ikke fastsatt.

Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter.

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:

Bruk verneklær.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Hold tennkilder unna – ikke røyk!

Miljømessige forholdsregler: Må ikke havne i avløpssystem, overflatevann eller grunnvann.

Metoder og materialer for oppdemming og opprensing: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagmugg). Avhend innsamlet materiale i henhold til forskriftene.

5.4. Avfallshåndtering

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Metoder for avfallsdeponering: Farlig avfall (AVV). Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Produktet må ikke slippes ut i kloakksystemet. Må spesialbehandles i samsvar med offentlige forskrifter.

På slutten av behandlingen må du avhende emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav. Brukt produkt kan spyles til den kommunale kloakken eller kastes i gjødseloppbevaringen, avhengig av lokale krav. Unngå utslipp til et individuelt renseanlegg for avløpsvann.

Anbefalt rensemiddel: Vann, evt. vaskemiddel om nødvendig.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet: 18 måneder

Produkter må beskyttes mot frost, oppbevares ved en temperaturer under 30 °C og skjermes fra direkte sollys.

6. Annen informasjon

Ikke relevant

7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC

7.1 Handelsnavn, godkjeningsnummer og spesifikk sammensetning for hvert enkelt produkt

Handelsnavn

Dip es lo-foam	Markedsområde: EU
Dip es lo-foam 1.4	Markedsområde: EU
Iod-Dip lo-foam	Markedsområde: EU
BaktoStop foam	Markedsområde: EU
Godkjeningsnummer	
NO-0019970-0007 1-6	

(R4BP 3-asset_referansenummer - Nasjonal godkjenning)

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		1,16
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

1. Meta SPC administrativ informasjon

1.1. Meta SPC identitet

meta SPC 7

1.2. Suffiks til godkjenningsnummeret

1-7

1.3 Produkttype(r)

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

2. Meta SPC oppbygging

2.1.Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av meta SPC

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0,14 - 0,14
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		0 - 0
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,11 - 0,33

2.2. Formuleringstype(r) for meta SPC

Formulering(er)

AL - Enhver annen væske

3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC

Faresetninger

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

Unngå utslipp til miljøet.

Innhold til godkjent avfallsmottak

beholder leveres til godkjent avfallsmottak

4. Godkjent bruk i meta-SPC

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Bruksnr. # 7.1 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell dypping

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Manuell dypping med en dyppekopp -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
 Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføeringsutstyret anbefales.
 Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast dyppekoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
 Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
 Etter melking, klem beholderen og sett dyppekoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
 Fyll koppen på dyppeenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
 La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
 Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og dyppekoppen ved å skylle med vann.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Bruksnr. # 7.2 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell skumming

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Manuell skumming med en skumkopp -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet

Kuer: 5 ml per behandling - 0% -

Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)

Profesjonell

Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg

Pakningstørrelse og emballasje

Trommel (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.
Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast skumkoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
Etter melking, klem beholderen og sett skumkoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
Fyll koppen på skummingsenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og skumkoppen ved å skylle med vann.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3 Beskrivelse av bruken

Bruk 3 - Bruksnr. # 7.3 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med sprayflaske

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Manuell spraying med en sprayflaske - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføeringsutstyret anbefales.
Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast toppen av sprayflasken på beholderen.
Unngå utslipp av overflødig væske.
Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
Etter melking, spray desinfeksjonsmiddelet på spenene ved hjelp av sprayflasken, og sørg for at ca. 3 cm av spenen rundt spenekanalen er dekket med desinfeksjonsmiddelet.
Fyll beholderen på sprayflasken med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og sprayflasken ved å skylle med vann.

4.3.2 Beskyttelsestiltak

Bruk kjemikaliebestandige hansker (hanskematerialet skal angis av godkjenningssinnehaveren i produktinformasjonen) for spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med en sprayflaske.
Unngå å arbeide i spraytåke.

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.3.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4 Beskrivelse av bruken

Bruk 4 - Bruksnr. # 7.4 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med en elektrisk sprøtepistol

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Manuell spraying med en elektrisk sprøytepistol -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet

Kuer: 5 ml per behandling - 0% -

Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)

Profesjonell

Pakningstørrelse og emballasje

Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg
Trommel (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.

Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og sett inn en oppsugingsslange til den elektriske sprøytepistolen. Unngå utslipp av overflødig væske.

Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.

Etter melking, spray desinfeksjonsmiddelet på spenene ved hjelp av den elektriske sprøytepistolen, og sørg for at ca. 3 cm av spenen rundt spenekanalen er dekket med desinfeksjonsmiddelet.

Skift ut den tomme kannen etter behov, med en ny kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etter desinfeksjonen setter du oppsugingsslangesystemet i en bøtte med vann, og skyller sprøytepistolen ved å pumpe vannet

gjennom sprøytetipstolen.

4.4.2 Beskyttelsestiltak

Bruk kjemikaliebestandige hansker (hanskematerialet skal angis av godkjenningssinnehaveren i produktinformasjonen) for spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med en elektrisk sprøytetipstol. Unngå å arbeide i spraytåke.

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.4.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5 Beskrivelse av bruken

Bruk 5 - Bruksnr. # 7.5 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk dypping

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

	Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Automatisk dypping - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.5.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske dyppesystemet. Unngå utslipp av overflødig væske.

Etter melking slås vakuemet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml dypp når spenekoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske dyppesystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.

I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkeøkt for buskapen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.

Hele prosessen er automatisert.

4.5.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.5.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.6 Beskrivelse av bruken

Bruk 6 - Bruksnr. # 7.6 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk skumming

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper

	Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Automatisk skumming - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.6.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
 Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske skummingssystemet.
 Unngå utslipp av overflødig væske.
 Etter melking slås vakuemet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml skum når speneskumkoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske skummingssystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.
 I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkeøkt for buskapen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.
 La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
 Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.
 Hele prosessen er automatisert.

4.6.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.6.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.6.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.6.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.7 Beskrivelse av bruken

Bruk 7 - Bruksnr. # 7.7 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk spraying med robot

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Automatisk spraying med robot -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet

Kuer: 5 ml per behandling - 0% -
Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)

Profesjonell

Pakningstørrelse og emballasje

Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg
Trommel (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.7.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til robotmelkeenheten. Unngå utslipp av overflødig væske.
Spenene rengjøres av en robot med automatiske børster.
Etter robotmelking sprayer desinfeksjonsmiddelet automatisk på spenene fra et melkeorgan.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Skyllingen av sprøytepipstolen er automatisk.

4.7.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.7.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.7.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.7.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

5. Generell bruksanvisning for meta SPC

5.1. Bruksanvisning

Se den bruksspesifikke bruksanvisningen.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Se bruksspesifikke risikoredueringstiltak.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding: Tilfør frisk luft; rådfør deg med lege dersom symptomer forekommer.

Etter hudkontakt: Vask med vann og såpe.

Etter øyekontakt: Skyll med åpne øyne i flere minutter under rennende vann. Kontakt deretter lege.

Etter svelging: Skyll munnen, og drikk deretter rikelig med vann. Oppsøk legehjelp umiddelbart.

Stabilitet og reaktivitet

Mulighet for farlige reaksjoner: Reaksjon med oksiderings- og reduksjonsmiddel.

Forhold som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

Uforenlige materialer: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

Farlige nedbrytningsprodukter: jod (under oppvarming).

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Ingen spesialtiltak kreves.

Miljømessige forholdsregler: Større mengder av produktet må ikke slippes ut i kloakksystemer eller vannmasser.

Metoder og materialer for oppdemming og opprensing: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universallbindemidler, sagmugg). Avhend innsamlet materiale i henhold til forskriftene.

5.4. Avfallshåndtering

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Metoder for avfallsdeponering

Anbefaling: Må spesialbehandles i samsvar med offentlige forskrifter.

Nøkkelnnummer for avfallsdeponering: Samsvarende med forskriften til Den europeiske avfallslisten, må relasjonen til avfallets nøkkelnnumre gjøres spesifikk for industri og prosess.

Den europeiske avfallslisten: Samsvarende med forskriften til EAL må relasjonen til avfallets nøkkelnnumre gjøres spesifikk for industri og prosess.

På slutten av behandlingen må du avhende emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav. Brukt produkt kan spyles til den kommunale kloakken eller kastes i gjødseloppbevaringen, avhengig av lokale krav. Unngå utslipp til et individuelt renseanlegg for avløpsvann.

Anbefalt rensemiddel: Vann, evt. vaskemiddel om nødvendig.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet: 24 måneder

Produkter må beskyttes mot frost, oppbevares ved en temperaturer under 30 °C og skjermes fra direkte sollys.

6. Annen informasjon

Ikke relevant

7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC

7.1 Handelsnavn, godkjeningsnummer og spesifikk sammensetning for hvert enkelt produkt

Handelsnavn

calgodip D 1200	Markedsområde: EU
Jod-Dip S 12	Markedsområde: EU
Dip es SF 1200	Markedsområde: EU
Godkjenningsnummer (R4BP 3-asset_referansenummer - Nasjonal godkjenning) NO-0019970-0008 1-7	

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0,14
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		0
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,15

1. Meta SPC administrativ informasjon**1.1. Meta SPC identitet**

meta SPC 8

1.2. Suffiks til godkjenningsnummeret

1-8

1.3 Produkttype(r)

2. Meta SPC oppbygging

2.1.Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av meta SPC

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0,14 - 0,54
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		0 - 0
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,11 - 0,33

2.2. Formuleringstype(r) for meta SPC

Formulering(er)

AL - Enhver annen væske

3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC

Faresetninger

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

Unngå utslipp til miljøet.

Innhold til godkjent avfallsmottak

beholder leveres til godkjent avfallsmottak

4. Godkjent bruk i meta-SPC

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Bruksnr. # 8.1– Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell dypping

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Manuell dypping med en dyppekopp - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg Trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.
Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast dyppekoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
Etter melking, klem beholderen og sett dyppekoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
Fyll koppen på dyppeenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen. Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og dypekoppen ved å skylle med vann.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Bruksnr. # 8.2 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk dypping

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Bruksmåte

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Automatisk dypping -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet

Kuer: 5 ml per behandling - 0% -

Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)

Profesjonell

Pakningstørrelse og emballasje

Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg

Trommel (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske dyppesystemet. Unngå utslipp av overflødig væske.

Etter melking slås vakuumpet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml dypp når spenekoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske dyppesystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.

I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkekøkt for buskappen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.

Hele prosessen er automatisert.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

5. Generell bruksanvisning for meta SPC

5.1. Bruksanvisning

Se den bruksspesifikke bruksanvisningen.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Se bruksspesifikke risikoreduseringstiltak.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding: Tilfør frisk luft; rådfør deg med lege dersom symptomer forekommer.

Etter hudkontakt: Vask med vann og såpe. Ta kontakt med lege hvis hudirritasjon fortsetter.

Etter øyekontakt: Skyll med åpne øyne i flere minutter under rennende vann. Ta kontakt med lege hvis symptomene vedvarer.

Etter svelging: Skyll munnen, og drikk deretter rikelig med vann. Oppsøk legehjelp.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
Kjemisk stabilitet / termisk nedbryting / forhold som skal unngås: Ingen nedbrytning ved bruk iht. spesifikasjonene.
Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen kjente farlige reaksjoner.
Forhold som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
Uforenlige materialer: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
Farlige nedbrytningsprodukter: jod (under oppvarming).

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Ingen spesialtiltak kreves.

Miljømessige forholdsregler: Større mengder av produktet må ikke slippes ut i kloakksystemer eller vannmasser.

Metoder og materialer for oppdemming og opprensing: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler). Ikke bruk brennbart materiale som sagflis. Avhend innsamlet materiale i henhold til forskriftene.

5.4. Avfallshåndtering

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Metoder for avfallsdeponering

Anbefaling: Må spesialbehandles i samsvar med offentlige forskrifter.

Nøkkelnummer for avfallsdeponering: Samsvarende med forskriften til Den europeiske avfallslisten, må relasjonen til avfallets nøkkelnumre gjøres spesifikk for industri og prosess.

Den europeiske avfallslisten: Samsvarende med forskriften til EAL må relasjonen til avfallets nøkkelnumre gjøres spesifikk for industri og prosess.

På slutten av behandlingen må du avhende emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav. Brukt produkt kan spyles til den kommunale kloakken eller kastes i gjødseloppbevaringen, avhengig av lokale krav. Unngå utslipp til et individuelt renseanlegg for avløpsvann.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

SHoldbarhet: 24 måneder

Produkter må beskyttes mot frost, oppbevares ved en temperaturer under 30 °C og skjermes fra direkte sollys.

6. Annen informasjon

Ikke relevant

7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC

7.1 Handelsnavn, godkjenningsnummer og spesifikk sammensetning for hvert enkelt produkt

Handelsnavn

calgodip D 3000 Film	Markedsområde: EU
Jod-Dip F 30	Markedsområde: EU
Jod Dipp 30 Film (Technolit)	Markedsområde: EU
Jod 30 Film (Iwetec)	Markedsområde: EU
Dip es barriere 3000	Markedsområde: EU
Lerapur Dip Jod 30	Markedsområde: EU
BaktoStop barrier color 3.0	Markedsområde: EU
Godkjenningsnummer (R4BP 3-asset_referansenummer - Nasjonal godkjenning) NO-0019970-0009 1-8	

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0,34

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		0
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,26

Handelsnavn

calgodip D 5000	Markedsområde: EU
Jod Dip F 50	Markedsområde: EU
Jod Dipp 50 (Iwetec)	Markedsområde: EU
Jod-Dipp 50 (Technolit)	Markedsområde: EU
Dip es barriere 5000	Markedsområde: EU
BaktoStop barrier 5.0	Markedsområde: EU
Godkjenningsnummer (R4BP 3-asset_referansenummer - Nasjonal godkjenning) NO-0019970-0010 1-8	

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0,54
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		0
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,26

1. Meta SPC administrativ informasjon

1.1. Meta SPC identitet

meta SPC 9

1.2. Suffiks til godkjenningsnummeret

1-9

1.3 Produkttype(r)

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

2. Meta SPC oppbygging

2.1.Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av meta SPC

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0,34 - 0,34
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		0 - 0
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,11 - 0,33

2.2. Formuleringstype(r) for meta SPC

Formulering(er)

AL - Enhver annen væske

3. Fare og sikkerhetssetninger for meta SPC

Faresetninger	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger	Unngå utslipp til miljøet. Innhold til godkjent avfallsmottak beholder leveres til godkjent avfallsmottak

4. Godkjent bruk i meta-SPC

4.1 Beskrivelse av bruken

Bruk 1 - Bruksnr. #9.1 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell dypping

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	Ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Manuell dypping med en dyppekopp - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
 Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføeringsutstyret anbefales.
 Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast dyppekoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
 Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
 Etter melking, klem beholderen og sett dyppekoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
 Fyll koppen på dyppeenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
 La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
 Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og dyppekoppen ved å skylle med vann.

4.1.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking

4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

--

4.2 Beskrivelse av bruken

Bruk 2 - Bruksnr. # 9.2 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell skumming

Produkttype	PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)
Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken	Ikke relevant
Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)	Vitenskapelig navn: Bakterier Vanlig navn: Bakterier Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Manuell skumming med en skumkopp - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påførigsutstyret anbefales.
Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast skumkoppen på toppen. Unngå utslipp av overflødig væske.
Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.
Etter melking, klem beholderen og sett skumkoppen over hver spene nedenfra, og sørg for at ca. 3 cm av spenen er nedsenket i desinfeksjonsmiddelet.
Fyll koppen på skummingsenheten med nytt desinfeksjonsmiddel ved å klemme på beholderen etter behov. Fyll beholderen med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og skumkoppen ved å skylle med vann.

4.2.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3 Beskrivelse av bruken

Bruk 3 - Bruksnr. # 9.3 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med sprayflaske

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Manuell spraying med en sprayflaske -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet

Kuer: 5 ml per behandling - 0% -

Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)

Profesjonell

Pakningstørrelse og emballasje

Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg
trommel (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Bruk av en doseringspumpe for å fylle produktet i påføringsutstyret anbefales.

Fyll beholderen med klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og skru fast toppen av sprayflasken på beholderen.

Unngå utslipp av overflødig væske.

Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.

Etter melking, spray desinfeksjonsmiddelet på spenene ved hjelp av sprayflasken, og sørg for at ca. 3 cm av spenen rundt spenekanalen er dekket med desinfeksjonsmiddelet.

Fyll beholderen på sprayflasken med nytt desinfeksjonsmiddel etter behov.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etter desinfeksjon tømmer du beholderen, og rengjør beholderen og sprayflasken ved å skylle med vann.

4.3.2 Beskyttelsestiltak

Bruk kjemikaliebestandige hansker (hanskematerialet skal angis av godkjenningssinnehaveren i produktinformasjonen), overall og kjemikaliebestandige støvler for spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med en sprayflaske. Unngå å arbeide i spraytåke.

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.3.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.3.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4 Beskrivelse av bruken

Bruk 4 - Bruksnr. # 9.4 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med en elektrisk sprøtepistol

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier

	Utviklingsstadium: vegetative celler Vitenskapelig navn: Gjærsopper Vanlig navn: Gjærsopper Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Manuell spraying med en elektrisk sprøytepistol - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, med 5 ml produkt anslått per ku, og sett inn en oppsugingsslange til den elektriske sprøytepistolen. Unngå utslipp av overflødig væske.

Rengjør spenene forsiktig ved å tørke med papirhåndkle/klut til engangsbruk umiddelbart før melking.

Etter melking, spray desinfeksjonsmiddelet på spenene ved hjelp av den elektriske sprøytepistolen, og sørg for at ca. 3 cm av spenen rundt spenekanalen er dekket med desinfeksjonsmiddelet.

Skift ut den tomme kannen etter behov, med en ny kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etter desinfeksjonen setter du oppsugingsslangesystemet i en bøtte med vann, og skyller sprøytepistolen ved å pumpe vannet gjennom sprøytepistolen.

4.4.2 Beskyttelsestiltak

Bruk kjemikaliebestandige hansker (hanskematerialet skal angis av godkjenningssinnehaveren i produktinformasjonen), overall og kjemikaliebestandige støvler for spenedesinfeksjon etter melking ved manuell spraying med en elektrisk sprøytepistol. Unngå å arbeide i spraytåke.

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.4.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.4.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5 Beskrivelse av bruken

Bruk 5 - Bruksnr. # 9.5 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk dypping

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper

	Utviklingsstadium: vegetative celler
Bruksområde	Innendørs Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking
Bruksmåte	Automatisk dypping - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg trommel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.5.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
 Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske dyppesystemet. Unngå utslipp av overflødig væske.
 Etter melking slås vakuumpet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml dypp når spenekoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske dyppesystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.
 I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkeøkt for buskapen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.
 La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
 Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.
 Hele prosessen er automatisert.

4.5.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.5.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.5.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.6 Beskrivelse av bruken

Bruk 6 - Bruksnr. # 9.6 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk skumming

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte	Automatisk skumming - Se bruksanvisningen
Bruksmengde og hyppighet	Kuer: 5 ml per behandling - 0% - Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)
Brukerkategori(er)	Profesjonell
Pakningstørrelse og emballasje	Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg trømmel (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.6.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.

Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til det automatiske skummingssystemet. Unngå utslipp av overflødig væske.

Etter melking slås vakuemet av, og spenedesinfeksjonsmiddelet injiseres i en manifold på sentralen. Spenene belegges med ca. 5 ml skum når speneskumkoppen trekkes tilbake ved automatisk avtak av melkeorgan (ACR). Etter avtak av ACR renses hvert innlegg i det automatiske skummingssystemet grundig med vann, og blåses ut med trykkluft.

I et endelig rengjøringstrinn etter hver melkeøkt for buskapen, desinfiseres innleggene (f.eks. med et klorbasert produkt) og blåses ut igjen med trykkluft.

La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.

Etterpå er melkesystemet klart for neste melking.

Hele prosessen er automatisert.

4.6.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.6.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.6.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.6.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

4.7 Beskrivelse av bruken

Bruk 7 - Bruksnr. # 9.7 – Spenedesinfeksjon av dyr som kan melkes: spenedesinfeksjon etter melking ved automatisk spraying med robot

Produkttype

PT03 - Biocidprodukter til veterinærhygiene (desinfeksjon)

Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Ikke relevant

Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Bakterier
Vanlig navn: Bakterier
Utviklingsstadium: vegetative celler

Vitenskapelig navn: Gjærsopper
Vanlig navn: Gjærsopper
Utviklingsstadium: vegetative celler

Bruksområde

Innendørs

Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (melkekuer) for bruk etter melking

Bruksmåte

Automatisk spraying med robot -

Se bruksanvisningen

Bruksmengde og hyppighet

Kuer: 5 ml per behandling - 0% -
Påføring etter melking: 2–3 ganger/dag (etter hver melking)

Brukerkategori(er)

Profesjonell

Pakningstørrelse og emballasje

Jerrykanne (HDPE): 5 – 60 kg
trommel (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.7.1 Bruksanvisning

Produktet må varmes til en temperatur over 20 °C før bruk.
Åpne en kanne som inneholder klar-til-bruk-produktet, og sett inn en oppsugingsslange til robotmelkeenheten. Unngå utslipp av overflødig væske.
Spenene rengjøres av en robot med automatiske børster.
Etter robotmelking sprayer desinfeksjonsmiddelet automatisk på spenene fra et melkeorgan.
La produktet være på spenene til neste melking. Hold dyrene stående i minst 5 minutter etter behandlingen.
Skylingen av sprøtepistolen er automatisk.

4.7.2 Beskyttelsestiltak

Hvis en kombinasjon av desinfeksjon før og etter melking er nødvendig, må du vurdere å bruke et annet produkt som ikke inneholder jod for desinfeksjon før melking.

4.7.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se den generelle bruksanvisningen.

4.7.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se den generelle bruksanvisningen.

4.7.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se den generelle bruksanvisningen.

5. Generell bruksanvisning for meta SPC

5.1. Bruksanvisning

Se den bruksspesifikke bruksanvisningen.

5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Se bruksspesifikke risikoreduseringstiltak.

5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding: Tilfør frisk luft; rådfør deg med lege dersom symptomer forekommer.

Etter hudkontakt: Vask med vann og såpe.

Etter øyekontakt: Skyll med åpne øyne i flere minutter under rennende vann. Kontakt deretter lege.

Etter svelging: Skyll munnen, og drikk deretter rikelig med vann. Oppsøk legehjelp umiddelbart.

Stabilitet og reaktivitet

Mulighet for farlige reaksjoner: Reaksjon med oksiderings- og reduksjonsmiddel.

Forhold som skal unngås: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

Uforenlige materialer: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

Farlige nedbrytningsprodukter: jod (under oppvarming).

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Ingen spesialtiltak kreves.

Miljømessige forholdsregler: Større mengder av produktet må ikke slippes ut i kloakksystemer eller vannmasser.

Metoder og materialer for oppdemming og opprensing: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagmugg). Avhend innsamlet materiale i henhold til forskriftene.

5.4. Avfallshåndtering

Nevnt i sikkerhetsdatabladet

Metoder for avfallsdeponering

Anbefaling: Må spesialbehandles i samsvar med offentlige forskrifter.

Nøkkelnnummer for avfallsdeponering: Samsvarende med forskriften til Den europeiske avfallslisten, må relasjonen til avfallsets nøkkelnnumre gjøres spesifikk for industri og prosess.

Den europeiske avfallslisten: Samsvarende med forskriften til EAL må relasjonen til avfallsets nøkkelnnumre gjøres spesifikk for industri og prosess.

På slutten av behandlingen må du avhende emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav. Brukt produkt kan spyles til den kommunale kloakken eller kastes i gjødseloppbevaringen, avhengig av lokale krav. Unngå utslipp til et individuelt renseanlegg for avløpsvann.

Anbefalt rensemiddel: Vann, evt. vaskemiddel om nødvendig.

5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet: 24 måneder

Produkter må beskyttes mot frost, oppbevares ved en temperaturer under 30 °C og skjermes fra direkte sollys.

6. Annen informasjon

Ikke relevant

7. Tredje informasjonsnivå: individuelle produkter i meta SPC/ innen meta SPC

7.1 Handelsnavn, godkjeningsnummer og spesifikk sammensetning for hvert enkelt produkt

7.1 Handelsnavn, godkjenningsnummer og spesifikk sammensetning for hvert enkelt produkt

Handelsnavn	calgodip D 3000	Markedsområde: EU
	Jod-Dip S 30	Markedsområde: EU
	Bestfarm Dip Premium	Markedsområde: EU
	Jod 30 Universal (Iwetec)	Markedsområde: EU
	Jod-Dipp 30 (Technolit)	Markedsområde: EU
	Dip es SF 3000	Markedsområde: EU
	Lerapur Jod SP 30	Markedsområde: EU
Godkjenningsnummer	NO-0019970-0011 1-9	

(R4BP 3-asset _referansenummer - Nasjonal godkjenning)

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Iodine		Aktivt stoff	7553-56-2	231-442-4	0,34
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivt stoff	25655-41-8		0
eddiksyre	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,26

