

Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda

Naziv skupine: SOPUROXID

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Broj odobrenja: EU_0026179-0000

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): EU-0026179-0000

Sadržaj

I. dio - Prva razina informacija	1
1. Administrativne informacije	1
2. Sastav i formulacija skupine biocidnih proizvoda	3
II. dio - Druga razina informacija - meta sažetak(ci) svojstava biocidnog proizvoda (SPC)	3
1. Administrativni podatci - Meta SPC1	4
2. Sastav u meta SPC-u	4
3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u	4
4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u	6
5. Opće upute za korištenje meta SPC-a	51
6. Ostale informacije	53
7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u	53
1. Administrativni podatci - Meta SPC2	55
2. Sastav u meta SPC-u	55
3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u	56
4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u	57
5. Opće upute za korištenje meta SPC-a	65
6. Ostale informacije	67
7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u	67
1. Administrativni podatci - Meta SPC3	68
2. Sastav u meta SPC-u	69
3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u	69
4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u	70
5. Opće upute za korištenje meta SPC-a	87
6. Ostale informacije	89
7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u	89
1. Administrativni podatci - Meta SPC4	90
2. Sastav u meta SPC-u	90
3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u	91

4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u	92
5. Opće upute za korištenje meta SPC-a	138
6. Ostale informacije	140
7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u	140

I. dio - Prva razina informacija

1. Administrativne informacije

1.1. Naziv skupine

SOPUROXID

1.2. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

1.3. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja

Naziv

SOPURA

Adresa

rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgija

Broj odobrenja

EU_0026179-0000

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)

EU-0026179-0000

Datum odobrenja

12/07/2022

Datum isteka odobrenja

30/06/2032

1.4. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača

SOPURA

Adresa proizvođača

rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgija

Lokacija proizvodnih pogona

rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgija

Naziv proizvođača

SOPURA QUIMICA

Adresa proizvođača

Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Španjolska

Lokacija proizvodnih pogona

Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Španjolska

Naziv proizvođača

HYPRED SAS (KERSIA Group)

Adresa proizvođača

55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Francuska

Lokacija proizvodnih pogona

55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Francuska

Niepruszewo, ul. Kasztanowa 64-320 Buk Poljska

1.5. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar

1340 - Peroctena kiselina

Naziv proizvođača

SOPURA

Adresa proizvođača

rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgija

Lokacija proizvodnih pogona

rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgija

Aktivna tvar	1340 - Peroctena kiselina
Naziv proizvođača	SOPURA QUIMICA
Adresa proizvođača	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Španjolska
Aktivna tvar	1340 - Peroctena kiselina
Naziv proizvođača	HYPRED SAS (KERSIA Group)
Adresa proizvođača	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Francuska
	Niepruszewo, ul. Kasztanowa 64-320 Buk Poljska

2. Sastav i formulacija skupine biocidnih proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Peroctena kiselina		Aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	3,2 - 15
Sumporna kiselina		Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	0,2 - 24,04
Vodikov peroksid		Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	16,5 - 23,5
Octena kiselina		Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	5,5 - 16,7

2.2. Vrsta(e) formulacija

SL -topivi koncentrat

II. dio - Druga razina informacija - meta sažetak(ci) svojstava biocidnog proizvoda (SPC)

1. Administrativni podatci

1.1. identifikator u meta SPC-u

Meta SPC1

1.2. Dodatak broju autorizacije

1-1

1.3 Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

2. Sastav u meta SPC-u

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu u meta SPC-u

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Peroctena kiselina		Aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	5 - 5
Sumporna kiselina		Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	0,2 - 24,04
Vodikov peroksid		Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	16,5 - 22
Octena kiselina		Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	5,5 - 9,55

2.2. Vrsta(e) formulacija u meta SPC-u

Formulacija(e)

SL -topivi koncentrat

3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u

Oznaka upozorenja

Oznake obavijesti

Može pojačati požar; oksidans.

Može nagrizati metale.

Štetno ako se proguta.Štetno u dodiru s kožom.Štetno ako se udiše.

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Uzrokuje teške ozljede oka.

Može nadražiti dišni sustav.

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

Nositi zaštitne rukavice.

Nositi zaštitu za oči.

Nositi zaštitu za lice.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu vodom.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim .

Izbjegavati udisanje pare.

Nakon uporabe temeljito oprati ruke

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi informacije na ovoj naljepnici).

Isprati usta.

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.

AKO SE PROGUTA:U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

AKO SE PROGUTA:Isprati usta.NE izazivati povraćanje.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:Oprati velikom količinom vode.

AKO SE UDIŠE:Premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.I oprati je prije ponovne uporabe.

Skladištiti pod ključem.

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odložiti sadržaj u/na u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

Nositi zaštitno odijelo.
Odložiti spremnik u/na u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.
Održavati hladnim.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Sakupiti proliveno/rasuto.
U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu tuširanjem.
Ne udisati pare.
Ne udisati aerosol.
Izbjegavati udisanje aerosola.

4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Dezinfekcija površina u industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima - ručno tretiranje (čišćenje metlom s resicama)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima : Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina ručnim tretiranjem (pranje metlom s resicama) uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: Ručno tretiranje (čišćenje metlom s resicama). Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod primjenjuje se čišćenjem metlom s resicama pomoću prikladnog alata (npr. ravnim metlama s resicama ili krpama za čišćenje). Nakon nanošenja razrijeđeni proizvod se ocijedi.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: zdravstvenim nemedicinskim područjima S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 5 min. Količina primjene: 20 ml/m ² Ne koristiti u ZDRAVSTVU S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,96 % tj.

	960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Količina primjene: 30 ml/m ² Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Predmeti koje treba dezinficirati pranjem metlom s resicama moraju ostati dovoljno mokri tijekom potrebnog kontaktnog vremena kako bi se omogućila optimalna dezinfekcija.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 20 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Ponovni ulazak dopušten je samo kada koncentracije peroctene kiseline i vodikovog peroksida u zraku padnu ispod odgovarajućih referentnih vrijednosti (AEC). Nakon nanošenja, prostoriju je potrebno prozračiti, poželjno mehaničkom ventilacijom. Trajanje razdoblja ventilacije mora se utvrditi mjerenjem prikladnom mjernom opremom (naveo nositelj odobrenja).

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Dezinfekcija površina u industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima - ručno tretiranje (prskanje)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima : Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina ručnim tretiranjem (prskanjem) uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: Ručno tretiranje (prskanje)

Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod primjenjuje se raspršivanjem pomoću male kantice za prskanje

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: -

Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: zdravstvenim nemedicinskim područjima S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) pri sobnoj

	<p>temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 5 min. Količina primjene: 20 ml/m². Ne koristiti u ZDRAVSTVU S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Količina primjene: 30 ml/m². Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
Kategorije korisnika	<p>industrijski profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.</p>

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja.

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Čišćenje na mjestu (CIP) u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina postupcima čišćenja na mjestu (CIP) (s kruženjem) uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: Postupkom čišćenja na mjestu (CIP) Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod automatski kruži iz spremnika zadržavanja čišćenjem na mjestu (CIP) kroz zatvoreni cjevovod i instalacije. Nakon postupka dezinfekcije, posude (cjevovod i spremnici) se isušuju i ispiru vodom u uvjetima zatvorenog sustava.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,032 % peroctene kiseline

	(razrjeđivanje proizvoda 0,64 % tj. 640 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C up do sobne temperature. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Dezinfekcija površina u staklenicama prskanjem koje provodi korisnik u osobnom ograđenom prostoru (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U staklenicama: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina prskanjem

Načini primjene

Metoda: otvoreni sustav: sprejanje

Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod automatski se nanosi u svim smjerovima uređajem za prskanje
Korisnik je prisutan, sjedi u osobnom ograđenom prostoru / u zatvorenoj kabini (npr. traktor opremljen uređajem za prskanje/pjenjenje)

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m²

Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.

Broj i vremenski raspored primjene:

/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obavezna je tijekom faze miješanja i punjenja te nanošenja. Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje bi se trebalo provoditi samo s korisnikom u osobnom ograđenom prostoru i bez prisutnosti ijedne druge osobe. Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Dezinfekcija površina u staklenicima prskanjem koje provodi korisnik bez osobnog ograđenog prostora (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U staklenicima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina prskanjem
Načini primjene	Metoda: otvoreni sustav: sprejanje Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod automatski se nanosi u svim smjerovima uređajem za prskanje.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m ² Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 40 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neclijne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - Dezinfekcija poljoprivredne i hortikulture opreme umakanjem (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U poljoprivrednim/hortikulturnim područjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme (malih dijelova, kao što su oprema, rezervni dijelovi, alati, ventili, crijeva...) uranjanjem u kupke za namakanje uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: otvoreni sustav: namakanje

Detaljan opis:

Koncentrirani proizvod pumpa se u kupku za namakanje i razrjeđuje do željene koncentracije za uporabu, prije uranjanja predmeta koje treba dezinficirati

**Broj i vremenski raspored
primjena**

Stopa primjene: -

Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.

Broj i vremenski raspored primjene:

/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

**Veličine pakiranja i ambalažni
materijal**

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):

Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.6.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.6.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze poslije nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

4.6.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.6.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.6.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - Dezinfekcija površina i poljoprivredne/hortikulture opreme prskanjem (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

Načini primjene	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>U poljoprivrednim/hortikulturnim područjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje</p> <p>Metoda: otvoreni sustav: sprejanje Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod ručno se raspršuje na površine/opremu opremom za prskanje. Prskanje se primjenjuje samo prema dolje i u vodoravnom smjeru.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m² Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
Kategorije korisnika	<p>industrijski</p> <p>profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.</p>

4.7.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 20 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja.

4.7.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8 Opis uporabe

Uporaba 8 - Dezinfekcija površina i poljoprivredne/hortikulture opreme automatskim prskanjem (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U poljoprivrednim/hortikulturenim područjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: prskanje

Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod nanosi se prskanjem automatski

Prskanje se primjenjuje samo prema dolje i u vodoravnom smjeru.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: -

Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline

(razrijeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min

	Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.8.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obavezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje je automatsko i treba se provoditi samo ako na tretiranom području nije nitko prisutan.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja.

4.8.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.9 Opis uporabe

Uporaba 9 - Dezinfekcija površina i poljoprivredne/hortikulturne opreme automatskim prskanjem (zatvorena prostorija) (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: yeast
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U poljoprivrednim/hortikulturnim područjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: Prskanjem.
Detaljan opis:
Razrijeđeni proizvod nanosi se automatski bez prisutnosti operatora

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: -
Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski
profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći)

proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.9.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.9.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje je automatsko i treba se provoditi samo ako na tretiranom području nije nitko prisutan.

Ispitati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja.

4.9.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.9.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.9.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.10 Opis uporabe

Uporaba 10 - Dezinfekcija životinjske nastambe niskotlačnim prskanjem koje provodi korisnik u osobnom ograđenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U životinjskoj nastambi: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: prskanje
Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod automatski se nanosi u svim pravcima niskotlačnim ručnim prskanjem pomoću uređaja za prskanje
Korisnik je prisutan, sjedi u osobnom ograđenom prostoru / u zatvorenoj kabini (npr. traktor opremljen uređajem za prskanje/pjenjenje)

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Između 20 i 300 ml/m²
Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija, kvasaca i virusa: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.10.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mora se osigurati da životinje nisu prisutne tijekom tretiranja.

4.10.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze miješanja i punjenja te nanošenja. Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje bi se trebalo provoditi samo s korisnikom u osobnom ograđenom prostoru i bez prisutnosti ijedne druge osobe.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Tretiranje se provodi samo ako su nastambe za životinje prazne. Ponovni ulazak životinja samo nakon odgovarajuće ventilacije i kada se površine osuše.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.10.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.10.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.10.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.11 Opis uporabe

Uporaba 11 - Dezinfekcija nastambe za živali niskotlačnim ručnim prskanjem koju provodi korisnik bez osobnog ograđenog prostora

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U životinjskoj nastambi : Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina prskanjem uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: otvoreni sustav: sprejanje Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod automatski se nanosi u svim smjerovima niskotlačnim automatskim prskanjem pomoću uređaja za prskanje
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Između 20 i 300 ml/m ² Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija, kvasaca i virusa: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.11.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mora se osigurati da životinje nisu prisutne tijekom tretiranja.

4.11.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 40 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Tretiranje se provodi samo ako su nastambe za životinje prazne. Ponovni ulazak životinja samo nakon odgovarajuće ventilacije i kada se površine osuše.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.11.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.11.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.11.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.12 Opis uporabe

Uporaba 12 - Dezinfekcija čizama u kadama za dezinfekciju obuće u životinjskim nastambama/uzgajalištima

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru u životinjskim nastambama/uzgajalištima: Dezinfekcija čizama uranjanjem (ne prolaženjem) uz prethodno čišćenje.
Načini primjene	Metoda: Uranjanje Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod stavlja se u kadu za dezinfekciju obuće Ispiranje nije potrebno
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija, kvasaca i virusa: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.12.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.12.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze poslije nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.12.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Bez uputa o uporabi: pogledati poglavlje o općim uputama o uporabi

4.12.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Bez uputa o uporabi: pogledati poglavlje o općim uputama o uporabi

4.12.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Bez uputa o uporabi: pogledati poglavlje o općim uputama o uporabi

4.13 Opis uporabe

Uporaba 13 - Dezinfekcija opreme uranjanjem

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme (malih dijelova, kao što su oprema, rezervni dijelovi, alati, ventili, crijeva...) uranjanjem u kupku za namakanje uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: Umakanje.
Detaljan opis:

Koncentrirani proizvod pumpa se u kupku za namakanje i razrjeđuje do željene koncentracije za uporabu, prije uranjanja predmeta koje treba dezinficirati

**Broj i vremenski raspored
primjena**

Stopa primjene: -
Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija, kvasaca i virusa: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

**Veličine pakiranja i ambalažni
materijal**

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.13.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.13.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :
Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .
Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.
Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze nanošenja.
Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze poslije nanošenja.
Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.
Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja

4.13.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.13.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.13.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.14 Opis uporabe

Uporaba 14 - Dezinfekcija aseptičnih linija za punjenje (krunski čepovi, kalupi za sir i sanduci za hranu) - Zatvoreni sustavi za automatsko prskanje

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria

Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industriji hrane i pića: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: prskanje
Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod raspršuje se na površine automatski bez prisutnosti operatora

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: -
Razrjeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski
profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.14.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.14.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje je automatsko i treba se provoditi samo ako na tretiranom području nije nitko prisutan.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja

Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja.

4.14.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.14.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.14.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.15 Opis uporabe

Uporaba 15 - Dezinfekcija opreme u industriji hrane i pića uranjanjem

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industriji hrane i pića: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina (malih dijelova, kao što su oprema, rezervni dijelovi, alati, ventili, crijeva...) uranjanjem u kupke za namakanje uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: Umakanje.
Detaljan opis:

Koncentrirani proizvod pumpa se u kupku za namakanje i razrjeđuje do željene koncentracije za uporabu, prije uranjanja predmeta koje treba dezinficirati

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: -
Razrjeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi.

Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.15.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.15.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze poslije nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.15.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.15.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.15.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.16 Opis uporabe

Uporaba 16 - Dezinfekcija izmjenjivača topline i iona, membranskih filtara i stakla te PET boca – Postupci čišćenja na mjestu (CIP)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakteriofagi Stadij razvoja: nema podataka</p>
Područje primjene	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>U industriji hrane i pića: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina postupcima čišćenja na mjestu (CIP) (s kruženjem) uz prethodno čišćenje</p>
Načini primjene	<p>Metoda: zatvoreni sustav Detaljan opis:</p> <p>Razrijeđeni proizvod automatski kruži iz spremnika zadržavanja čišćenjem na mjestu (CIP) kroz zatvoreni cjevovod i instalacije. Nakon postupka dezinfekcije, posude (cjevovod i spremnici) se isušuju i ispiru vodom u uvjetima zatvorenog sustava.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: - Razrijeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi. Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
Kategorije korisnika	<p>industrijski</p> <p>profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce</p>

od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.16.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.16.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja

4.16.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.16.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.16.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.17 Opis uporabe

Uporaba 17 - Dezinfekcija površina i opreme niskotlačnim prskanjem – prskanje u osobnom ograđenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

-

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: prskanje
Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod automatski se primjenjuje u svim smjerovima niskotlačnim prskanjem pomoću uređaja za prskanje
Korisnik je prisutan, sjedi u osobnom ograđenom prostoru / u zatvorenoj kabini (npr. traktor opremljen uređajem za prskanje/penjenje).

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m²
Razrijeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi.

Broj i vremenski raspored primjene:

/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce

od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.17.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.17.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze miješanja i punjenja te nanošenja. Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje bi se trebalo provoditi samo s korisnikom u osobnom ograđenom prostoru i bez prisutnosti ijedne druge osobe.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja.

4.17.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.17.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.17.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.18 Opis uporabe

Uporaba 18 - Dezinfekcija površina i opreme niskotlačnim prskanjem – prskanje bez osobnog ograđenog prostora

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakteriofagi Stadij razvoja: nema podataka</p>
Područje primjene	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje</p>
Načini primjene	<p>Metoda: prskanje Detaljan opis:</p> <p>Razrijeđeni proizvod automatski se primjenjuje u svim smjerovima niskotlačnim prskanjem pomoću uređaja za prskanje.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m² Razrijeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi. Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
Kategorije korisnika	<p>industrijski</p> <p>profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.</p>



4.18.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.18.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 40 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja

Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja.

4.18.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.18.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.18.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.19 Opis uporabe

Uporaba 19 - Dezinfekcija površina i opreme niskotlačnim prskanjem, ručno

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakteriofagi Stadij razvoja: nema podataka</p>
Područje primjene	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje</p>
Načini primjene	<p>Metoda: Ručno nanošenje – prskanje. Detaljan opis:</p> <p>Razrijeđeni proizvod ručno se nanosi niskotlačnim prskanjem, samo prema dolje i vodoravno.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m² Razrijeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi. Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
Kategorije korisnika	<p>industrijski</p> <p>profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce</p>

od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.19.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.19.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 20 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Ispirati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja.

4.19.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.19.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.19.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.20 Opis uporabe

Uporaba 20 - Dezinfekcija površina i opreme niskotlačnim prskanjem, automatsko

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakteriofagi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod nanosi se na opremu, na transportnu traku, automatski. Korisnik je prisutan, sjedi u osobnom ograđenom prostoru / u zatvorenoj kabini (npr. traktor opremljen uređajem za prskanje/pjenjenje). Prskanje se primjenjuje samo prema dolje i u vodoravnom smjeru.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m ² Razrijeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.20.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.20.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obavezna je tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitna oprema za dišne putove nije obavezna tijekom faze nanošenja, pod uvjetom da operator ostaje u kontrolnoj sobi i ne ulazi u tretirano područje.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i nećiljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje je automatsko i treba se provoditi samo ako na tretiranom području nije nitko prisutan.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja.

4.20.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Bez uputa o uporabi: pogledati poglavlje o općim uputama o uporabi

4.20.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Bez uputa o uporabi: pogledati poglavlje o općim uputama o uporabi

4.20.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Bez uputa o uporabi: pogledati poglavlje o općim uputama o uporabi

4.21 Opis uporabe

Uporaba 21 - Dezinfekcija površina i opreme niskotlačnim prskanjem – automatsko prskanje (zatvorena prostorija)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: prskanje
Detaljan opis:

Razrijeđena otopina raspršuje se na površine automatski bez prisutnosti korisnika.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m²
Razrjeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi.

	Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.21.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.21.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obavezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove nije obavezna tijekom faze nanošenja, pod uvjetom da operator ne ulazi u tretirano područje i ostaje u kontrolnoj sobi.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja.

4.21.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.21.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.21.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.22 Opis uporabe

Uporaba 22 - Dezinfekcija unutarnjih površina (cjevovoda, spremnika, posuda...) čišćenjem na mjestu (CIP)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina postupcima čišćenja na mjestu (CIP) (s kruženjem) uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: zatvoreni sustav
Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod automatski kruži iz spremnika zadržavanja čišćenjem na mjestu (CIP) kroz zatvoreni cjevovod i instalacije.
Nakon postupka dezinfekcije, posude (cjevovod i spremnici) se isušuju i ispiru vodom u uvjetima zatvorenog sustava.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: -
Razrjeđivanje (%) : - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,96 % tj. 960 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 1,28 % tj. 1280 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski
profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.22.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.22.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**Zaštita kože :**

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

4.22.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.22.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.22.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.23 Opis uporabe

Uporaba 23 - Dezinfekcija vode korištene za ispiranje recikliranih predmeta tijekom postupka pranja

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U industriji hrane: Dezinfekcija vode (u čistim uvjetima) korištena za ispiranje recikliranih predmeta = voda kvalitete pitke vode kratko se čuva u spremnicima do upotrebe za ispiranje predmeta, kao što su boce. Vodu bi trebalo dezinficirati kako bi se izbjeglo ponovno onečišćenje i u određenoj mjeri kako bi se izbjeglo unakrsno onečišćenje unutarnjih površina boca
Načini primjene	Metoda: zatvoreni sustav Detaljan opis: Koncentrirani proizvod pumpa se u rezervoar iz kojeg se kontinuirano dozira u vodeni tok. Razrjeđivanje proizvoda do predviđene koncentracije za uporabu događa se u vodenom toku. Ova je primjena zatvoreni automatizirani postupak.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,008 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,16 % tj. 160 ml/100 l) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom

	vremenu u trajanju od 15 min. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.23.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.23.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: Nije obvezno.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

4.23.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.23.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.23.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

5. Opće upute za korištenje meta SPC-a

5.1. Upute za uporabu

1. Sve površine koje treba dezinficirati moraju biti očišćene prije postupka dezinfekcije
2. Ciklus dezinfekcije :

- Prije uporabe, proizvodi se moraju razrijediti u pitkoj vodi.
- Brzina razrjeđivanja i kontaktno vrijeme ovise o dotičnoj uporabi. Pogledati opis metode primjene koja se odnosi na svaku uporabu.
- Završno ispiranje (pitkom vodom) je obvezno: nakon postupka dezinfekcije, tretirane površine ispiru se vodom i voda se odvodi u kanalizacijski sustav. Za iznimku, pogledati opis metode primjene koja se odnosi na svaku uporabu.

Samo za uporabu u područjima koja su nedostupna široj javnosti i kućnim ljubimcima.
Nema pristupa široke javnosti tijekom tretiranja.

· Postupci dezinfekcije čišćenjem na mjestu (CIP) - Faza završnog ispiranja (pitkom vodom).
Nakon postupka dezinfekcije, posude prilikom čišćenja na mjestu (CIP) (cjevovodi i spremnici) isušuju se i ispiru vodom u uvjetima zatvorenog sustava

· Postupci dezinfekcije uranjanjem : Kupka nije namijenjena za ponovnu uporabu. Koristiti kupku samo jedanput dnevno nakon rada i svakodnevno je zamijeniti svježom otopinom.

· Postupci dezinfekcije prskanjem : površine koje treba dezinficirati moraju biti dovoljno mokre kako bi ostale mokre tijekom potrebnog kontaktnog vremena za optimalnu dezinfekciju. Tada bi korisnik trebao obratiti pozornost na mokre površine u potpunosti s otopinom dezinficijensa.
Količina primjene za prskanje razrijeđenog proizvoda mora biti između 20 i 30 ml/m²

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Zaštita kože:

Tijekom rukovanja proizvodom koristiti zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica nositelj odobrenja treba navesti u okviru informacijama o proizvodu).
Potrebno je nositi zaštitno odijelo koji je nepropusan za biocidne proizvode (nositelj odobrenja mora naznačiti materijal zaštitnog odijela u sklopu informacija o proizvodu).

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Indirektni učinci

Dva teorijska proizvoda su oksidirajuća i reaktivna sredstva. U slučaju termičke razgradnje para i kisik će se osloboditi kao proizvodi raspadanja. Oslobođanjem kisika može se podržati izgaranje.

Također, kontakt s nečistoćama, katalizatorima raspadanja, metalnim solima, lužinama, redukcijskim sredstvima može dovesti do samoubrzavajuće egzotermne razgradnje i stvaranja kisika.

U slučaju raspadanja proizvoda u ograničenim prostorima i cijevima, postoji rizik od prekomjernog pritiska i pucanja.

Mjere prve pomoći

Ø Opći savjet

Napustiti opasno područje.

Voditi računa o svojoj osobnoj sigurnosti.

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.

Ø Udisanje

Premjestiti unesrećene osobe na svježiji zrak.

Moguća tegoba: nadražuje kožu i sluznicu oka te dišne putove i uzrokuje kašalj.

Ako se pojave poteškoće s disanjem (npr. jaki kontinuirani kašalj): postaviti unesrećenog u polusjedeći položaj s podignutim gornjim dijelom tijela; utopiti ga i premjestiti na mirno mjesto; odmah pozvati liječnika.

Ø Dodir s kožom

Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode.

Obratiti se liječniku.

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.

Odmah isprati vodom zagađenu ili zasićenu odjeću.

Ø Dodir s očima

Držati kapke unesrećenog razmaknutima i odmah temeljito ispirati dovoljnom količinom vode najmanje 10 minuta.

Zaštititi neozlijeđeno oko.

Nastaviti ispirati otopinom za ispiranje očiju.

Pozvati hitnu pomoć (opeklina očiju izazvana kaustičnim sredstvom)

Neposredna daljnja obrada na očnom odjelu bolnice / u oftalmološkoj ordinaciji.

Nastaviti ispirati oko do dolaska na očni odjel bolnice.

Ø Gutanje

Ne izazivati povraćanje.

Opasnost od prodiranja u pluća (opasnost za disanje) ako se proguta ili pri povraćanju zbog pojave plinova i stvaranja pjene.

Samo kada je unesrećeni potpuno pri svijesti: isprati usta vodom; dati unesrećenom piti dovoljno vode u malim gutljajima; utopiti unesrećenog i umiriti ga.

Odmah obavijestiti hitnu pomoć (ključna riječ: opeklina izazvana kiselinom).

Ø Bilješke za liječnika

Terapija kao kod kemijske opeklinae.

Nakon udisanja:

Stvaranje toksičnog edema pluća moguće je ako se proizvod i dalje udiše unatoč akutnom nadražujućem učinku (npr. ako nije moguće napustiti opasno područje).

Profilaksa toksičnog edema pluća s inhalacijskim steroidima (sprej za doziranje, npr. auksiloson).

Ako se tvar proguta:

Opasnost od aspiracije.

Rizik od plinovitih embolija.

U slučaju pretjeranog napreznja želuca zbog stvaranja plinova, umetnuti sifonsku cijev.

Rana endoskopija radi procjene lezija sluznica u jednjaku i želucu koje se mogu pojaviti.

Po potrebi, usisati ostatke tvari.

Ne davati aktivni ugljen jer postoji opasnost od ispuštanja velikih količina plina iz vodikovog peroksida.

Mjere u slučaju izvanredne situacije za zaštitu okoliša

Pridržavati se propisa o sprečavanju onečišćenja vode (sakupiti, navlažiti, pokriti).

Ne dopustiti ispuštanje u vodene tokove, površinske vode ili u tlo.

Ø Metode čišćenja

Temeljito očistiti zagađenu površinu; preporučljivo sredstvo za čišćenje je voda.

U slučaju malih prolijevanja/rasipanja, razrijediti proizvod s puno vode i isprati ga ili apsorbirati materijalom koji veže tekućinu, npr. kemijska sorpcija, dijatomejska zemlja, univerzalno vezivo. Ne koristiti tekstil, piljevinu, zapaljive tvari. Nakon vezivanja mehanički pokupiti i odložiti u prikladne spremnike. Odložiti apsorbirani materijal u skladu s propisima.

Ø Dodatni savjet

Učiniti sigurnima ili ukloniti sve izvore paljenja.

Odmah izolirati oštećene spremnike, ako je moguće i sigurno.

Isključiti istjecanje, ako je moguće i sigurno.

Staviti neispravne spremnike u posudu za otpad (posudu za otpadnu ambalažu) izrađenu od plastike (ne od metala).

Ne zatvarati hermetički oštećene spremnike ili posude za otpad (opasnost od pucanja zbog raspadanja proizvoda).

Izvađeni proizvod ne bi trebalo vraćati u spremnik.

Nikada ne vraćati proliveni/rasuti proizvod u originalno pakiranje radi ponovne uporabe (opasnost od raspadanja).

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, u vodene tokove (sudoper, zahod...) niti u kanalizaciju

Odlagati neiskorišteni proizvod, ambalažu te svaki drugi otpad u skladu s lokalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati samo u originalnoj ambalaži koja je hermetički zatvorena na hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati proizvod podalje od izravnog sunčevog svjetla, izvora topline i paljenja.
Rok trajanja proizvoda je 6 mjeseci.

Proizvode je potrebno skladištiti pri temperaturama ispod +30 °C.

6. Ostale informacije

Referentne vrijednosti peroctene kiseline i vodikovog peroksida korištene za procjenu rizika:

Peroctena kiselina : Koncentracija prihvatljive razine izloženosti udisanjem = 0,5 mg/m³

Vodikov peroksid : Koncentracija prihvatljive razine izloženosti udisanjem = 1,25 mg/m³

7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u

7.1 Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

SOPUROXID 5	područje prodaje: EU
HyPro Biocide 5-22	područje prodaje: EU
AGRIOXID 5	područje prodaje: EU
TECMA CUAR HPA	područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0026179-0001 1-1

(Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) - Nacionalno odobrenje)

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Peroctena kiselina		Aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	5
Sumporna kiselina		Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	0,2
Vodikov peroksid		Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	22
Octena kiselina		Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	9,55

Trgovački naziv

SOPUROXID 5C	područje prodaje: EU
DEPTIL TR 5	područje prodaje: EU
DIS OXI-5+	područje prodaje: EU
ANTI-GERM DES OXI-50 TC	područje prodaje: EU
Peracid ATR +	područje prodaje: EU
FOR-Acid TR +	područje prodaje: EU
X-CID TR 50 +	područje prodaje: EU
EU-0026179-0002 1-1	

Broj odobrenja

(Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) - Nacionalno odobrenje)

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Peroctena kiselina		Aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	5

Sumporna kiselina	Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	24,04
Vodikov peroksid	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	16,5
Octena kiselina	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	5,8

1. Administrativni podatci

1.1. identifikator u meta SPC-u

Meta SPC2

1.2. Dodatak broju autorizacije

1-2

1.3 Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. Sastav u meta SPC-u

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu u meta SPC-u

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Peroctena kiselina		Aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	3,2 - 3,2
Sumporna kiselina		Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	0,8 - 1
Vodikov peroksid		Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	23,5 - 23,5
Octena kiselina		Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	6,45 - 7,5

2.2. Vrsta(e) formulacija u meta SPC-u

Formulacija(e)

SL -topivi koncentrat

3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u

Oznaka upozorenja

Može pojačati požar; oksidans.
Može nagrizati metale.
Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
Uzrokuje teške ozljede oka.
Može nadražiti dišni sustav.
Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Štetno u dodiru s kožom.
Štetno ako se proguta.

Oznake obavijesti

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
Nositi zaštitu za lice.
U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu vodom.
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Nositi zaštitu za oči.
Nositi zaštitne rukavice.
Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim .
Izbjegavati udisanje pare.
Nakon uporabe temeljito oprati ruke
Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi informacije na ovoj naljepnici).
Isprati usta.
Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
AKO SE PROGUTA:U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
AKO SE PROGUTA:Isprati usta.NE izazivati povraćanje.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode.

AKO SE UDIŠE: Premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

Skinuti zagađenu odjeću. I oprati je prije ponovne uporabe.

Skladištiti pod ključem.

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odložiti sadržaj u/na u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

Nositi zaštitno odijelo.

Odložiti spremnik u/na u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

Održavati hladnim.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Sakupiti proliveno/rasuto.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu tuširanjem.

Ne udisati pare.

Izbjegavati udisanje aerosola.

Ne udisati aerosol.

4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Dezinfekcija prostora zamagljivanjem - U industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima (farmaceutska i kozmetička industrija)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene	u zatvorenom prostoru U industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima : Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina zamagljivanjem.
Načini primjene	Metoda: zamagljivanje Detaljan opis: Zamagljivanjem razrijeđenim proizvodom
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): Aktivno protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 5,6 ml/m ³ (razrjeđivanje proizvoda 40 % tj. 40 l/100 l tj. 1,28 % peroctene kiseline) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 2 sata (nakon difuzije) Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Dezinfekcija prostora zamagljivanjem - U poljoprivrednim i hortikulturnim područjima (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U poljoprivrednim/hortikulturnim područjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina zamagljivanjem uz prethodno čišćenje.

Načini primjene

Metoda: zamagljivanje
Detaljan opis:
Zamagljivanjem razrijeđenim proizvodom

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: -
Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 5,6 ml/m³ (razrjeđivanje proizvoda 40 % tj. 40 l/100 l tj. 1,28 % peroctene kiseline) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 2 sata (nakon difuzije)
Broj i vremenski raspored primjene:

	/
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Dezinfekcija prostora zamagljivanjem – U životinjskoj nastambi

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U životinjskoj nastambi : Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina zamagljivanjem uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: zamagljivanje Detaljan opis: Zamagljivanjem razrijeđenim proizvodom
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 5,6 ml/m ³ (razrjeđivanje proizvoda 40 % tj. 40 l/100 l tj. 1,28 % peroctene kiseline) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 2 sata (nakon difuzije) Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.



4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja.

Tretiranje se provodi samo ako su nastambe za životinje prazne. Ponovni ulazak životinja samo nakon odgovarajuće ventilacije i kada se površine osuše.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Dezinfekcija prostora zamagljivanjem – U prostorima za skladištenje s posebnim uređajem u skladišnom podrumu ili prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Na područjima hrane/hrane za životinje (skladišni prostori): Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina zamagljivanjem.
Načini primjene	Metoda: zamagljivanje Detaljan opis: Zamagljivanjem razrijeđenim proizvodom
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): Aktivno protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca S 5,6 ml/m ³ (razrjeđivanje proizvoda 40 % tj. 40 l/100 l tj. 1,28 % peroctene kiseline) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 2 sata (nakon difuzije) Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.



4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

5. Opće upute za korištenje meta SPC-a

5.1. Upute za uporabu

1. Sve površine koje treba dezinficirati moraju biti očišćene prije postupka dezinfekcije. Za iznimk, pogledati opis metode primjene koja se odnosi na svaku uporabu.

2. Ciklus dezinfekcije :

- Prije uporabe, proizvodi se moraju razrijediti u pitkoj vodi.
- Brzina razrjeđivanja i kontaktno vrijeme ovise o dotičnoj uporabi. Pogledati opis metode primjene koja se odnosi na svaku uporabu.
- Završno ispiranje (pitkom vodom) je obvezno: nakon postupka dezinfekcije, tretirane površine ispiru se vodom i voda se odvodi u kanalizacijski sustav. Za iznimk, pogledati opis metode primjene koja se odnosi na svaku uporabu.

Meta SPC2 : Postupci dezinfekcije **zamagljivanjem**

Proizvod **SOPUROXID 3.2** tekuće je dezinfekcijsko sredstvo koje se nanosi (nakon razrjeđivanja 40 %) zamagljivanjem za dezinfekciju površina u zraku i za upotrebu u zatvorenom prostoru samo od strane profesionalnih korisnika. Uvijek provjeriti kompatibilnost proizvoda s tvrdim/neporoznim površinama koje treba dezinficirati.

Proizvod **SOPUROXID 3.2** razvijen je i demonstriran kao djelotvoran (putem studija učinkovitosti izvedenih prema standardu NF T 72 281), koristeći jedan uređaj HYSpray, za prostorije opsega između 30 i 150 m³ (opseg po primjeni i po uređaju) s brzinom protoka od 0,047 ml/min/m³ (opseg po primjeni i po uređaju).

Moguća je uporaba ostalih uređaja. Moraju biti osmišljeni za rad s proizvodima na bazi peroctene kiseline i kako bi se osigurala proizvodnja maglice koja može ostati suspendirana u zraku i pod uvjetom da ti uređaji zadovoljavaju sljedeće karakteristike:

- 1) Veličina čestica (srednja kapljica): između 1 i 15 µm
- 2) Brzina protoka: 0,047 ml/min/m³
- 3) Količina primjene: 5,6 ml/m³
- 4) Opseg prostorije između 30 i 150 m³ po primjeni i po uređaju (tj. vrijeme difuzije između 5 i 30 min)

- Dezinfekciju u zraku trebalo bi provoditi samo nakon temeljitog čišćenja i ispiranja.

Prije postupka dezinfekcije površine koje treba dezinficirati potrebno je osušiti. Obratiti pozornost na otvaranje vrata ormara. Provjeriti temperaturu i relativnu vlažnost u prostoriji (između 40 i 80 %) kako bi se postigla optimalna razina učinkovitosti proizvoda.

- Prostorija u kojoj se odvija zamagljivanje hermetički je zatvorena tijekom zamagljivanja bez prisutnosti korisnika:

Prije početka ciklusa dezinfekcije zamagljivanjem, tretirana prostorija se zatvara. Svi sigurnosni podaci za provedbu dekontaminacije povjereni su korisniku koji je završio potrebnu obuku. Između ostalog, prvi je korak isključivanje jedinica za rukovanje zrakom i zatvaranje ulaza i povratka zraka, tako da se proizvod ne širi u ostalim prostorijama. Vrata ili vrata s vanjske strane područja tada se zaključavaju i, ako spojevi nisu dovoljno čvrsti, zalijepe se trakom za brtvljenje. Poželjno je odabrati narančastu traku ili upadljivu boju kako bi se privukla pozornost i stavlja se znak „Zabrana pristupa, dezinfekcija prostorije u tijeku“. Samo za uporabu u područjima koja su nedostupna široj javnosti i kućnim ljubimcima.

- Korisnik mora uvijek izvršiti mikrobiološku validaciju dezinfekcije u prostorijama koje će se dezinficirati (ili u prikladnoj „standardnoj prostoriji“, ako je primjenjivo) s uređajima koji će se koristiti, nakon čega se može izraditi zapisnik o dezinfekciji ovih prostorija i nakon toga koristiti. Svaki uređaj ili određena instalacija sustavno se provjeravaju kada se postave.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Zaštita kože:

Tijekom rukovanja proizvodom koristiti zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica nositelj odobrenja treba navesti u okviru informacijama o proizvodu).

Potrebno je nositi zaštitno odijelo koji je nepropusan za biocidne proizvode (nositelj odobrenja mora naznačiti materijal zaštitnog odijela u sklopu informacija o proizvodu).

+ Dodatna specifična mjera upravljanja rizikom za primjene zamagljivanjem :

Samo za uporabu u područjima koja su nedostupna široj javnosti i kućnim ljubimcima.

- Nakon primjene proizvoda za dezinfekciju zamagljivanjem i potrebnog kontaktnog vremena za optimalnu dezinfekciju (2 sata), prostorija se mora provjetravati, po mogućnosti mehaničkom ventilacijom najmanje 60 minuta.

Trajanje razdoblja ventilacije mora se utvrditi mjerenjem prikladnom mjernom opremom (naznačuje nositelj odobrenja u podacima o proizvodu).

- Nakon provjetravanja, ponovni ulazak u dezinficirano područje dopušten je tek nakon što se provjere koncentracije peroctene kiseline i vodikovog peroksida u zraku te se vidi da padaju ispod odgovarajućih referentnih vrijednosti (AEC):

- Koncentracija peroctene kiseline u zraku morala je pasti na 0,5 mg/m³.

5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Indirektni učinci

Dva proizvoda su oksidirajuća i reaktivna sredstva. U slučaju termičke razgradnje para i kisik će se osloboditi kao proizvodi raspadanja. Oslobađanjem kisika može se podržati izgaranje.

Također, kontakt s nečistoćama, katalizatorima raspadanja, metalnim solima, lužinama, redukcijskim sredstvima može dovesti do samoubrzavajuće egzotermne razgradnje i stvaranja kisika.

U slučaju raspadanja proizvoda u ograničenim prostorima i cijevima, postoji rizik od prekomjernog pritiska i pucanja.

Mjere prve pomoći

Ø Opći savjet

Napustiti opasno područje.

Voditi računa o svojoj osobnoj sigurnosti.

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.

Ø Udisanje

Premjestiti unesrećene osobe na svjež zrak.

Moguća tegoba: nadražuje kožu i sluznicu oka te dišne putove i uzrokuje kašalj.

Ako se pojave poteškoće s disanjem (npr. jaki kontinuirani kašalj): postaviti unesrećenog u polusjedeći položaj s podignutim gornjim dijelom tijela; utopli ga i premjestiti na mirno mjesto; odmah pozvati liječnika.

Ø Dodir s kožom

Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode.

Obratiti se liječniku.

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.

Odmah isprati vodom zagađenu ili zasićenu odjeću.

Ø Dodir s očima

Držati kapke unesrećenog razmaknutima i odmah temeljito ispirati dovoljnom količinom vode najmanje 10 minuta.

Zaštititi neozlijeđeno oko.

Nastaviti ispirati otopinom za ispiranje očiju.

Pozvati hitnu pomoć (opeklina očiju izazvana kaustičnim sredstvom)

Neposredna daljnja obrada na očnom odjelu bolnice / u oftalmološkoj ordinaciji.

Nastaviti ispirati oko do dolaska na očni odjel bolnice.

Ø Gutanje

Ne izazivati povraćanje.

Opasnost od prodiranja u pluća (opasnost za disanje) ako se proguta ili pri povraćanju zbog pojave plinova i stvaranja pjene.

Samo kada je unesrećeni potpuno pri svijesti: isprati usta vodom; dati unesrećenom piti dovoljno vode u malim gutljajima; utopli unesrećenog i umiriti ga.

Odmah obavijestiti hitnu pomoć (ključna riječ: opeklina izazvana kiselinom).

Ø Bilješke za liječnika

Terapija kao kod kemijske opeklinae.

Nakon udisanja:

Stvaranje toksičnog edema pluća moguće je ako se proizvod i dalje udiše unatoč akutnom nadražujućem učinku (npr. ako nije moguće napustiti opasno područje).

Profilaksa toksičnog edema pluća s inhalacijskim steroidima (sprej za doziranje, npr. auksilozon).

Ako se tvar proguta:

Opasnost od aspiracije.

Rizik od plinovitih embolija.

U slučaju pretjeranog naprezanja želuca zbog stvaranja plinova, umetnuti sifonsku cijev.

Rana endoskopija radi procjene lezija sluznica u jednjaku i želucu koje se mogu pojaviti.

Po potrebi, usisati ostatke tvari.

Ne davati aktivni ugljen jer postoji opasnost od ispuštanja velikih količina plina iz vodikovog peroksida.

Mjere u slučaju izvanredne situacije za zaštitu okoliša

Pridržavati se propisa o sprečavanju onečišćenja vode (sakupiti, navlažiti, pokriti).

Ne dopustiti ispuštanje u vodene tokove, površinske vode ili u tlo.

Ø **Metode čišćenja**

Temeljito očistiti zagađenu površinu; preporučljivo sredstvo za čišćenje je voda.

U slučaju malih prolijevanja/rasipanja, razrijediti proizvod s puno vode i isprati ga ili apsorbirati materijalom koji veže tekućinu, npr. kemijska sorpcija, dijatomejska zemlja, univerzalno vezivo. Ne koristiti tekstil, piljevinu, zapaljive tvari. Nakon vezivanja mehanički pokupiti i odložiti u prikladne spremnike. Odložiti apsorbirani materijal u skladu s propisima.

Ø **Dodatni savjet**

Učiniti sigurnima ili ukloniti sve izvore paljenja.

Odmah izolirati oštećene spremnike, ako je moguće i sigurno.

Isključiti istjecanje, ako je moguće i sigurno.

Staviti neispravne spremnike u posudu za otpad (posudu za otpadnu ambalažu) izrađenu od plastike (ne od metala).

Ne zatvarati hermetički oštećene spremnike ili posude za otpad (opasnost od pucanja zbog raspadanja proizvoda).

Izvađeni proizvod ne bi trebalo vraćati u spremnik.

Nikada ne vraćati proliveni/rasuti proizvod u originalno pakiranje radi ponovne uporabe (opasnost od raspadanja).

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, u vodene tokove (sudoper, zahod...) niti u kanalizaciju

Odlagati neiskorišteni proizvod, ambalažu te svaki drugi otpad u skladu s lokalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati samo u originalnoj ambalaži koja je hermetički zatvorena na hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati proizvod podalje od izravnog sunčevog svjetla, izvora topline i paljenja

Rok trajanja proizvoda je 6 mjeseci.

Proizvode je potrebno skladištiti pri temperaturama ispod +30 °C.

6. Ostale informacije

Referentne vrijednosti peroctene kiseline i vodikovog peroksida korištene za procjenu rizika:

Peroctena kiselina : Koncentracija prihvatljive razine izloženosti udisanjem = 0,5 mg/m³

Vodikov peroksid : Koncentracija prihvatljive razine izloženosti udisanjem = 1,25 mg/m³

7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u

7.1 Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

SOPUROXID 3.2	područje prodaje: EU
HyPro Biocide 3.2-23	područje prodaje: EU
EU-0026179-0003 1-2	

Broj odobrenja

(Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) - Nacionalno odobrenje)

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Peroctena kiselina		Aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	3,2
Sumporna kiselina		Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	0,8
Vodikov peroksid		Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	23,5
Octena kiselina		Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	6,45

1. Administrativni podatci**1.1. identifikator u meta SPC-u**

Meta SPC3

1.2. Dodatak broju autorizacije

1-3

1.3 Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

2. Sastav u meta SPC-u

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu u meta SPC-u

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Peroctena kiselina		Aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	3,2 - 3,2
Sumporna kiselina		Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	0,6 - 1
Vodikov peroksid		Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	23,5 - 23,5
Octena kiselina		Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	5,5 - 7,1

2.2. Vrsta(e) formulacija u meta SPC-u

Formulacija(e)

SL -topivi koncentrat

3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u

Oznaka upozorenja

Može pojačati požar; oksidans.
 Može nagrizati metale.
 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
 Uzrokuje teške ozljede oka.
 Može nadražiti dišni sustav.
 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
 Štetno u dodiru s kožom.
 Štetno ako se proguta.

Oznake obavijesti

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
 Nositi zaštitne rukavice.
 Nositi zaštitu za lice.
 Nositi zaštitu za oči.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu vodom.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim .

Izbjegavati udisanje pare.

Nakon uporabe temeljito oprati ruke

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi informacije na ovoj naljepnici).

Isprati usta.

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.

AKO SE PROGUTA:U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:Oprati velikom količinom vode.

AKO SE PROGUTA:Isprati usta.NE izazivati povraćanje.

AKO SE UDIŠE:Premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.I oprati je prije ponovne uporabe.

Skladištiti pod ključem.

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odložiti sadržaj u/na u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

Nositi zaštitno odijelo.

Odložiti spremnik u/na u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.

Održavati hladnim.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Sakupiti proliveno/rasuto.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu tuširanjem.

Ne udisati pare.

Izbjegavati udisanje aerosola.

Ne udisati aerosol.

4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Vrsta proizvoda 02 - Uporaba 3.1: Dezinfekcija površina u industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima – primjena pjene na površinama

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima : Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina pjenjenjem uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: primjena pjene Detaljan opis: Pjenjenjem pomoću male kante za pjenjenje s razrijeđenim proizvodom
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: zdravstvenim nemedicinskim područjima S 0,048% peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 1,5 % tj. 1500 ml/100 l) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 5 min. Količina primjene: 20 ml/m ² Ne koristiti u ZDRAVSTVU S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 1,5 % tj. 1500 ml/100 l) i u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Količina primjene: 30 ml/m ² Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Vrsta proizvoda 02 - Uporaba 3.2: Dezinfekcija površina i poljoprivredne/hortikulture opreme pjenjenjem, ručno (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U poljoprivrednim/hortikulturnim područjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme pjenjenjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: primjena pjene
Detaljan opis:

Pjenjenjem pomoću male kante za pjenjenje s razrijeđenim proizvodom
Pjenjenje se samo primjenjuje prema dolje i u vodoravnom smjeru.

**Broj i vremenski raspored
primjena**

Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m²
Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline
(razrjeđivanje proizvoda 1,5 % tj. 1500 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.

Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

**Veličine pakiranja i ambalažni
materijal**

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 40 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Novi ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Vrsta proizvoda 02 - Uporaba 3.3: Dezinfekcija površina i poljoprivredne/hortikulture opreme automatskim pjenjenjem (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts

	Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U poljoprivrednim/hortikulturnim područjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme automatskim pjenjenjem uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: primjena pjene Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod pjene se na opremi automatski dok je korisnik prisutan, sjedi u osobnom ograđenom prostoru / u zatvorenoj kabini (npr. traktor opremljen uređajem za prskanje/pjenjenje). Pjenjenje se samo primjenjuje prema dolje i u vodoravnom smjeru.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 1,5 % tj. 1500 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje je automatsko i treba se provoditi samo ako na tretiranom području nije nitko prisutan.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja”.

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Vrsta proizvoda 02 - Uporaba 3.4: Dezinfekcija površina i poljoprivredne/hortikulture opreme automatskim pjenjenjem (zatvorene prostorije) (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene	u zatvorenom prostoru U poljoprivrednim/hortikulturnim područjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme automatskim pjenjenjem uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: primjena pjene Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod automatski se pjenu na površinama automatski bez prisutnosti korisnika.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 1,5 % tj. 1500 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.
Nanošenje je automatsko i treba se provoditi samo ako na tretiranom području nije nitko prisutan.
Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"
„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Vrsta proizvoda 03 - Uporaba 3.5: Dezinfekcija životinjskih nastambi pjenjenjem – pjenjenje u osobnom ograđenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria

	<p>Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka</p>
Područje primjene	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>U životinjskoj nastambi Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina pjenjenjem uz prethodno čišćenje</p>
Načini primjene	<p>Metoda: primjena pjene Detaljan opis:</p> <p>Razrijeđeni proizvod automatski se pjenu u svim smjerovima na površinama/zidovima pomoću uređaja za pjenjenje. Korisnik je prisutan, sjedi u osobnom ograđenom prostoru / u zatvorenoj kabini (npr. traktor opremljen uređajem za prskanje/pjenjenje)</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: - Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija, kvasaca i virusa: S 0,064% peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 2 % tj. 2000 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
Kategorije korisnika	<p>industrijski</p> <p>profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.</p>

4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mora se osigurati da životinje nisu prisutne tijekom tretiranja.

4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba opreme za zaštitu dišnih putova sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je rijekom miješanja i punjenja, a s faktorom 10 tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti.

Nanošenje bi se trebalo provoditi samo s korisnikom u osobnom ograđenom prostoru i bez prisutnosti ijedne druge osobe.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja”.

Tretiranje se provodi samo ako su nastambe za životinje prazne. Ponovni ulazak životinja samo nakon odgovarajuće ventilacije i kada se površine osuše.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - Vrsta proizvoda 03 - Uporaba 3.6: Dezinfekcija životinjskih nastambi pjenjenjem – pjenjenje bez osobnog ograđenog prostora

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria

	<p>Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka</p>
Područje primjene	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>U životinjskoj nastambi Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina pjenjenjem uz prethodno čišćenje</p>
Načini primjene	<p>Metoda: primjena pjene Detaljan opis:</p> <p>Razrijeđeni proizvod automatski se pjene na površinama/zidovima, u svim smjerovima, pomoću uređaja za pjenjenje.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: - Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija, kvasaca i virusa: S 0,064% peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 2 % tj. 2000 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
Kategorije korisnika	<p>industrijski</p> <p>profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.</p>

4.6.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mora se osigurati da životinje nisu prisutne tijekom tretiranja.

4.6.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 40 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Tretiranje se provodi samo ako su nastambe za životinje prazne. Ponovni ulazak životinja samo nakon odgovarajuće ventilacije i kada se površine osuše.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.6.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.6.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.6.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - Vrsta proizvoda 04 - Uporaba 3.7: Dezinfekcija površina pjenjenjem – pjenjenje u osobnom ograđenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina pjenjenjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: primjena pjene
Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod automatski se pjenu na površinama/zidovima, u svim smjerovima, pomoću uređaja za pjenjenje.
Korisnik je prisutan, sjedi u osobnom ograđenom prostoru / u zatvorenoj kabini (npr. traktor opremljen uređajem za prskanje/pjenjenje)

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m²
Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 1,5 % tj. 1500 ml/100 l) i u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore), kvasaca i virusa (uključujući bakteriofage): S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 2 % tj. 2000 ml/100 l) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski
profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.



4.7.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Zaštita dišnih putova s procijenjenim zaštitnim faktorom 10 potrebna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje bi se trebalo provoditi samo s korisnikom u osobnom ograđenom prostoru i bez prisutnosti ijedne druge osobe.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.7.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8 Opis uporabe

Uporaba 8 - Vrsta proizvoda 04 - Uporaba 3.8: Dezinfekcija površina pjenjenjem – bez osobnog ograđenog prostora

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakteriofagi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom – U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina pjenjenjem uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: primjena pjene Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod automatski se pjeni na površinama/zidovima, u svim smjerovima, pomoću uređaja za pjenjenje.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m ² Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 1,5 % tj. 1500 ml/100 l) i u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore), kvasaca i virusa (uključujući bakteriofage): S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 2 % tj. 2000 ml/100 l) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.8.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 40 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.8.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

5. Opće upute za korištenje meta SPC-a

5.1. Upute za uporabu

1. Sve površine koje treba dezinficirati moraju biti očišćene prije postupka dezinfekcije
2. **Ciklus dezinfekcije :**

- Prije uporabe, proizvodi se moraju razrijediti u pitkoj vodi.
- Brzina razrjeđivanja i kontaktno vrijeme ovise o dotičnoj uporabi. Pogledati opis metode primjene koja se odnosi na svaku uporabu.
- Završno ispiranje (pitkom vodom) je obvezno: nakon postupka dezinfekcije, tretirane površine ispiru se vodom i voda se odvodi u kanalizacijski sustav. Za iznimku, pogledati opis metode primjene koja se odnosi na svaku uporabu.

Meta SPC 3 : Postupci dezinfekcije pjenjenjem

Samo za uporabu u područjima koja su nedostupna široj javnosti i kućnim ljubimcima.
Nema pristupa široke javnosti tijekom tretiranja.

Površine koje treba dezinficirati moraju biti dovoljno mokre kako bi ostale mokre tijekom potrebnog kontaktnog vremena za optimalnu dezinfekciju. Tada bi korisnik trebao obratiti pozornost na mokre površine u potpunosti s otopinom dezinficijensa.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Zaštita kože:

Tijekom rukovanja proizvodom koristiti zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica nositelj odobrenja treba navesti u okviru informacijama o proizvodu).

Potrebno je nositi zaštitno odijelo koji je nepropusan za biocidne proizvode (nositelj odobrenja mora naznačiti materijal zaštitnog odijela u sklopu informacija o proizvodu).

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Indirektni učinci

Dva proizvoda su oksidirajuća i reaktivna sredstva. U slučaju termičke razgradnje para i kisik će se osloboditi kao proizvodi raspadanja. Oslobađanjem kisika može se podržati izgaranje.

Također, kontakt s nečistoćama, katalizatorima raspadanja, metalnim solima, lužinama, redukcijskim sredstvima može dovesti do samoubrzavajuće egzotermne razgradnje i stvaranja kisika.

U slučaju raspadanja proizvoda u ograničenim prostorima i cijevima, postoji rizik od prekomjernog pritiska i pucanja.

Mjere prve pomoći

Ø Opći savjet

Napustiti opasno područje.

Voditi računa o svojoj osobnoj sigurnosti.

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.

Ø Udisanje

Premjestiti unesrećene osobe na svjež zrak.

Moguća tegoba: nadražuje kožu i sluznicu oka te dišne putove i uzrokuje kašalj.
Ako se pojave poteškoće s disanjem (npr. jaki kontinuirani kašalj): postaviti unesrećenog u polusjedeći položaj s podignutim gornjim dijelom tijela; utopiti ga i premjestiti na mirno mjesto; odmah pozvati liječnika.

Ø **Dodir s kožom**
Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode.
Obratiti se liječniku.
Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.
Odmah isprati vodom zagađenu ili zasićenu odjeću.

Ø **Dodir s očima**
Držati kapke unesrećenog razmaknutima i odmah temeljito ispirati dovoljnom količinom vode najmanje 10 minuta.
Zaštititi neozlijeđeno oko.
Nastaviti ispirati otopinom za ispiranje očiju.
Pozvati hitnu pomoć (opeklina očiju izazvana kaustičnim sredstvom)
Neposredna daljnja obrada na očnom odjelu bolnice / u oftalmološkoj ordinaciji.
Nastaviti ispirati oko do dolaska na očni odjel bolnice.

Ø **Gutanje**
Ne izazivati povraćanje.
Opasnost od prodiranja u pluća (opasnost za disanje) ako se proguta ili pri povraćanju zbog pojave plinova i stvaranja pjene.
Samo kada je unesrećeni potpuno pri svijesti: isprati usta vodom; dati unesrećenom piti dovoljno vode u malim gutljajima; utopiti unesrećenog i umiriti ga.
Odmah obavijestiti hitnu pomoć (ključna riječ: opeklina izazvana kiselinom).

Ø **Bilješke za liječnika**
Terapija kao kod kemijske opeklinae.
Nakon udisanja:
Stvaranje toksičnog edema pluća moguće je ako se proizvod i dalje udiše unatoč akutnom nadražujućem učinku (npr. ako nije moguće napustiti opasno područje).
Profilaksa toksičnog edema pluća s inhalacijskim steroidima (sprej za doziranje, npr. auksiloson).
Ako se tvar proguta:
Opasnost od aspiracije.
Rizik od plinovitih embolija.
U slučaju pretjeranog napreznja želuca zbog stvaranja plinova, umetnuti sifonsku cijev.
Rana endoskopija radi procjene lezija sluznica u jednjaku i želucu koje se mogu pojaviti.
Po potrebi, usisati ostatke tvari.
Ne davati aktivni ugljen jer postoji opasnost od ispuštanja velikih količina plina iz vodikovog peroksida.

Mjere u slučaju izvanredne situacije za zaštitu okoliša
Pridržavati se propisa o sprečavanju onečišćenja vode (sakupiti, navlažiti, pokriti).
Ne dopustiti ispuštanje u vodene tokove, površinske vode ili u tlo.

Ø **Metode čišćenja**
Temeljito očistiti zagađenu površinu; preporučljivo sredstvo za čišćenje je voda.
U slučaju malih prolijevanja/rasipanja, razrijediti proizvod s puno vode i isprati ga ili apsorbirati materijalom koji veže tekućinu, npr. kemijska sorpcija, dijatomejska zemlja, univerzalno vezivo. Ne koristiti tekstil, piljevinu, zapaljive tvari. Nakon vezivanja mehanički pokupiti i odložiti u prikladne spremnike. Odložiti apsorbirani materijal u skladu s propisima.

Ø **Dodatni savjet**
Učiniti sigurnima ili ukloniti sve izvore paljenja.
Odmah izolirati oštećene spremnike, ako je moguće i sigurno.
Isključiti istjecanje, ako je moguće i sigurno.
Staviti neispravne spremnike u posudu za otpad (posudu za otpadnu ambalažu) izrađenu od plastike (ne od metala).
Ne zatvarati hermetički oštećene spremnike ili posude za otpad (opasnost od pucanja zbog raspadanja proizvoda).
Izvađeni proizvod ne bi trebalo vraćati u spremnik.
Nikada ne vraćati proliveni/rasuti proizvod u originalno pakiranje radi ponovne uporabe (opasnost od raspadanja).

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, u vodene tokove (sudoper, zahod...) niti u kanalizaciju
Odlagati neiskorišteni proizvod, ambalažu te svaki drugi otpad u skladu s lokalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati samo u originalnoj ambalaži koja je hermetički zatvorena na hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati proizvod podalje od

izravnog sunčevog svjetla, izvora topline i paljenja
Rok trajanja proizvoda je 6 mjeseci.

Proizvode je potrebno skladištiti pri temperaturama ispod +30 °C.

6. Ostale informacije

Referentne vrijednosti peroctene kiseline i vodikovog peroksida korištene za procjenu rizika:

Peroctena kiselina : Koncentracija prihvatljive razine izloženosti udisanjem = 0,5 mg/m³

Vodikov peroksid : Koncentracija prihvatljive razine izloženosti udisanjem = 1,25 mg/m³

7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u

7.1 Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv	ACIDOFOAM CF	područje prodaje: EU
	HyPro Biocide 3.2-23a	područje prodaje: EU
	TECHMA OXI PB	područje prodaje: EU
Broj odobrenja <small>(Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) - Nacionalno odobrenje)</small>	EU-0026179-0004 1-3	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Peroctena kiselina		Aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	3,2
Sumporna kiselina		Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	0,8
Vodikov peroksid		Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	23,5
Octena kiselina		Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	6,1

1. Administrativni podatci

1.1. identifikator u meta SPC-u

Meta SPC4

1.2. Dodatak broju autorizacije

1-4

1.3 Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

2. Sastav u meta SPC-u

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu u meta SPC-u

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Peroctena kiselina		Aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	15 - 15
Sumporna kiselina		Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	0,78 - 0,78

Vodikov peroksid	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	22 - 22
Octena kiselina	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	16,7 - 16,7

2.2. Vrsta(e) formulacija u meta SPC-u

Formulacija(e)

SL -topivi koncentrat

3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u

Oznaka upozorenja

Zagrijavanje može uzrokovati požar.
 Može nagrizzati metale.
 Štetno ako se proguta.Štetno ako se udiše.
 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
 Uzrokuje teške ozljede oka.
 Može nadražiti dišni sustav.
 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
 Zapaljiva tekućina i para.
 Otrovno u dodiru s kožom.

Oznake obavijesti

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
 Nositi zaštitne rukavice.
 Nositi zaštitu za oči.
 Nositi zaštitu za lice.
 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu vodom.
 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
 Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim .
 Izbjegavati udisanje pare.
 Nakon uporabe temeljito oprati ruke
 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
 Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi informacije na ovoj naljepnici).

Isprati usta.
Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
AKO SE PROGUTA:U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
AKO SE PROGUTA:Isprati usta.NE izazivati povraćanje.
U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:Oprati velikom količinom vode.
AKO SE UDIŠE:Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.
Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.I oprati je prije ponovne uporabe.
Skladištiti pod ključem.
Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Odložiti sadržaj u/na u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.
Nositi zaštitno odijelo.
Odložiti spremnik u/na u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.
Održavati hladnim.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Sakupiti proliveno/rasuto.
U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu tuširanjem.
Ne udisati pare.
Izbjegavati udisanje aerosola.
Ne udisati aerosol.

4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Dezinfekcija površina u industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima - ručno tretiranje (čišćenje metlom s resicama)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima : Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina ručnim tretiranjem (pranje metlom s resicama) uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: Ručno tretiranje (čišćenje metlom s resicama). Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod primjenjuje se čišćenjem metlom s resicama pomoću prikladnog alata (npr. ravnim metlama s resicama ili krpama za čišćenje). Nakon nanošenja razrijeđeni proizvod se ocijedi.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: zdravstvenim nemedicinskim područjima S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 5 min. Količina primjene: 20 ml/m ² . Ne koristiti u ZDRAVSTVU S 0,048% peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Količina primjene: 30 ml/m ² . Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Predmeti koje treba dezinficirati pranjem metlom s resicama moraju ostati dovoljno mokri tijekom potrebnog kontaktnog vremena kako bi se omogućila optimalna dezinfekcija.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 20 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

Ponovni ulazak dopušten je samo kada koncentracije peroctene kiseline i vodikovog peroksida u zraku padnu ispod odgovarajućih referentnih vrijednosti (AEC). Nakon nanošenja, prostoriju je potrebno prozračiti, poželjno mehaničkom ventilacijom. Trajanje razdoblja ventilacije mora se utvrditi mjerenjem prikladnom mjernom opremom (naveo nositelj odobrenja)).

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Dezinfekcija površina u industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima - ručno tretiranje (prskanje)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industrijskim, javnim i zdravstvenim nemedicinskim područjima : Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina ručnim tretiranjem (prskanjem) uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: Ručno tretiranje (prskanje)

Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod primjenjuje se raspršivanjem pomoću male kantice za prskanje.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: -

Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: zdravstvenim nemedicinskim područjima S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 5 min. Količina primjene: 20 ml/m². Ne koristiti u ZDRAVSTVU S 0,048% peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature. Količina primjene: 30 ml/m².

Broj i vremenski raspored primjene:

/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):

Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :
Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .
Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.
Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom faze nanošenja.
Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.
Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”
„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.
Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Čišćenje na mjestu (CIP) u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria

	<p>Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka</p>
Područje primjene	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>U farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina postupcima čišćenja na mjestu (CIP) (s kruženjem) uz prethodno čišćenje</p>
Načini primjene	<p>Metoda: Postupkom čišćenja na mjestu (CIP) Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod automatski kruži iz spremnika zadržavanja čišćenjem na mjestu (CIP) kroz zatvoreni cjevovod i instalacije. Nakon postupka dezinfekcije, posude (cjevovod i spremnici) se isušuju i ispiru vodom u uvjetima zatvorenog sustava.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,032% peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,2133 % tj. 213,33 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
Kategorije korisnika	<p>industrijski</p> <p>profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.</p>

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja.

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Dezinfekcija površina u staklenicima prskanjem koje provodi korisnik u osobnom ograđenom prostoru (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene	u zatvorenom prostoru U staklenicima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina prskanjem uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: otvoreni sustav: sprejanje Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod automatski se primjenjuje u svim smjerovima prskanjem pomoću uređaja za prskanje Korisnik je prisutan, sjedi u osobnom ograđenom prostoru / u zatvorenoj kabini (npr. traktor opremljen uređajem za prskanje/pjenjenje)
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m ² Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze miješanja i punjenja te nanošenja. Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje bi se trebalo provoditi samo s korisnikom u osobnom ograđenom prostoru i bez prisutnosti ijedne druge osobe.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.
Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Dezinfekcija površina u staklenicama prskanjem koje provodi korisnik bez osobnog ograđenog prostora (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U staklenicama: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: otvoreni sustav: sprejanje
Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod automatski se primjenjuje u svim smjerovima prskanjem pomoću uređaja za prskanje.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m²
Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski
profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**Zaštita kože :**

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 40 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - Dezinfekcija poljoprivredne i hortikulturne opreme umakanjem (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U poljoprivrednim/hortikulturnim područjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme (malih dijelova, kao što su oprema, rezervni dijelovi, alati, ventili, crijeva...) uranjanjem u kupke za namakanje uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: otvoreni sustav: namakanje

Detaljan opis:

Koncentrirani proizvod pumpa se u kupku za namakanje i razrjeđuje do željene koncentracije za uporabu, prije uranjanja predmeta koje treba dezinficirati

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: -

Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.

	Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.6.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.6.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze poslije nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

4.6.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.6.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.6.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - Dezinfekcija površina i poljoprivredne/hortikulture opreme prskanjem (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U poljoprivrednim/hortikulture področjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: otvoreni sustav: sprejanje

Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod ručno se raspršuje na površine/opremu opremom za prskanje. Prskanje se primjenjuje samo prema dolje i u vodoravnom smjeru.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m²

Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.

Broj i vremenski raspored primjene:

/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):

Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.7.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 20 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

4.7.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.7.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8 Opis uporabe

Uporaba 8 - Dezinfekcija površina i poljoprivredne/hortikulture opreme automatskim prskanjem (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U poljoprivrednim/hortikulture področjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod nanosi se prskanjem automatski Prskanje se primjenjuje samo prema dolje i u vodoravnom smjeru.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Veličine pakiranja i ambalažni materijal Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.8.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje je automatsko i treba se provoditi samo ako na tretiranom području nije nitko prisutan.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

4.8.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.8.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.9 Opis uporabe

Uporaba 9 - Dezinfekcija površina i poljoprivredne/hortikulture opreme automatskim prskanjem - (zatvorena prostorija) (bez biljaka – samo za opću higijensku svrhu)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U poljoprivrednim/hortikulturnim područjima: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: Prskanjem.

Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod nanosi se automatski bez prisutnosti operatora

**Broj i vremenski raspored
primjena**

Stopa primjene: -

Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.

Broj i vremenski raspored primjene:

/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

**Veličine pakiranja i ambalažni
materijal**

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):

Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.9.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.9.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.
Nanošenje je automatsko i treba se provoditi samo ako na tretiranom području nije nitko prisutan.
Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"
„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

4.9.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.9.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.9.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.10 Opis uporabe

Uporaba 10 - Dezinfekcija životinjske nastambe niskotlačnim prskanjem koje provodi korisnik u osobnom ograđenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U životinjskoj nastambi : Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: prskanje
Detaljan opis:
Razrijeđeni proizvod automatski se nanosi u svim pravcima niskotlačnim ručnim prskanjem pomoću uređaja za prskanje.
Korisnik je prisutan, sjedi u osobnom ograđenom prostoru / u zatvorenoj kabini (npr. traktor opremljen uređajem za prskanje/pjenjenje)

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Između 20 i 300 ml/m²
Razrijeđivanje (%): Protiv bakterija, kvasaca i virusa: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski
profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.10.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mora se osigurati da životinje nisu prisutne tijekom tretiranja.

4.10.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože:

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze miješanja i punjenja te nanošenja. Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje je automatsko i treba se provoditi samo ako na tretiranom području nije nitko prisutan.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Tretiranje se provodi samo ako su nastambe za životinje prazne. Ponovni ulazak životinja samo nakon odgovarajuće ventilacije i kada se površine osuše.
Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.10.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.10.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.10.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.11 Opis uporabe

Uporaba 11 - Dezinfekcija nastambe za životinje niskotlačnim ručnim prskanjem koju provodi korisnik bez osobnog ograđenog prostora

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U životinjskoj nastambi : Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene	<p>Metoda: otvoreni sustav: sprejanje Detaljan opis:</p> <p>Razrijeđeni proizvod automatski se nanosi u svim smjerovima niskotlačnim automatskim prskanjem pomoću uređaja za prskanje.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: Između 20 i 300 ml/m² Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija, kvasaca i virusa: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
Kategorije korisnika	<p>industrijski profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.</p>

4.11.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mora se osigurati da životinje nisu prisutne tijekom tretiranja.

4.11.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 40 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Tretiranje se provodi samo ako su nastambe za životinje prazne. Ponovni ulazak životinja samo nakon odgovarajuće ventilacije i kada se površine osuše.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.11.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.11.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.11.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.12 Opis uporabe

Uporaba 12 - Dezinfekcija čizama u kadama za dezinfekciju obuće u životinjskim nastambama/uzgajalištima

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

u životinjskim nastambama/uzgajalištima: Dezinfekcija čizama uranjanjem (ne prolaženjem) uz prethodno čišćenje.

Načini primjene

Metoda: Uranjanje
Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod stavlja se u kadu za dezinfekciju obuće
Ispiranje nije potrebno

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: -
Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija, kvasaca i virusa: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski
profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.12.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.12.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**Zaštita kože :**

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze poslije nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja".

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.12.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinsti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.12.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.12.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.13 Opis uporabe

Uporaba 13 - Dezinfekcija opreme uranjanjem

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme (malih dijelova, kao što su oprema, rezervni dijelovi, alati, ventili, crijeva...) uranjanjem u kupku za namakanje uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: Umakanje. Detaljan opis: Koncentrirani proizvod pumpa se u kupku za namakanje i razrjeđuje do željene koncentracije za uporabu, prije uranjanja predmeta koje treba dezinficirati
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija, kvasaca i virusa: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min. Broj i vremenski raspored primjene:

	/
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.13.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.13.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze poslije nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja.

4.13.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.13.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.13.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.14 Opis uporabe

Uporaba 14 - Dezinfekcija aseptičnih linija za punjenje (krunski čepovi, kalupi za sir i sanduci za hranu) - Zatvoreni sustavi za automatsko prskanje

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakteriofagi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U industriji hrane i pića: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina prskanjem uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod se raspršuje na površinama automatski bez prisutnosti korisnika.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: -
Razrjeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048% peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski
profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.14.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.14.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**Zaštita kože :**

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje je automatsko i treba se provoditi samo ako na tretiranom području nije nitko prisutan.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

4.14.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.14.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.14.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.15 Opis uporabe

Uporaba 15 - Dezinfekcija opreme u industriji hrane i pića uranjanjem

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakteriofagi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U industriji hrane i pića: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme (malih dijelova, kao što su oprema, rezervni dijelovi, alati, ventili, crijeva...) uranjanjem u kupke za namakanje uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: Umakanje.

	<p>Detaljan opis:</p> <p>Koncentrirani proizvod pumpa se u kupku za namakanje i razrjeđuje do željene koncentracije za uporabu, prije uranjanja predmeta koje treba dezinficirati</p>
<p>Broj i vremenski raspored primjena</p>	<p>Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048% peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi. Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
<p>Kategorije korisnika</p>	<p>industrijski profesionalac</p>
<p>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</p>	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.</p>

4.15.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.15.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze poslije nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.
Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"
Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.15.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.15.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.15.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.16 Opis uporabe

Uporaba 16 - Dezinfekcija izmjenjivača topline i iona, membranskih filtara i stakla te PET boca – Postupci čišćenja na mjestu (CIP)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>U industriji hrane i pića: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina postupcima čišćenja na mjestu (CIP) (s kruženjem) uz prethodno čišćenje</p>
Načini primjene	<p>Metoda: zatvoreni sustav Detaljan opis:</p> <p>Razrijeđeni proizvod automatski kruži iz spremnika zadržavanja čišćenjem na mjestu (CIP) kroz zatvoreni cjevovod i instalacije. Nakon postupka dezinfekcije, posude (cjevovod i spremnici) se isušuju i ispiru vodom u uvjetima zatvorenog sustava.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048% peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi. Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
Kategorije korisnika	<p>industrijski</p> <p>profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.</p>

4.16.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.16.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

4.16.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.16.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.16.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.17 Opis uporabe

Uporaba 17 - Dezinfekcija površina i opreme niskotlačnim prskanjem – prskanje u osobnom ograđenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene	u zatvorenom prostoru U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod automatski se primjenjuje u svim smjerovima niskotlačnim prskanjem pomoću uređaja za prskanje Korisnik je prisutan, sjedi u osobnom ograđenom prostoru / u zatvorenoj kabini (npr. traktor opremljen uređajem za prskanje/pjenjenje)
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m ² Razrjeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.17.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.17.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava:

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom faze miješanja i punjenja te nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje bi se trebalo provoditi samo s korisnikom u osobnom ograđenom prostoru i bez prisutnosti ijedne druge osobe.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja”.

Novi ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.17.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.17.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.17.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.18 Opis uporabe

Uporaba 18 - Dezinfekcija površina i opreme niskotlačnim prskanjem – prskanje bez osobnog ograđenog prostora

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka

Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: prskanje
Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod automatski se primjenjuje u svim smjerovima niskotlačnim prskanjem pomoću uređaja za prskanje.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m²
Razrjeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.18.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.18.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 40 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja”.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.18.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.18.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.18.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.19 Opis uporabe

Uporaba 19 - Dezinfekcija površina i opreme niskotlačnim prskanjem, ručno

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme niskotlačnim prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: Ručno nanošenje – prskanje.
Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod ručno se nanosi niskotlačnim prskanjem, samo prema dolje i vodoravno.

**Broj i vremenski raspored
primjena**

Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m²
Razrijeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi.

Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski

profesionalac

**Veličine pakiranja i ambalažni
materijal**

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.19.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.19.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom faze miješanja, punjenja i nanošenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 20 obvezna je tijekom faze nanošenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i nećiljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Novni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.19.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.19.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.19.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.20 Opis uporabe

Uporaba 20 - Dezinfekcija površina i opreme niskotlačnim prskanjem, automatsko

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

-

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme niskotlačnim prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: prskanje
Detaljan opis:

Razrijeđeni proizvod raspršuje se na opremu

Korisnik je prisutan, sjedi u osobnom ograđenom prostoru / u zatvorenoj kabini (npr. traktor opremljen uređajem za prskanje/pjenjenje).

Prskanje se primjenjuje samo prema dolje i u vodoravnom smjeru.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m²
Razrijeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi.
Broj i vremenski raspored primjene:
/

Kategorije korisnika

industrijski
profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda):
Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.20.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.20.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Zaštita oprema za dišne putove nije obvezna tijekom faze primjene, pod uvjetom da korisnik ostane u kontrolnoj sobi i ne ulazi u tretirano područje.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Nanošenje je automatsko i treba se provoditi samo ako na tretiranom području nije nitko prisutan.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja“.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.20.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.20.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.20.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.21 Opis uporabe

Uporaba 21 - Dezinfekcija površina i opreme niskotlačnim prskanjem – automatsko prskanje (zatvorena prostorija)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakterijske spore
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Viruses
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: Bakteriofagi
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina/opreme niskotlačnim prskanjem uz prethodno čišćenje

Načini primjene

Metoda: prskanje
Detaljan opis:

Razrijeđena otopina raspršuje se na površine automatski bez prisutnosti korisnika.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Između 20 i 200 ml/m²
Razrijeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048% peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrijeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi.

	Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.21.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.21.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Zaštita oprema za dišne putove nije obvezna tijekom faze primjene, pod uvjetom da korisnik ostane u kontrolnoj sobi i ne ulazi u tretirano područje.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i neciljne organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja”

„Tretirana površina ne smije se osušiti prije ispiranja”.

Ponovni ulazak šire javnosti samo kada su površine osušene i nakon dovoljne ventilacije.

4.21.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.21.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.21.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.22 Opis uporabe

Uporaba 22 - Dezinfekcija unutarnjih površina (cjevovoda, spremnika, posuda...) čišćenjem na mjestu (CIP)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakteriofagi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U industriji hrane: Dezinfekcija tvrdih/neporoznih površina postupcima čišćenja na mjestu (CIP) (s kruženjem) uz prethodno čišćenje
Načini primjene	Metoda: zatvoreni sustav Detaljan opis: Razrijeđeni proizvod automatski kruži iz spremnika zadržavanja čišćenjem na mjestu (CIP) kroz zatvoreni cjevovod i instalacije.

	<p>Nakon postupka dezinfekcije, posude (cjevovod i spremnici) se isušuju i ispiru vodom u uvjetima zatvorenog sustava.</p>
<p>Broj i vremenski raspored primjena</p>	<p>Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): - Protiv bakterija i kvasaca: S 0,048 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,32 % tj. 320 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature - Protiv bakterija (uključujući bakterijske spore) i kvasaca: S 0,064 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,42 % tj. 426,6 ml/100 l) u kontaktnom vremenu u trajanju od 60 min, temperatura učinkovite uporabe od +4 °C do sobne temperature Za dodatne aktivnosti protiv virusa (uključujući bakteriofage): proizvod bi trebalo koristiti pri sobnoj temperaturi. Broj i vremenski raspored primjene: /</p>
<p>Kategorije korisnika</p>	<p>industrijski profesionalac</p>
<p>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</p>	<p>Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.</p>

4.22.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.22.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obavezna je tijekom miješanja i punjenja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

4.22.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.22.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.22.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.23 Opis uporabe

Uporaba 23 - Dezinfekcija vode korištene za ispiranje recikliranih predmeta tijekom postupka pranja

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U industriji hrane: Dezinfekcija vode (u čistim uvjetima) korištena za ispiranje recikliranih predmeta = voda kvalitete pitke vode kratko se čuva u spremnicima do upotrebe za ispiranje predmeta, kao što su boce. Vodu bi trebalo dezinficirati kako bi se izbjeglo ponovno onečišćenje i u određenoj mjeri kako bi se izbjeglo unakrsno onečišćenje unutarnjih površina boca
Načini primjene	Metoda: zatvoreni sustav Detaljan opis: Koncentrirani proizvod pumpa se u rezervoar iz kojeg se kontinuirano dozira u vodeni tok. Razrjeđivanje proizvoda do predviđene koncentracije za uporabu događa se u

	vodenom toku. Ova je primjena zatvoreni automatizirani postupak.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): Protiv bakterija i kvasaca: S 0,008 % peroctene kiseline (razrjeđivanje proizvoda 0,0533 % tj. 53,3 ml/100 l) pri sobnoj temperaturi u kontaktnom vremenu u trajanju od 15 min. Broj i vremenski raspored primjene: /
Kategorije korisnika	industrijski profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Polietilen visoke gustoće s vijčanim i odzračnim zatvaračima (težina ovisi o gustoći proizvoda): Kanistri (10 do 25 kg), bačve (200 do 250 kg), IBC spremnik (1000 do 1200 kg), boce od 1 l, isporuka u rasutom stanju.

4.23.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.23.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Zaštita kože :

Koristiti prikladne zaštitne naočale i/ili štitnik za lice tijekom miješanja i punjenja.

Zaštitu dišnog sustava: .

Uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 4 obvezna je tijekom miješanja i punjenja.

Kada se proizvod koristi na javnim područjima, označiti tretirana područja tijekom razdoblja tretmana i naznačiti moguće rizike za ljude i ne ciljane organizme (npr. primarno i sekundarno trovanje), kao i mjere prve pomoći koje je potrebno poduzeti u slučaju trovanja.

Isprati pumpu i odvojiti je od instalacije prije održavanja"

4.23.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.23.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.23.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi

5. Opće upute za korištenje meta SPC-a

5.1. Upute za uporabu

1. Sve površine koje treba dezinficirati moraju biti očišćene prije postupka dezinfekcije.

1. Ciklus dezinfekcije :

- Prije uporabe, proizvodi se moraju razrijediti u pitkoj vodi.
- Brzina razrjeđivanja i kontaktno vrijeme ovise o dotičnoj uporabi. Pogledati opis metode primjene koja se odnosi na svaku uporabu.
- Završno ispiranje (pitkom vodom) je obvezno: nakon postupka dezinfekcije, tretirane površine ispiru se vodom i voda se odvodi u kanalizacijski sustav. Za iznimku, pogledati opis metode primjene koja se odnosi na svaku uporabu.

Samo za uporabu u područjima koja su nedostupna široj javnosti i kućnim ljubimcima.
Nema pristupa široke javnosti tijekom tretiranja.

· Postupci dezinfekcije čišćenjem na mjestu (CIP) - Faza završnog ispiranja (pitkom vodom).
Nakon postupka dezinfekcije, posude prilikom čišćenja na mjestu (CIP) (cjevovodi i spremnici) isušuju se i ispiru vodom u uvjetima zatvorenog sustava

· Postupci dezinfekcije uranjanjem : Kupka nije namijenjena za ponovnu uporabu. Koristiti kupku samo jedanput dnevno nakon rada i svakodnevno je zamijeniti svježom otopinom.

· Postupci dezinfekcije prskanjem : površine koje treba dezinficirati moraju biti dovoljno mokre kako bi ostale mokre tijekom potrebnog kontaktnog vremena za optimalnu dezinfekciju. Tada bi korisnik trebao obratiti pozornost na mokre površine u potpunosti s otopinom dezinficijensa.
Količina primjene za prskanje razrijeđenog proizvoda mora biti između 20 i 30 ml/m²

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Zaštita kože:

Tijekom rukovanja proizvodom koristiti zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica nositelj odobrenja treba navesti u okviru informacijama o proizvodu).

Potrebno je nositi zaštitno odijelo koji je nepropusan za biocidne proizvode (nositelj odobrenja mora naznačiti materijal zaštitnog odijela u sklopu informacija o proizvodu).

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Indirektni učinci

Dva proizvoda su oksidirajuća i reaktivna sredstva. U slučaju termičke razgradnje para i kisik će se osloboditi kao proizvodi raspadanja. Oslobađanjem kisika može se podržati izgaranje.

Također, kontakt s nečistoćama, katalizatorima raspadanja, metalnim solima, lužinama, redukcijskim sredstvima može dovesti do samoubrzavajuće egzotermne razgradnje i stvaranja kisika.

U slučaju raspadanja proizvoda u ograničenim prostorima i cijevima, postoji rizik od prekomjernog pritiska i pucanja.

Mjere prve pomoći

Ø Opći savjet

Napustiti opasno područje.

Voditi računa o svojoj osobnoj sigurnosti.

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.

Ø Udisanje

Premjestiti unesrećene osobe na svjež zrak.

Moguća tegoba: nadražuje kožu i sluznicu oka te dišne putove i uzrokuje kašalj.

Ako se pojave poteškoće s disanjem (npr. jaki kontinuirani kašalj): postaviti unesrećenog u polusjedeći položaj s podignutim gornjim dijelom tijela; utopli ga i premjestiti na mirno mjesto; odmah pozvati liječnika.

Ø Dodir s kožom

Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode.

Obratiti se liječniku.

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.

Odmah isprati vodom zagađenu ili zasićenu odjeću.

Ø Dodir s očima

Držati kapke unesrećenog razmaknutima i odmah temeljito ispirati dovoljnom količinom vode najmanje 10 minuta.

Zaštititi neozlijeđeno oko.

Nastaviti ispirati otopinom za ispiranje očiju.

Pozvati hitnu pomoć (opeklina očiju izazvana kaustičnim sredstvom)

Neposredna daljnja obrada na očnom odjelu bolnice / u oftalmološkoj ordinaciji.

Nastaviti ispirati oko do dolaska na očni odjel bolnice.

Ø Gutanje

Ne izazivati povraćanje.

Opasnost od prodiranja u pluća (opasnost za disanje) ako se proguta ili pri povraćanju zbog pojave plinova i stvaranja pjene.

Samo kada je unesrećeni potpuno pri svijesti: isprati usta vodom; dati unesrećenom piti dovoljno vode u malim gutljajima; utopli unesrećenog i umiriti ga.

Odmah obavijestiti hitnu pomoć (ključna riječ: opeklina izazvana kiselinom).

Ø Bilješke za liječnika

Terapija kao kod kemijske opekline.

Nakon udisanja:

Stvaranje toksičnog edema pluća moguće je ako se proizvod i dalje udiše unatoč akutnom nadražujućem učinku (npr. ako nije moguće napustiti opasno područje).

Profilaksa toksičnog edema pluća s inhalacijskim steroidima (sprej za doziranje, npr. auksiloson).

Ako se tvar proguta:

Opasnost od aspiracije.

Rizik od plinovitih embolija.

U slučaju pretjeranog naprežanja želuca zbog stvaranja plinova, umetnuti sifonsku cijev.

Rana endoskopija radi procjene lezija sluznica u jednjaku i želucu koje se mogu pojaviti.

Po potrebi, usisati ostatke tvari.

Ne davati aktivni ugljen jer postoji opasnost od ispuštanja velikih količina plina iz vodikovog peroksida.

Mjere u slučaju izvanredne situacije za zaštitu okoliša

Pridržavati se propisa o sprečavanju onečišćenja vode (sakupiti, navlažiti, pokriti).

Ne dopustiti ispuštanje u vodene tokove, površinske vode ili u tlo.

Ø Metode čišćenja

Temeljito očistiti zagađenu površinu; preporučljivo sredstvo za čišćenje je voda.

U slučaju malih prolijevanja/rasipanja, razrijediti proizvod s puno vode i isprati ga ili apsorbirati materijalom koji veže tekućinu, npr. kemijska sorpcija, dijatomejska zemlja, univerzalno vezivo. Ne koristiti tekstil, piljevinu, zapaljive tvari. Nakon vezivanja mehanički pokupiti i odložiti u prikladne spremnike. Odložiti apsorbirani materijal u skladu s propisima.

Ø **Dodatni savjet**

Učiniti sigurnima ili ukloniti sve izvore paljenja.

Odmah izolirati oštećene spremnike, ako je moguće i sigurno.

Isključiti istjecanje, ako je moguće i sigurno.

Staviti neispravne spremnike u posudu za otpad (posudu za otpadnu ambalažu) izrađenu od plastike (ne od metala).

Ne zatvarati hermetički oštećene spremnike ili posude za otpad (opasnost od pucanja zbog raspadanja proizvoda).

Izvađeni proizvod ne bi trebalo vraćati u spremnik.

Nikada ne vraćati proliveni/rasuti proizvod u originalno pakiranje radi ponovne uporabe (opasnost od raspadanja).

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, u vodene tokove (sudoper, zahod...) niti u kanalizaciju

Odlagati neiskorišteni proizvod, ambalažu te svaki drugi otpad u skladu s lokalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati samo u originalnoj ambalaži koja je hermetički zatvorena na hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati proizvod podalje od izravnog sunčevog svjetla, izvora topline i paljenja

Rok trajanja proizvoda je 6 mjeseci.

Proizvod je potrebno skladištiti pri okolišnoj temperaturi.

6. Ostale informacije

Referentne vrijednosti peroctene kiseline i vodikovog peroksida korištene za procjenu rizika:

Peroctena kiselina : Koncentracija prihvatljive razine izloženosti udisanjem = 0,5 mg/m³

Vodikov peroksid : Koncentracija prihvatljive razine izloženosti udisanjem = 1,25 mg/m³

7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u

7.1 Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

SOPUROXID 15	područje prodaje: EU
HORTICLEAN 15 FORT	područje prodaje: EU
AGRIOXID 15	područje prodaje: EU
HyPro Biocide 15-22	područje prodaje: EU

Broj odobrenja

(Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) - Nacionalno odobrenje)

EU-0026179-0005 1-4

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Peroctena kiselina		Aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	15
Sumporna kiselina		Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	0,78
Vodikov peroksid		Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	22
Octena kiselina		Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	16,7

Trgovački naziv

Oxypur CS	područje prodaje: EU
-----------	----------------------

Broj odobrenja

(Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) - Nacionalno odobrenje)

EU-0026179-0006 1-4

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Peroctena kiselina		Aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	15
Sumporna kiselina		Neaktivna tvar	7664-93-9	231-639-5	0,78
Vodikov peroksid		Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	22
Octena kiselina		Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	16,7