

PT

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)

MATIROL CEREAL DOMESTICO

Tipo(s) de produto

PT14: Rodenticidas

Número de autorização: PT/DGS ARMPB-mac-106/2018

Número da decisão de autorização R4BP: PT-0015094-0000

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	MATIROL CEREAL DOMESTICO
-----------------------------------	--------------------------

1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	IMPEX EUROPA, S.L.
	Endereço	Avda. de Pontevedra, nº 39 36600 Vilagarcía de Arousa Espanha
Número de autorização	PT/DGS ARMPB-mac-106/2018	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0015094-0000	
Data da autorização	27/11/2012	
Data de caducidade da autorização	31/12/2026	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	Laboratorios Agrochem, S.L.
Endereço do fabricante	Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud) 08292 Esparraguera (Barcelona) Espanha
Localização das instalações de fabrico	Tres Rieres, 10 08292 Esparraguera (Barcelona) Espanha

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Difenacume
Nome do fabricante	Activa s.r.l. / Dr. Tezza s.r.l.
Endereço do fabricante	Via Feltre, 32 20132 Milano Itália
Localização das instalações de fabrico	Dr. Tezza s.r.l.: Via Tre Ponti, 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Itália

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Difenacume	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	substância ativa	56073-07-5	259-978-4	0,0029

2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	H373: Pode afetar os órgãos {0:ou indicar todos os órgãos afetados, se forem conhecidos:} após exposição prolongada ou repetida {1:indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição:}.
Recomendações de prudência	P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P280: Usar vestuário de proteção. P301 + P310: EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

4.1. Descrição de utilizações

Tabela 1. Ratos - Público em geral (não profissional)

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Mus musculus Nome comum: house mouse Estadio de desenvolvimento: adultos Nome científico: Mus musculus Nome comum: house mouse Estadio de desenvolvimento: jovens
Campo(s) de utilização	utilização em interiores outro: Other Interior e na envolvente de edifícios.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: O produto é colocado em saquetas ou em grãos soltos, mas deve ser aplicado sempre em porta-iscos (aplicação de isco) devidamente rotulados. O produto pode ser fornecido em estações de isco seladas e não recarregáveis.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratos: porta-iscos com 50-100g de produto a cada 10m ² Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação: 50-100 g de isco por estação de isco, dependendo do grau de infestação. Se for necessário mais do que uma estação de isco, a distância mínima entre as estações de isco deverá ser de 5-10 metros.
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	O produto é colocado no mercado em saquetas individuais de 10, 20, 25, 50, 100 and 200g. As saquetas são fornecidas nas seguintes embalagens secundárias: - Saco ou bolsa: Descrição: sacos prefabricados ou sacos de produção em serie, termo selados. Material: PE ou PP ou PET ou LDPE ou PET/PET MET/PE ou PET/ALU/PE ou PET/PE ou PA/ PE. Conteúdo (peso líquido): de 50g a 5kg. Considerando um conteúdo detalhado: 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 g e 1,2, 2.5, 3, 5 kg

- Balde de plástico:
Descrição: balde selado rectangular ou cónico.
Material: HDPE ou PE ou PP
Conteúdo (peso líquido): de 50g a 5kg. Considerando um conteúdo detalhado: 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 g e 1,2, 2.5, 3, 5 kg

- Frasco:
Descrição: Frasco cónico selado
Material: HDPE ou PE ou PP ou PET ou PVC
Conteúdo (peso líquido): de 50g a 5kg. Considerando um conteúdo detalhado: 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 g e 1,2, 2.5, 3, 5 kg

- Saco de papel:
Descrição: Sacos de cartão prefabricados ou produzidos em serie, termo selados.
Material: Cartão + PET ou LDPE

Conteúdo (peso líquido): de 50g a 5kg. Considerando um conteúdo detalhado: 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 g e 1,2, 2.5, 3, 5 kg

Para além disso, o produto é colocado no mercado em grãos soltos nas embalagens secundárias/embalagens identificadas em cima.

NOTA:

- * PET / PETMET / PE é polietileno tereftalato, polietileno tereftalato metalizado e polietileno.
- * PET/ALU/PE é polietileno tereftalato, folha de polietileno e alumínio.
- * PET/PE é polietileno tereftalato, polietileno
- * PA/PE é poliamida e polietileno.

Em todos os casos, o material em contacto com o produto é polietileno (PE).

4.1.1. Instruções específicas de utilização

As estações de isco devem ser verificadas, pelo menos a cada 2 - 3 dias no início do tratamento até semanalmente, a fim de verificar os iscos consumidos pelos roedores, o estado de conservação das estações de isco e remover roedores mortos. Repor ou substituir os iscos sempre que necessário.

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.2. Descrição de utilizações

Tabela 2. Ratazanas - Público em geral (não profissional)

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: adultos Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: jovens
Campo(s) de utilização	utilização em interiores outro: Other Interior e na envolvente de edifícios.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: O produto é colocado no mercado em saquetas ou em grãos soltos, mas deve ser aplicado sempre em porta-iscos (aplicação de isco) devidamente rotulados. O produto pode ser fornecido em estações de isco seladas e não recarregáveis.

Frequência de aplicação e dosagem	<p>Taxa de aplicação: Ratazanas: estações de isco com 100-200 g de produto a cada 10m2</p> <p>Diluição (%): 0</p> <p>Número e calendário da aplicação:</p> <p>50-100 g de isco por estação de isco, dependendo do grau de infestação. Se for necessário mais do que uma estação de isco, a distância mínima entre as estações de isco deverá ser de 5-10 metros.</p>
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	<p>O produto é colocado no mercado em saquetas de plástico individuais de 10, 20, 25, 50, 100 e 200g.</p> <p>As saquetas são fornecidas nas seguintes embalagens secundárias:</p> <p>- Saco ou bolsa:</p> <p>Descrição: sacos prefabricados ou sacos de produção em serie, termo selados.</p> <p>Material: PE ou PP ou PET ou LDPE ou PET/PET MET/PE ou PET/ALU/PE ou PET/PE ou PA/ PE.</p> <p>Conteúdo (peso liquido): de 50g a 5kg. Considerando um conteúdo detalhado: 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 g e 1,2, 2.5, 3, 5 kg</p> <p>- Balde de plástico:</p> <p>Descrição: balde selado rectangular ou cónico.</p> <p>Material: HDPE ou PE ou PP</p> <p>Conteúdo (peso liquido): de 50g a 5kg. Considerando um conteúdo detalhado: 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 g e 1,2, 2.5, 3, 5 kg</p> <p>- Frasco:</p> <p>Descrição: Frasco cónico selado</p> <p>Material: HDPE ou PE ou PP ou PET ou PVC</p> <p>Conteúdo (peso liquido): de 50g a 5kg. Considerando um conteúdo detalhado: 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 g e 1,2, 2.5, 3, 5 kg</p> <p>- Saco de papel:</p> <p>Descrição: Sacos de cartão prefabricados ou produzidos em serie, termo selados.</p> <p>Material: Cartão + PET ou LDPE</p> <p>Conteúdo (peso liquido): de 50g a 5kg. Considerando um conteúdo detalhado: 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 g e 1,2, 2.5, 3, 5 kg</p>

Para além disso, o produto é colocado no mercado em grãos soltos nas embalagens secundárias/embalagens identificadas em cima.
NOTA:

- * PET / PETMET / PE é polietileno tereftalato, polietileno tereftalato metalizado e polietileno.
 - * PET/ALU/PE é polietileno tereftalato, folha de polietileno e alumínio.
 - * PET/PE é polietileno tereftalato, polietileno
 - * PA/PE é poliamida e polietileno.
- Em todos os casos, o material em contacto com o produto é polietileno (PE).

4.2.1. Instruções específicas de utilização

As estações de isco devem ser verificadas, pelo menos a cada 5 - 7 dias no início do tratamento até semanalmente, a fim de verificar os iscos consumidos pelos roedores, o estado de conservação das estações de isco e remover roedores mortos. Repor ou substituir os iscos sempre que necessário.

4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Consultar a secção 5, instruções de utilização.

Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO¹

5.1. Instruções de utilização

- Antes de usar o produto, ler atentamente o rótulo e seguir as instruções apresentadas.
- Antes da utilização do produto, devem ser considerados métodos de controlo não químicos, por exemplo: ratoeiras

- Remover o alimento facilmente alcançável pelos roedores (por exemplo, grãos ou resíduos de alimentos). Para além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, pois perturba a população de roedores e dificulta o consumo dos iscos.
- As estações de isco devem ser colocadas nas zonas próximas onde a actividade do roedor foi observada (por exemplo, caminhos, locais de nidificação, buracos, tocas etc.).
- Se possível, as estações de isco devem ser fixas ao pavimento ou outra estrutura.

- Não abrir as saquetas com isco.
- Colocar as estações de isco fora do alcance das crianças, pássaros, animais de estimação ou outros animais não-alvo do produto.
- Colocar as estações de isco afastado de alimentos, bebidas, rações, assim como de utensílios ou superfícies que possa estar em contacto.

- Não colocar estações de isco perto de sistema de drenagem de água onde possa entrar em contacto com água.
- Durante o manuseamento do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e as áreas de pele expostas, após aplicação do produto.
- Remover o restante isco ou estações de isco no final do tratamento.
- Deve evitar-se a utilização em áreas onde existam evidências de resistência à substância activa.

- O tratamento deve ser alternado com outros de diferentes substâncias activas, de forma a evitar resistências e resistências cruzadas nos roedores.
- Rodenticidas anticoagulantes autorizados para público em geral devem ser utilizados em estações de isco invioláveis da categoria 1, para utilização interior e na envolvente de edifícios. Categoria 2 para produtos autorizados para o interior, garantindo que a estação de isco se mantém seca e intacta.

5.2. Medidas de redução do risco

- Considerar medidas de controlo preventivo (tapar aberturas, remover alimentos e bebidas para o mais longe possível), melhorando a ingestão do produto e reduzir uma re-infestação.
- Não utilizar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes (por exemplo, para prevenir o aparecimento de roedores ou detectar a actividade de roedores)
- A informação do produto (rótulo e/ou folheto) deve apresentar claramente o seguinte:
 - o produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis (p.e: "usar em estações de isco invioláveis").
 - os utilizadores devem rotular devidamente as estações de isco com a informação do ponto 5.3 do SPC (p.e: "rotular as estações de isco de acordo com as recomendações do produto")

- A utilização deste produto deve eliminar os roedores em 35 dias. A informação do produto (rotulo e/ou folheto) deverá recomendar que em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (isto é, continua a observar-se actividade de roedores), o utilizador deverá consultar o fornecedor do produto ou serviço de controlo de pragas.

- Os roedores mortos devem ser removidos a intervalos frequentes durante o tratamento, pelo menos quando as estações de isco são verificadas e/ou substituídas.

¹As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

-
- eliminar os roedores mortos em conformidade com a regulamentação em vigor.
 - O produto contém um agente amargante e um corante.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- O produto contém uma substância anticoagulante. Se ingerido, os sintomas podem ser retardados, podendo incluir hemorragia nasal e das gengivas. Em situações mais graves, pode surgir sangramento nas fezes e na urina.

- **Antídoto: Vitamina K1** administrada pelo médico/veterinário.

- Em caso de:

- Contacto com a pele, lavar a pele com água e de seguida com água e sabão.

- Contacto com os olhos, lavar os olhos com água, manter as pálpebras abertas pelos menos 10 minutos. Não esquecer de retirar as lentes de contacto, se tal lhe for possível.

- Em caso de ingestão, lavar com água abundante. Nunca dar nada na boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Se ingerido, procurar ajuda médica imediata e mostrar a embalagem ou o rótulo do produto. Contactar um veterinário em caso de ingestão por um animal.

NÃO DEIXAR O INTOXICADO SOZINHO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.

SE NECESSÁRIO ACONSELHAMENTO MÉDICO, TENHA DISPONÍVEL O RÓTULO OU A EMBALAGEM DO PRODUTO E CONSULTE O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (TEL: 808250143)

- Sintomas: Diátese hemorrágica, derivado do efeito antiprotrombina - tempo prolongado da protrombina- que pode ser evidente num prazo mínimo de 24 horas e um máximo de 72 horas (tempo de protrombina normal após ingestão, não exclui o diagnóstico).

- No contacto com o Centro de Informação Antivenenos, informar o nº de autorização do produto, o nome comercial do produto e a substância activa. Se possível, providenciar uma cópia do rótulo ou da ficha de dados de segurança.

- As estações de isco devem ser rotuladas com a seguinte informação: " Não mover ou abrir"; " Contem rodenticida"; " Nome e autorização do produto"; "identificação da substância activa"; e " Em caso de incidente contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808250143)".

- Perigoso para a vida selvagem.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

- No final do tratamento, eliminar os iscos não consumidos e a embalagem em conformidade com a regulamentação em vigor.

- Recomenda-se o uso de luvas de protecção.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

- Armazenar o produto na sua embalagem original, fechada, em local seco, fresco e bem ventilado.
- Manter a embalagem fechada e afastada da luz solar directa.
- Manter afastado das crianças, pássaros, animais domésticos e outros animais.
- O produto biocida é estável durante 24 meses.

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

- Devido ao seu modo de ação demorado, os rodenticidas anticoagulantes levam 4 a 10 dias para ser eficaz após o consumo do isco.
- Os roedores podem ser portadores de doenças. Não mexer nos roedores mortos com as mãos, usar luvas de protecção ou outras ferramentas, se disponíveis.
- O produto contém um agente amargante e um corante.