

PT

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)

MAKI PAT'

Tipo(s) de produto

PT14: Rodenticidas

Número de autorização: PT/DGS ARMPB-rnl-61/2018

Número da decisão de autorização R4BP: PT-0005264-0000

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	MAKI PAT'
-----------------------------------	-----------

1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	LIPHATECH
	Endereço	Bonnel - CS 10005 47480 Pont Du Casse França
Número de autorização	PT/DGS ARMPB-rnl-61/2018	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0005264-0000	
Data da autorização	02/11/2012	
Data de caducidade da autorização	31/12/2026	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	LIPHATECH S.A.S
Endereço do fabricante	Bonnel BP3 47480 PONT DU CASSE França
Localização das instalações de fabrico	Production centre, avenue Jean Serres, ZA Malère 47480 PONT DU CASSE França

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Bromadiolona
Nome do fabricante	LIPHATECH S.A.S
Endereço do fabricante	Bonnel BP3 47480 PONT DU CASSE França
Localização das instalações de fabrico	LIPHATECH S.A.S at AlzChem Trostberg GmbH - Chemie Park Trostberg - Dr Albert Frank strasse 32 83308 Trostberg Alemanha

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Bromadiolona	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substância ativa	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	H360D: Pode afetar o nascituro. H372: Afeta os órgãos blood após exposição prolongada ou repetida ..
Recomendações de prudência	P201: Pedir instruções específicas antes da utilização. P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280: Usar luvas de proteção. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P501: Eliminar conteúdo em conformidade com os requisitos locais. P501: Eliminar recipiente em conformidade com os requisitos locais ..

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

4.1. Descrição de utilizações

Tabela 1. Utilização 1 – Ratos domésticos e/ou ratazanas (ratos) – profissionais especializados – interior, exterior em redor de edifícios, áreas abertas exteriores e aterros sanitários

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Mus musculus</i> Nome comum: outro: rato doméstico Estádio de desenvolvimento: outro: Juvenis e adultos Nome científico: <i>Rattus norvegicus</i> Nome comum: outro: Rato castanho - ratazana Estádio de desenvolvimento: outro: juvenis e adultos Nome científico: <i>Rattus rattus</i> Nome comum: outro: ratazana preta Estádio de desenvolvimento: outro: juvenis e adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores utilização no exterior outro: Outro Interior: Ratos e ratazanas Exterior em redor de edifícios: Ratos e ratazanas Áreas abertas exteriores: Ratos e ratazanas Aterros sanitários a céu aberto: Rato castanho
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis Aplicação direta de isco pronto a utilizar na toca
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ver número e calendário da aplicação Número e calendário da aplicação: Rato: 30 - 50 g de isco por estação de isco / por toca Ratazana: 100 - 200 g de isco por estação de isco / por toca Utilização permanente de isco: A utilização permanente de isco está estritamente limitada a locais com elevado potencial de nova invasão quando tiver sido demonstrado que outros métodos de controlo são insuficientes.
Categoria(s) de utilizadores	profissional com formação
Capacidade e material da embalagem	saqueta de papel / PP: 20 a 40 g de pasta adicional embalada em: Balde PP com tampa de 3 a 21 kg Caixa de cartão com saco de plástico integral (PP / PE) 3 a 25 kg Bolsa de plástico (PP / PE) 3 a 20 kg

Cartão contendo estações de iscas PP / HDPE / PS pré-embaladas 3 a 10 kg

4.1.1. Instruções específicas de utilização

Remover o produto remanescente no final do período de tratamento.(exceto quando usado para iscas permanentes)

O produto deve ser colocado nas imediações de locais onde a atividade de roedores foi previamente explorada (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, confinamentos, buracos, tocas etc.).

A frequência das visitas à área tratada deve ficar a critério do operador, à luz da pesquisa realizada no início do tratamento. Essa frequência deve ser coerente com as recomendações fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

- Utilização permanente de isco: - Sempre que possível, recomenda-se que a área tratada seja inspecionada a cada 4 semanas, no máximo, a fim de evitar a seleção de uma população resistente.

Uso exterior (em redor de edifícios, áreas abertas exteriores e aterros sanitários)

Proteger o isco das condições atmosféricas. Colocar os pontos de isco em áreas não sujeitas a inundações. Substituir o isco nos pontos em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

Utilização em tocas:

As iscas devem ser colocadas para minimizar a exposição a espécies não-alvo e crianças. Cubra ou bloqueie as entradas de tocas com iscas para reduzir os riscos da isca ser rejeitada e derramada. [Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes (por exemplo, utilizadores da área tratada e das suas imediações) sobre a campanha de controlo de roedores [em conformidade com o código de boas práticas aplicável, se existir].

A utilização permanente de isco está estritamente limitada a locais com elevado potencial de nova invasão quando tiver sido demonstrado que outros métodos de controlo são insuficientes.

A estratégia de isco permanente deve ser revista periodicamente no contexto da gestão integrada de pragas e da avaliação do risco de nova infestação.

Não utilizar o produto em tratamentos por pulsed baiting.

A informação do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem mostrar claramente que o produto não deve ser fornecido ao público em geral (por exemplo, «reservado a profissionais especializados»).

Não use em áreas onde possa haver suspeita de resistência à substância ativa.

Os produtos não devem ser utilizados durante mais de 35 dias sem uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento [exceto quando usado para iscas permanentes].

Não alternar a utilização de anticoagulantes diferentes, de potência comparável ou mais fraca, para efeitos de gestão da resistência. Para utilização alternada recorra-se antes a um rodenticida não-anticoagulante, caso esteja disponível, ou a um anticoagulante mais potente.

Não lavar com água, entre as aplicações, as estações de isco ou utensílios usados em pontos de engodo cobertos e protegidos.

Para uso em e ao redor de edifícios

Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.

4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente **Para uso em interior**

Ao colocar pontos de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

Para uso exterior em redor de edifícios, Áreas abertas exteriores e aterros sanitários

Ao colocar pontos de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

4.2. Descrição de utilizações

Tabela 2. Utilização 2 – Ratos domésticos – profissionais especializados – interior, exterior em redor de edifícios, áreas abertas exteriores

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Mus musculus</i> Nome comum: outro: rato doméstico Estádio de desenvolvimento: outro: Juvenis e adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores utilização no exterior outro: Outro Interior Exterior em redor de edifícios Áreas abertas exteriores
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis Aplicação direta de isco pronto a utilizar na toca

Frequência de aplicação e dosagem	<p>Taxa de aplicação: Ver número e calendário da aplicação</p> <p>Número e calendário da aplicação: Rato: 30 - 50 g de isco por estação de isco / por toca.</p> <p>A utilização permanente de isco está estritamente limitada a locais com elevado potencial de nova invasão quando tiver sido demonstrado que outros métodos de controlo são insuficientes.</p>
Categoria(s) de utilizadores	profissional com formação
Capacidade e material da embalagem	<p>saqueta de papel / PP: 10 a 15 g de pasta adicional embalada em:</p> <p>Balde PP com tampa de 3 a 21 kg Caixa de cartão com saco de plástico integral (PP / PE) 3 a 25 kg Bolsa de plástico (PP / PE) 3 a 20 kg Cartão contendo estações de iscas PP / HDPE / PS pré-embaladas 3 a 10 kg</p>

4.2.1. Instruções específicas de utilização

Remover o produto remanescente no final do período de tratamento. (exceto quando usado para iscas permanentes)

O produto deve ser colocado nas imediações de locais onde a atividade de roedores foi previamente explorada (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, confinamentos, buracos, tocas etc.).

A frequência das visitas à área tratada deve ficar a critério do operador, à luz da pesquisa realizada no início do tratamento. Essa frequência deve ser coerente com as recomendações fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

Uso em isco permanente

Sempre que possível, recomenda-se que a área tratada seja inspecionada a cada 4 semanas, no máximo, a fim de evitar a seleção de uma população resistente.

Uso exterior (em redor de edifícios, áreas abertas exteriores e aterros sanitários)

Proteger o isco das condições atmosféricas. Colocar os pontos de isco em áreas não sujeitas a inundações. Substituir o isco nos pontos em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

Utilização em tocas:

As iscas devem ser colocadas para minimizar a exposição a espécies não-alvo e crianças. Cubra ou bloqueie as entradas de tocas com iscas para reduzir os riscos da isca ser rejeitada e derramada.

[Quando disponível] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover os roedores mortos durante o tratamento a intervalos frequentes, de acordo com as recomendações fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

A isca permanente é estritamente limitada a locais com alto potencial de reinvasão quando outros métodos de controle se mostraram insuficientes.

A estratégia permanente de isco será revista periodicamente no contexto da gestão integrada de pragas (MIP) e da avaliação do risco de reinfestação.

A informação relativa ao produto (por exemplo, rótulo e/ou folheto) deve indicar claramente que o produto deve ser fornecido apenas a utilizadores profissionais qualificados que possam comprovar através de certificação que cumprem os requisitos de formação aplicáveis (por exemplo, «apenas para profissionais qualificados»).

Não usar em locais onde a resistência à substância ativa pode ser suspeita.

Não alternar a utilização de anticoagulantes diferentes, de potência comparável ou mais fraca, para efeitos de gestão da resistência. Para utilização alternada recorra-se antes a um rodenticida não-anticoagulante, caso esteja disponível, ou a um anticoagulante mais potente.

Não lavar com água, entre as aplicações, as estações de isco ou utensílios usados em pontos de engodo cobertos e protegidos.

Não utilizar o produto em tratamentos por pulsed baiting.

Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias.

Para uso em e ao redor de edifícios

Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.

4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Para uso em interior

Ao colocar pontos de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

Para uso exterior em redor de edifícios, Áreas abertas exteriores e aterros sanitários

Ao colocar pontos de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

4.3. Descrição de utilizações

Tabela 3. Utilização 3 – Ratos domésticos e/ou ratazanas (ratos) – profissionais – interior, exterior em redor de edifícios

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Mus musculus</i> Nome comum: outro: rato doméstico Estádio de desenvolvimento: outro: Juvenis e adultos Nome científico: <i>Rattus norvegicus</i> Nome comum: outro: Rato castanho - ratazana Estádio de desenvolvimento: outro: juvenis e adultos Nome científico: <i>Rattus rattus</i> Nome comum: outro: ratazana preta Estádio de desenvolvimento: outro: juvenis e adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores utilização no exterior outro: Outro Interior Exterior em redor de edifícios
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ver número e calendário de aplicação Número e calendário da aplicação: Rato: 30 - 50 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 1 - 3 metros. Ratazana: 100 - 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 4 - 10 metros.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	saqueta de papel / PP: 20 a 40 g de pasta adicional embalada em: Balde PP com tampa de 3 a 21 kg Caixa de cartão com saco de plástico integral (PP / PE) 3 a 25 kg Bolsa de plástico (PP / PE) 3 a 20 kg

Cartão contendo estações de iscas PP / HDPE / PS pré-embaladas 3 a 10 kg

4.3.1. Instruções específicas de utilização

Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.

As estações de isco devem ser colocadas na vizinhança imediata de locais onde tenha sido observada anteriormente atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.).

As estações de isco devem ser visitadas [no caso de ratos - pelo menos, 2 a 3 dias no] [no caso de ratazanas - apenas 5 a 7 dias após o] início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar os corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

Remover o isco restante ou as estações de isco no final do período de tratamento.

Uso exterior (em redor de edifícios)

Proteger o isco das condições atmosféricas (por exemplo, chuva, neve, etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações..

Substituir o isco nos pontos em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

4.3.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.3.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover roedores mortos a intervalos frequentes durante o tratamento (por exemplo, pelo menos, duas vezes por semana).

Os produtos não devem ser utilizados durante mais de 35 dias sem uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento.

Não utilizar iscos que contenham substâncias ativas anticoagulantes como iscos permanentes para a prevenção de infestações de roedores ou para a monitorização de atividades de roedores.

A informação do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem mostrar claramente que:

- o produto não deve ser fornecido ao público em geral (por exemplo, «reservado a profissionais»).
- o produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis adequadas (por exemplo, «utilizar apenas em estações de isco invioláveis»).
- os utilizadores devem rotular adequadamente as estações de isco com as informações referidas na secção 5.3 do Resumo das Características do Produto (SPC) (por exemplo, «rotular as estações de isco em conformidade com as recomendações do produto»).

Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias.

As informações do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem recomendar claramente que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, ainda é observável atividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço de controlo de pragas. Não lavar as estações de isco com água entre as aplicações.

Não aplicar este produto diretamente nas tocas.

4.3.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Para uso em interior

Ao colocar pontos de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

Para uso exterior em redor de edifícios

Ao colocar pontos de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

4.3.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

4.3.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

4.4. Descrição de utilizações

Tabela 4. Utilização 4 – Ratos domésticos - profissionais – interior, exterior em redor de edifícios

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Mus musculus Nome comum: outro: rato doméstico Estádio de desenvolvimento: outro: Juvenis e adultos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores utilização no exterior outro: Outro Interior Exterior em redor de edifícios
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ver número e calendário de aplicação Número e calendário da aplicação: Rato: 30 - 50 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 1 - 3 metros.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	saqueta de papel / PP: 10 a 15 g de pasta adicional embalada em: Balde PP com tampa de 3 a 21 kg

Caixa de cartão com saco de plástico integral (PP / PE) 3 a 25 kg Bolsa de plástico (PP / PE) 3 a 20 kg Cartão contendo estações de iscas PP / HDPE / PS pré-embaladas 3 a 10 kg
--

4.4.1. Instruções específicas de utilização

Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.

As estações de isco devem ser colocadas na vizinhança imediata de locais onde tenha sido observada anteriormente atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.).

As estações de isco devem ser visitadas no caso de ratos pelo menos, 2 a 3 dias após o início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar os corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

Remover o isco restante ou as estações de isco no final do período de tratamento.

Uso exterior (em redor de edifícios)

Proteger o isco das condições atmosféricas (por exemplo, chuva, neve, etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações..

Substituir o isco nos pontos em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

4.4.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.4.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover roedores mortos a intervalos frequentes durante o tratamento (por exemplo, pelo menos, duas vezes por semana).

Não utilizar iscos que contenham substâncias ativas anticoagulantes como iscos permanentes para a prevenção de infestações de roedores ou para a monitorização de atividades de roedores.

A informação do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem mostrar claramente que:

- o produto não deve ser fornecido ao público em geral (por exemplo, «reservado a profissionais»).
- o produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis adequadas (por exemplo, «utilizar apenas em estações de isco invioláveis»).
- os utilizadores devem rotular adequadamente as estações de isco com as informações referidas na secção 5.3 do Resumo das Características do Produto (SPC) (por exemplo, «rotular as estações de isco em conformidade com as recomendações do produto»).

Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias. As informações do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem recomendar claramente que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, ainda é observável atividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço de controlo de pragas.

Não lavar as estações de isco com água entre as aplicações.

Não aplicar este produto diretamente nas tocas.

4.4.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente
Para uso em interior

Ao colocar pontos de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

Para uso exterior em redor de edifícios

Ao colocar pontos de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

4.4.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

4.4.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO¹

5.1. Instruções de utilização

Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda.

Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares). Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que tal apenas perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.

Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.

Os rótulos das estações de isco devem mostrar claramente que as estações contêm rodenticidas e que não devem ser movidas ou abertas.

Efetuar uma inspeção preliminar da área infestada e uma avaliação no local a fim de identificar as espécies de roedores e os seus locais de atividade e determinar a causa provável e a dimensão da infestação.

O produto deve ser utilizado apenas como parte de um sistema de gestão integrada de pragas, incluindo, nomeadamente, medidas de higiene e, se possível, métodos físicos de controlo.

[If national policy or legislation require it] Quando o produto for utilizado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve existir junto aos iscos um aviso explicativo do risco de envenenamento primário ou secundário através do anticoagulante, bem como a indicação das primeiras medidas a tomar em caso de envenenamento.

O isco deve ser protegido de modo a não poder ser arrastado da estação de isco.

Colocar o produto fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia e de criação e outros animais não visados.

Colocar o produto longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.

Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (o material das luvas deve ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto). Se for caso disso, especificar qualquer outro equipamento de proteção individual (por exemplo, óculos ou máscara) exigido para o manuseamento do produto.

[IF AVAILABLE] Seguir as instruções suplementares fornecidas pelo código de boas práticas pertinente.

Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto.

Se a dosagem do isco for baixa relativamente à dimensão aparente da infestação, considerar a colocação de estações de isco em mais locais e a possibilidade de mudar para outra formulação de isco.

Se, após um período de tratamento de 35 dias, os iscos continuarem a ser consumidos e não se registar um declínio na atividade dos roedores, a causa provável deve ser determinada. Nos casos em que tenham sido excluídos outros elementos, é provável que existam roedores resistentes, pelo que deve ser considerada a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se possível, ou de um rodenticida anticoagulante mais potente. Considerar ainda a utilização de ratoeiras como uma medida de controlo alternativa.

Não abrir as saquetas que contêm o isco.

5.2. Medidas de redução do risco

Os produtos não devem ser utilizados durante mais de 35 dias sem uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento [...].

Não utilizar o produto em tratamentos por pulsed baiting.

Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes sobre a campanha de controlo de roedores [em conformidade com o código de boas práticas aplicável, se existir].

Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais.

¹As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Este produto contém uma substância anticoagulante. Em caso de ingestão, os sintomas (que podem demorar a manifestar-se) podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas. Em casos graves, podem surgir hematomas e presença de sangue nas fezes ou na urina.

Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário.

Em caso de:

- Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.
- Exposição ocular, lavar os olhos com água ou solução para lavar os olhos, manter as pálpebras abertas durante, pelo menos, 10 minutos.
- Exposição oral, lavar cuidadosamente a boca com água.

Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar o recipiente ou o rótulo do produto. Contactar um cirurgião veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia.

As estações de isco devem ser rotuladas com as informações seguintes: «não mover ou abrir»; «contém um rodenticida»; «nome do produto ou número de autorização»; «substância(s) ativa(s)» e «em caso de incidente, contactar um centro de informação antivenenos "Centro de Informação Anti-venenos" 808 250 143 ou o 112».

Perigoso para a vida selvagem.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

No final do tratamento, eliminar o isco não consumido e a embalagem, em conformidade com os requisitos locais. [The method of disposal shall be described specifically in the national SPC and be reflected on the product label].

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazenar num local seco, fresco e bem ventilado. Manter o recipiente fechado e ao abrigo da luz solar direta. Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação.

Prazo de validade: 2 anos

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Devido ao seu modo de ação retardado, os rodenticidas anticoagulantes demoram 4 a 10 dias a ser eficazes após o consumo do isco.

Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar em roedores mortos com as mãos nuas, utilizar luvas ou utilizar ferramentas (por exemplo, pinças) ao eliminá-los.

Este produto contém um agente amargo e um corante.