

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Dip es lo-foam

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

Numărul curent: EU-0018724-0000

Numărul curent R4BP 3: EU-0018724-0007

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	3
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	3
2.2. Tipul preparatului	3
3. Fraze de pericol și de precauție	3
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	10
5.1. Instrucțiuni de utilizare	10
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	10
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	10
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	11
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	11
6. Alte informații	11

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Dip es lo-foam
Dip es lo-foam 1.4
Iod-Dip lo-foam
BaktoStop foam

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	CVAS Development GmbH
	Adresa	Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Germania
Numărul curent	EU-0018724-0000 1-6	

Numărul curent R4BP 3	EU-0018724-0007
Data autorizației	18/12/2018
Data de expirare a autorizației	30/11/2028

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Adresa producătorului	Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Germania
Adresa locurilor de producție	Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Germania

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	1319 - Iod
Numele producătorului	Cosayach Nitratos S.A.
Adresa producătorului	Amunategui 178 not applicable Santiago Chile
Adresa locurilor de producție	S.C.M. Cosayach Cala Cala not applicable Pozo Almonte Chile

Substanța activă	1319 - Iod
Numele producătorului	ACF Minera S.A.
Adresa producătorului	San Martin No 499 not applicable Iquique Chile
Adresa locurilor de producție	Lagunas mine not applicable Pozo Almonte Chile

Substanța activă	1319 - Iod
Numele producătorului	SQM S.A.
Adresa producătorului	Los Militares 4290, Piso 4 not applicable Las Condes Chile
Adresa locurilor de producție	Nueva Victoria plant not applicable Pedro de Valdivia plant Chile

Substanța activă	1319 - Iod
Numele producătorului	Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd
Adresa producătorului	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japonia
Adresa locurilor de producție	2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japonia

Substanța activă	1319 - Iod
Numele producătorului	Norkem Limited (manufacturer of PVP-iodine)
Adresa producătorului	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Regatul Unit

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,14
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

2.2. Tipul preparatului

AL - Orice alt lichid

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol	
Fraze de precauție	<p>Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.</p> <p>A nu se lăsa la îndemâna copiilor.</p>

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Utilizarea nr. 6.1 – Dezinfectarea mamelonului animalelor de lapte: Dezinfectarea mamelonului înainte de mulgere cu agent spumant manual

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: Celule vegetative denumirea științifică: Levuri denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: Celule vegetative
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea mamelonului animalelor de lapte (vacă de lapte) înainte de mulgere
Metoda (metodele) de aplicare	Curățare manuală cu agent spumant prin folosirea unui recipient cu agent spumant - Consultați instrucțiunile de utilizare
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Vaci: 5 ml per tratament - 0% - Aplicare înainte de mulgere: 2-3 ori/zi (înainte de fiecare muls)
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră (HDPE): 5 – 60 kg Bidon (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Produsul trebuie să fie adus la o temperatură de peste 20°C înainte de utilizare.
Este recomandată utilizarea unei pompe de dozare pentru introducerea produsului în dispozitivul de aplicare.
Umpleți rezervorul cu produsul RTU ținând cont de 5 ml de produs per vacă și fixați recipientul cu agent spumant în partea de sus.
Evitați evacuarea lichidelor în exces.
Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință înainte de dezinfectarea prealabilă mulgerii.
Înainte de mulgere, strângeți de rezervor și așezați recipientul cu agent spumant peste fiecare mamelon din partea de jos.

asigurându-vă că aprox. 3 cm din mamelon este introdus în agentul dezinfectant.
Lăsați produsul să acționeze la nivelul mameloanelor timp de cel puțin 60 de secunde.
Reumpleți recipientul unității de spumare cu dezinfectant proaspăt strângând de rezervor, după caz. Reumpleți rezervorul cu dezinfectant proaspăt după caz.
Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.
După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul cu agent spumant, clătind cu apă.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfectarea prealabilă și ulterioară mulgerii în combinație. Totuși, nu trebuie utilizat în combinație cu un produs diferit pe bază de iod

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Utilizarea nr. 6.2 – Dezinfectarea mamelonului animalelor de lapte: Dezinfectarea mamelonului după mulgere cu agent spumant manual

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacterii
denumirea comună: Bacterii
etapă de dezvoltare: Celule vegetative

denumirea științifică: Levuri
denumirea comună: Levuri
etapă de dezvoltare: Celule vegetative

Domeniul de utilizare

de interior

Dezinfectarea mamelonului animalelor de lapte (vacile de lapte) după mulgere

Metoda (metodele) de aplicare	<p>Curățare manuală cu agent spumant prin folosirea unui recipient cu agent spumant -</p> <p>Consultați instrucțiunile de utilizare</p>
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Vaci: 5 ml per tratament - 0% -</p> <p>Aplicare după mulgere: 2–3 ori/zi (după fiecare muls)</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>profesional</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Canistră (HDPE): 5 – 60 kg</p> <p>Bidon (HDPE): 60 – 200 kg</p> <p>IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Produsul trebuie să fie adus la o temperatură de peste 20°C înainte de utilizare.
Este recomandată utilizarea unei pompe de dozare pentru introducerea produsului în dispozitivul de aplicare.
Umpleți rezervorul cu produsul RTU ținând cont de 5 ml de produs per vacă și fixați recipientul cu agent spumant în partea de sus.
Evitați evacuarea lichidelor în exces.
Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință imediat înainte de mulgere.
După mulgere, strângeți de rezervor și așezați recipientul cu agent spumant peste fiecare mamelon din partea de jos, asigurându-vă că aprox. 3 cm din mamelon este introdus în agentul dezinfectant.
Reumpleți recipientul unității de spumare cu dezinfectant proaspăt strângând de rezervor, după caz. Reumpleți rezervorul cu dezinfectant proaspăt după caz.
Lăsați produsul să acționeze la nivelul mameloanelor până la următoarea mulgere. Asigurați-vă că animalele rămân în picioare timp de minim 5 minute după tratament.
După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul cu agent spumant, clătind cu apă.

4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfectarea prealabilă și ulterioară mulgerii în combinație. Totuși, nu trebuie utilizat în combinație cu un produs diferit pe bază de iod.

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Utilizarea nr. 6.3 – Dezinfectarea mamelonului animalelor de lapte: Dezinfectarea mamelonului după mulgere cu agent spumant automat

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: Celule vegetative denumirea științifică: Levuri denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: Celule vegetative
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea mamelonului animalelor de lapte (vacile de lapte) după mulgere
Metoda (metodele) de aplicare	Spumare automată - Consultați instrucțiunile de utilizare
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Vaci: 5 ml per tratament - 0% - Aplicare după mulgere: 2–3 ori/zi (după fiecare muls)
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră (HDPE): 5 – 60 kg Bidon (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Produsul trebuie să fie adus la o temperatură de peste 20°C înainte de utilizare.

Deschideți un recipient care conține produsul RTU și introduceți un tub de aspirație al sistemului de spumare automată. Evitați evacuarea lichidelor în exces.

După mulgere, alimentarea cu vacuum este oprită și dezinfectantul pentru mamelon este injectat într-o galerie la nivelul piesei de prindere. Mamelonele sunt acoperite cu aprox. 5 ml de agent spumant când recipientul cu agent spumant este retras de funcția de îndepărtare automată a grupului de manșoane de muls (ACR). După îndepărtarea ACR, fiecare garnitură a sistemului de spumare automată este clătită bine cu apă și este uscată cu aer comprimat.

Într-un pas final de curățare, după fiecare mulgere a cirezii, garniturile sunt dezinfectate (de exemplu, cu produs pe bază de clor) și sunt uscate din nou cu aer comprimat.

Lăsați produsul să acționeze la nivelul mameloanelor până la următoarea mulgere. Asigurați-vă că animalele rămân în picioare timp de minim 5 minute după tratament.

Ulterior, sistemul de mulgere este pregătit pentru următorul muls.

Întregul proces este automatizat.

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfectarea prealabilă și ulterioară mulgerii în combinație. Totuși, nu trebuie utilizat în combinație cu un produs diferit pe bază de iod.

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Utilizarea nr. 6.4 – Dezinfectarea mamelonului animalelor de lapte: Dezinfectarea mamelonului înainte și după mulgere cu agent spumant manual

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: Celule vegetative denumirea științifică: Levuri denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: Celule vegetative
Domeniul de utilizare	de interior Dezinfectarea mamelonului animalelor de lapte (vaci de lapte) înainte și după mulgere
Metoda (metodele) de aplicare	Curățare manuală cu agent spumant prin folosirea unui recipient cu agent spumant - Consultați instrucțiunile de utilizare
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Vaci: 5 ml per tratament - 0% - Utilizarea înainte și după mulgere: 4-6 ori pe zi (înainte și după fiecare muls)
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră (HDPE): 5 – 60 kg Bidon (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Produsul trebuie să fie adus la o temperatură de peste 20°C înainte de utilizare.
Este recomandată utilizarea unei pompe de dozare pentru introducerea produsului în dispozitivul de aplicare.
Umpleți rezervorul cu produsul RTU ținând cont de 5 ml de produs per vacă și fixați recipientul cu agent spumant în partea de sus.
Evitați evacuarea lichidelor în exces.
Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu un șervețel din hârtie/lavetă de unică folosință înainte de dezinfectarea prealabilă mulgerii.
Înainte de mulgere, strângeți de rezervor și așezați recipientul cu agent spumant peste fiecare mamelon din partea de jos, asigurându-vă că aprox. 3 cm din mamelon este introdus în agentul dezinfectant.
Lăsați produsul să acționeze la nivelul mameloanelor timp de cel puțin 60 de secunde.

Curățați mameloanele cu grijă, ștergându-le cu o lavetă imediat înainte de mulgere. După mulgere, repetați procedura de dezinfectare aplicând agentul spumant conform descrierii anterioare.
Reumpleți recipientul unității de imersiune cu dezinfectant proaspăt strângând de rezervor, după caz. Reumpleți rezervorul cu dezinfectant proaspăt după caz.
Lăsați produsul să acționeze la nivelul mameloanelor până la următoarea mulgere. Asigurați-vă că animalele rămân în picioare timp de minim 5 minute după tratament.
După dezinfectare, goliți rezervorul și curățați rezervorul și recipientul de imersiune, clătind cu apă.

4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfectarea prealabilă și ulterioară mulgerii în combinație. Totuși, nu trebuie utilizat în combinație cu un produs diferit pe bază de iod.

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Consultați instrucțiunile specifice de utilizare.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Consultați măsurile specifice de reducere a riscurilor.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Menționate în fișa tehnică de securitate

Descrierea măsurilor de prim ajutor

După inhalare: Asigurați alimentarea cu aer proaspăt; adresați-vă unui medic în cazul unor simptome.

După contactul cu pielea: Spălați imediat pielea cu apă și săpun, și clătiți bine.

După contactul cu ochii: Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute cu apă curentă (timp de minim 15 minute).

După ingerare: Clătiți cavitatea bucală și apoi beți multă apă. Contactați imediat medicul.

Dacă este necesar sfatul medical, trebuie să aveți la îndemână un recipient sau o etichetă a produsului.

Stabilitate și reactivitate

Reactivitate: Fără reacții periculoase cunoscute.

Stabilitate chimică: Produsul este stabil chimic în condiții normale de mediu (temperatură ambiantă).

Posibilitate de reacții periculoase: În cazul utilizării indicate, nu sunt așteptate reacții periculoase.

Condiții de evitat: Nestabile.

Materiale incompatibile: Nestabile.

Produse de descompunere periculoase: Fără produse de descompunere periculoase cunoscute.

Măsuri împotriva pierderilor accidentale

Măsuri de protecție a persoanelor, echipamente de protecție și proceduri de urgență:

Purtați echipament de protecție.

Asigurați ventilație adecvată.

Mențineți sursele de aprindere la distanță - Fumatul interzis.

Măsuri de protecție a mediului: Nu lăsați ca produsul să se scurgă în canalizare, ape de suprafață sau ape subterane.

Metode și materiale de reținere și curățare: Absorbiți cu materiale absorbante de lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, lianți universali, rumeguș). Eliminați materialul adunat în conformitate cu reglementările.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Menționate în fișa tehnică de securitate

Metode de tratare a deșeurilor: deșeuri periculoase (AVV). Nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile domestice. Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare. Trebuie să fie tratat special conform reglementărilor oficiale.

La finalul tratamentului, eliminați produsul neutilizat și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Produsul utilizat poate fi eliminat în sistemul de canalizare municipal sau eliminat în depozitul de gunoi de grajd în funcție de cerințele locale. Evitați eliberarea într-o instalație individuală de tratare a apei reziduale.

Agent de curățare recomandat: Apă, dacă este necesar, detergent.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Perioada de valabilitate: 18 luni

Produsele trebuie să fie protejate de îngheț, păstrate la temperaturi mai mici de 30°C și ferite de razele solare directe.

6. Alte informații

Nu este relevant

