

Charakterystyka produktu biobójczego

Nazwa produktu: BLACK PEARL GRAIN

Grupa produktowa: Gr. 14 - Rodentycydy

Gr. 14 - Rodentycydy

Numer pozwolenia: PL/2023/0635/MR/BPF

Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0020442-0001

Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	1
2. Skład i postać użytkowa produktu	2
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	2
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	2
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	2
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	3
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	6
5.1. Instrukcje stosowania	7
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	7
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	7
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	8
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	8
6. Inne informacje	9

Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu

BLACK PEARL GRAIN

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	LODI S.A.S.
	Adres	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francja
Numer pozwolenia	PL/2023/0635/MR/BPF 1-1	

Numer referencyjny w R4BP 3	PL-0020442-0001
Data udzielenia pozwolenia	04/12/2023
Data ważności pozwolenia	31/12/2024

1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta substancji czynnej	LODI S.A.S.
Adres producenta substancji czynnej	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Francja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Francja

1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	3 - Alfachloraloza
Nazwa producenta substancji czynnej	LODI S.A.S.
Adres producenta substancji czynnej	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Francja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	HIKAL LTD. T-21. MIDC INDUSTRIAL AREA TALOJA RAIGAD DISTRICT 410 208 MAHARASHTRA Indie
	SUNTTON CO. LTD JINGYI ROAD, XINYI TANGDIAN CHEMICAL ZONE 221415 JIANGSU Chiny
	SAREX, PLOT n°N129, N130, N131, N232 MIDS, TARAPUR 401 506 MAHARASHTRA Indie

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Alfachloraloza	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Substancja czynna	15879-93-3	240-016-7	4

2.2. Rodzaj postaci użytkowej

przynęta gotowa do użycia: ziarno

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Unikać uwolnienia do środowiska.
Zebrać wyciek.
Usuwać zawartość do uprawnionych firm utylizacji odpadów..
Usuwać pojemnik do uprawnionych firm utylizacji odpadów..

4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - Zastosowanie 1: Zwalczenie myszy wewnątrz budynków przez użytkownika powszechnego i profesjonalnego:

Grupa produktowa	Gr. 14 - Rodentycydy
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	Brak
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Mus musculus Nazwa zwyczajowa: Mysz domowa Etap rozwoju: -
Obszar zastosowania	Wewnątrz Przynęta gotowa do użycia (w saszetkach) do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.
Sposób (-oby) nanoszenia	metoda: Dozowanie przynęty Szczegółowy opis: Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): 10-25 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m. Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): 10-25 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 3 m. Dostosować liczbę saszetek z przynętą w celu uzyskania skutecznej dawki w zależności od miejsca stosowania i stopnia infestacji. Czas niezbędny do uzyskania efektu biobójczego: od 1 do 3 dni po spożyciu przynęty.
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: -
Kategoria (-e) użytkowników	Profesjonalny Powszechny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Saszetki (PE, PE/papier) o masie 10 g lub 25 g pakowane w opakowanie zbiorcze: pudełko (karton) o masie 40 g, 80 g, 120 g, 160 g, 200 g, 240 g, 280 g, 320 g, 360 g, 400 g, 440 g, 480 g, 520 g lub 560 g,

torebka typu „doypack” (PET/aluminium/PE) o masie 200 g lub 500 g,

pudełko (metal) z wewnętrzną torebką (PP) o masie 40 g, 80 g, 120 g, 160 g, 200 g, 240 g, 280 g, 320 g, 360 g, 400 g, 440 g, 480 g, 520 g lub 560 g,

pudełko (metal) o masie 40 g, 80 g, 120 g, 160 g, 200 g, 240 g, 280 g, 320 g, 360 g, 400 g, 440 g, 480 g, 520 g lub 560 g,

wiaderko (PP) o masie 500 g,

worek (PP lub PE) o masie 40 g, 80 g, 120 g, 160 g, 200 g, 240 g, 280 g, 320 g, 360 g, 400 g, 440 g, 480 g, 520 g lub 560 g,

pudełko (karton) zawierające od 1 do 10 stacji deratyzacyjnych (PP lub PS) fabrycznie napełnionych 1 lub 2 saszetkami o masie 10 g.

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz ocenić poziom infestacji (liczebność gryzoni).

Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (po kilku dniach od zastosowania produktu a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzoni. Należy przestrzegać zalecanej dawki przynęty i odległości między stacjami deratyzacyjnymi.

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.2 Opis użycia

Zastosowanie 2 - Zastosowanie 2: Zwalczanie myszy wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego w tym zakresie:

Grupa produktowa	Gr. 14 - Rodentycydy
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	Brak
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Mus musculus Nazwa zwyczajowa: Mysz domowa Etap rozwoju: -
Obszar zastosowania	Wewnątrz Przynęta gotowa do użycia: do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych, do stosowania w punktach wykładania przynęty (w przypadku gdy stacja deratyzacyjna nie może być zastosowana, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć).
Sposób (-oby) nanoszenia	metoda: Dozowanie przynęty Szczegółowy opis: Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): 10-25 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m. Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): 10-25 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 3 m. Dostosować liczbę saszetek z przynętą w celu uzyskania skutecznej dawki w zależności od miejsca stosowania i stopnia infestacji. Czas niezbędny do uzyskania efektu biobójczego: od 1 do 3 dni po spożyciu przynęty.
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: -
Kategoria (-e) użytkowników	Wyszkolony profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Saszetki (PE lub PE/papier) o masie 10 g lub 25 g pakowane w opakowanie zbiorcze: wiaderko (PP) o masie 1 kg, 2,5 kg lub 5 kg,

pudełko (karton) o masie 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 15 kg lub 20 kg.

4.2.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz ocenić poziom infestacji (liczebność gryzoni). Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (po kilku dniach od zastosowania produktu, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia. Należy przestrzegać zalecanej dawki przynęty i odległości między stacjami deratyzacyjnymi. Przy wyborze rodzaju produktu gryzoniobójczego należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni. Jeżeli na danym terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na alfachloralozę to należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydów. Należy również rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek). W przypadku podejrzenia braku skuteczności produktu pod koniec okresu zwalczania gryzoni (np. odnotowania dalszej aktywności gryzoni) należy powiadomić posiadacza pozwolenia.

4.2.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.2.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.2.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.2.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania

5.1. Instrukcje stosowania

Przynęty nie należy wyjmować z saszetek.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie dopuścić do kontaktu produktu z innymi produktami.
Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt.
Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe.
Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę zalezioną poza stacjami.
Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.
Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

brak

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Skutki uboczne/działania niepożądane: produkt zawiera substancję działającą toksycznie na układ nerwowy, wywołujący arytmie serca, drgawki, utratę przytomności, senność.

Pierwsza pomoc:

W razie kontaktu z produktem skontaktować się niezwłocznie i we wszystkich przypadkach z ośrodkiem zatruc, pogotowiem ratunkowym lub lekarzem.

W przypadku:

kontaktu z drogami oddechowymi: zapewnić dostęp do świeżego powietrza i przyjąć pozycję ułatwiającą oddychanie.

kontaktu ze skórą: zdjąć skażone ubranie, przemyć skórę wodą z mydłem, następnie obficie splukać wodą. Nie używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

kontaktu z oczami: przemywać obficie oczy pod delikatnym strumieniem wody (letniej, o ile to możliwe) przez kilka minut utrzymując otwarte powieki.

w razie połknięcia: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Nie wywoływać wymiotów. Niezależnie od ilości połkniętego produktu, nie jeść i nie pić. Ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej

i zabezpieczyć przed wszelkimi zranieniami w razie gwałtownego ruchu lub konwulsji. Kontrolować oddech. Stosować się do zaleceń lekarza.

Informacja dla lekarza: produkt zawiera środek gryzoniobójczy – depresant układu nerwowego i środek wywołujący drgawki. Obrzęk oskrzeli następuje w krótkim czasie. Leczenie jest objawowe. Nie ma antidotum.

Środki ochrony środowiska:

W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni).

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Opakowania po produkcie oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów.

Nie należy czyścić pojemników ani stacji deratyzacyjnych pomiędzy dwoma zabiegami.

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu,

w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych. Przechowywać z dala od światła słonecznego.

Informacje dla osób postronnych, które należy umieścić na stacjach deratyzacyjnych:

- Chronić przed dziećmi.
- Przechowywać z dala od żywności i napojów, w tym karmy dla zwierząt domowych.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji, w temperaturze pokojowej.

6. Inne informacje

Saszetki i etykieta muszą zawierać następujący napis: "Nie otwierać saszetek".

Za stanowiska zwalczania gryzoni uważa się zabezpieczone stacje deratyzacyjne z przynętą i inne stanowiska zwalczania.

Za zabezpieczone stacje deratyzacyjne z przynętą uważa się stacje, w których przynęta jest niedostępna dla dzieci i organizmów innych niż zwalczane. Ponadto produkt powinien być pakowany w sposób uniemożliwiający jego otwarcie przez dzieci. Posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do zabezpieczonych, nieprzezroczystych stacji deratyzacyjnych do napełniania przynętą.

Za inne stanowiska zwalczania uważa się stanowiska wyposażone w mechanizmy zapewniające taki sam poziom ochrony ludzi i środowiska jak stacje deratyzacyjne z przynętą, zamocowane w sposób, który uniemożliwia ich przemieszczenie, unikając w ten sposób bezpośredniego kontaktu przynęty ze środowiskiem. Mechanizmy te muszą być skonstruowane w taki sposób, by przynęta była niedostępna dla osób postronnych i zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania oraz by chronić ją przed warunkami atmosferycznymi.

Etykieta produktu musi wskazywać, że produkt zawiera dwutlenek krzemu (nano).

Kategoria zagrożenia:

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze:

Uwaga, GHS09