

**SL**

***PRILOGA***

**POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA**

Protect Sewer Block

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi

**Številka dovoljenja:** SI-0004327-0000

**Številka proizvoda v R4BP:** SI-0004327-0000

## Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Protect Sewer Block BROMADIOLONE WAX BLOCK
--------------	---

### 1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Magnetik d.o.o.
	Naslov	Ulica heroja Verdnika 38a 4270 Jesenice Slovenija
Številka dovoljenja	SI-0004327-0000	
Številka proizvoda v R4BP	SI-0004327-0000	
Datum dovoljenja	16/10/2012	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31/12/2026	

### 1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Babolna Bio Ltd
Naslov proizvajalca	Szállás utca 6 1107 Budapest Madžarska
Kraj proizvodnih obratov	Köves J út 1-3 2943 Bábolna Madžarska

### 1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Bromadiolon
Ime proizvajalca	Dr Tezza
Naslov proizvajalca	Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Italija
Kraj proizvodnih obratov	Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Italija

---

## Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	aktivna snov	28772-56-7	249-205-9	0,005

### 2.2. Vrsta(-e) formulacije

RB Gotova vaba

### Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H360D: Lahko škoduje nerojenemu otroku.  H372: Škoduje organom blood pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti {1:navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti:}.
Previdnostni stavki	P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila.  P264: Po uporabi temeljito umiti hands .  P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.  P280: Nositi zaščitne rokavice.  P308 + P313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč.  P405: Hraniti zaklenjeno.  P501: Odstraniti vsebino in accordance with local requirements.

## Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

### 4.1. Opis uporabe

**Tabela 1. podgane – poklicni uporabniki – v notranjih prostorih**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: drugo: Siva podgana Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih  V stavbah.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: Gotova vaba, pripravljena za uporabo v zaščitnih postajah oziroma škatlicah.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 75-100 g vabe na postajo. Če je potrebna več kot ena postaja, naj bo razdalja med postajami vsaj 5 metrov (v primeru večje infestacije) oziroma 10 metrov (v primeru manjše infestacije).  Redčenje (%): -  Število in časovni raspored uporabe: -
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	75, 100, 120 or 200 g parafinski bloki embalaža: plastika (PE), papir Skupna neto masa vab do 25 kg.

#### 4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Postaje je potrebno pregledovati na 5-7 dni od začetka tretiranja, kasneje najmanj enkrat tedensko. Umazane, poškodovane ali zaužite vabe je potrebno zamenjati s svežimi. Postopek se ponavlja, dokler vabe ne ostanejo nedotaknjene in v bližini vab ni opaziti več sledi dejavnosti miši. Sproti je treba na varen način odstranjevati trupla glodavcev (lokalni odstranjevalec odpadkov).

- Sledite morebitnim dodatnim navodilom dobre prakse.

#### 4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

#### 4.1.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

-

#### 4.1.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj v bližini kanalizacije poskrbite, da vabe ne bodo prišle v stik z vodo.

#### 4.1.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

#### 4.1.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

### 4.2. Opis uporabe

**Tabela 2. podgane – poklicni uporabniki – zunaj okrog stavb**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: drugo: Siva podgana Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem  Zunaj okrog stavb
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: Gotova vaba, pripravljena za uporabo v zaščitnih postajah oziroma škatlicah.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 75-100 g vabe na postajo. Če je potrebna več kot ena postaja, naj bo razdalja med postajami vsaj 5 metrov (v primeru večje infestacije) oziroma 10 metrov (v primeru manjše infestacije).  Redčenje (%): -

	Število in časovni raspored uporabe: -
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	75, 100, 120 or 200 g parafinski bloki embalaža: plastika (PE), papir Skupna neto masa do 25 kg.

#### 4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Vabe zaščitite pred vplivi okolja (dež, sneg ipd.). Postaje z vabami postavite na mesta, ki niso izpostavljena poplavam.

- Postaje je potrebno pregledovati na 5-7 dni od začetka tretiranja podgan, kasneje najmanj enkrat tedensko. Umazane, poškodovane ali zaužite vabe je potrebno zamenjati s svežimi. Postopek se ponavlja, dokler vabe ne ostanejo nedotaknjene in v bližini vab ni opaziti več sledi dejavnosti miši in podgan. Sproti je treba na varen način odstranjevati trupla glodavcev (lokalni odstranjevalec odpadkov).

- Sledite morebitnim dodatnim navodilom dobre prakse.

#### 4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

#### 4.2.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Na nastavljeni vab neposredno v gnezdo.

#### 4.2.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Preprečite stik z vodo pri postavljanju postaj v bližini rek, ribnikov, jezov, vodnih kanalov, namakalnih jarkov ali izsuševalnih sistemov.

#### 4.2.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

#### 4.2.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

### 4.3. Opis uporabe

**Tabela 3. podgane – usposobljeni poklicni uporabniki – v notranjih prostorih**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: drugo: Siva podgana Razvojna faza: drugo: Odrasli osebk in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih  V stavbah.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: Gotova vaba, pripravljena za uporabo v zaščitnih postajah oziroma škatlicah, ali nameščena na posebnih mestih, kjer je zaščitena pred neciljnimi organizmi in ljudmi.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 75-100 g vabe na postajo  Redčenje (%): -  Število in časovni raspored uporabe: -
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	75, 100, 120 or 200 g parafinski bloki embalaža: plastika (PE), papir Skupna neto masa do 25 kg.

#### 4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Po končanem tretiranju odstranite preostalo vabo.

Pri trajno nastavljeni vabi:

- Kjer je možno, je priporočljiv pregled tretiranega območja vsake 4 tedne, da bi se izognili pojavu morebitne rezistence.

- Sledite morebitnim dodatnim navodilom dobre prakse.

#### 4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

#### 4.3.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred tretiranjem obvestite morebitne navzoče osebe (npr. uporabnike tretiranih površin in okolice) o kampanji za nadzor glodavcev.

- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (npr. zamašite luknje, odstranite hrano in pijačo), s čimer omogočite boljše delovanje rodenticida in zmanjšate verjetnost ponovne invazije glodavcev.
- Da bi zmanjšali tveganje za sekundarno zastrupitev, v času tretiranja odstranjajte mrtve glodavce v skladu s priporočili in navodili dobre prakse.
- Rodenticidi se lahko uporabljajo za trajni nadzor le na mestih z velikim tveganjem za vnovično invazijo, če so se drugi načini nadzora izkazali za nezadostne.
- Ne uporabljajte izdelka za impulzno tretiranje.

V primeru trajno nastavljene vabe:

- Trajna vaba je strogo omejena na območja z velikim potencialom za ponovitev invazije, če so se drugi načini nadzora izkazali za nezadostne.
- Strategija stalnega nadzora mora biti periodično revidirana skladno z integriranim zatiranjem škodljivcev in oceno tveganja za ponovno okužbo.

#### 4.3.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj v bližini kanalizacije poskrbite, da vabe ne bodo prišle v stik z vodo.

#### 4.3.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

#### 4.3.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

### 4.4. Opis uporabe

**Tabela 4. podgane – usposobljeni poklicni uporabniki – zunaj okrog stavb**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: drugo: Siva podgana Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem  Zunaj okrog stavb
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe

	Podroben opis: Gotova vaba, pripravljena za uporabo v zaščitnih postajah oziroma škatlicah, ali nameščena na posebnih mestih, kjer je zaščitena pred neciljnimi organizmi in ljudmi.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 75-100 g vabe na postajo  Redčenje (%): -  Število in časovni raspored uporabe: -
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	75, 100, 120 or 200 g parafinski bloki embalaža: plastika (PE), papir Skupna neto masa do 25 kg.

#### 4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- "- Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi. Vabe namestite na območja, ki niso izpostavljena poplavljanju.  
- Zamenjajte morebitne vabe v postajah, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo.  
Odstranite preostali proizvod ob koncu obdobja tretiranja  
- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse."

Pri trajno nastavljeni vabi:

- Kjer je možno, je priporočljiv pregled tretiranega območja vsake 4 tedne, da bi se izognili pojavu morebitne rezistence.
- Vaba mora biti nameščena in zakrita na strateških mestih, da čimbolj zmanjšamo izpostavljenost pred neciljnimi organizmi.
- Sledite morebitnim dodatnim navodilom dobre prakse.

#### 4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

#### 4.4.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred tretiranjem obvestite morebitne navzoče osebe (npr. uporabnike tretiranih površin in okolice) o kampanji za nadzor glodavcev.
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (npr. zamašite luknje, odstranite hrano in pijačo), s čimer omogočite boljše delovanje rodenticida in zmanjšate verjetnost ponovne invazije glodavcev.
- Da bi zmanjšali tveganje za sekundarno zastrupitev, v času tretiranja odstranjujte mrtve glodavce v skladu s priporočili in navodili dobre prakse.
- Rodenticidi se lahko uporabljajo za trajni nadzor le na mestih z velikim tveganjem za vnovično invazijo, če so se drugi načini nadzora izkazali za nezadostne.
- Ne uporabljajte izdelka za impulzno tretiranje.

Pri trajno nastavljeni vabi:

- "- Nastavljanje trajnih vab je omejeno izključno na območja z visoko možnostjo ponovne invazije, kadar so se druge metode nadzora izkazale za nezadostne.  
- Strategijo nastavljanja trajnih vab je treba pregledovati v rednih časovnih presledkih v okviru celostnega sistema zatiranja škodljivcev in ocene tveganja ponovnega napada škodljivcev.  
"

#### 4.4.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

#### 4.4.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

#### 4.4.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

### 4.5. Opis uporabe

**Tabela 5. podgane – usposobljeni poklicni uporabniki – odprta zunanja območja in odlagališča odpadkov**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: drugo: Siva podgana Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem "Odprta zunanja območja Zunanja odlagališča odpadkov "
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: Gotova vaba, pripravljena za uporabo v zaščitnih postajah oziroma škatlicah, ali nameščena na posebnih mestih, kjer je zaščitena pred neciljnimi organizmi in ljudmi.
Odmerek in pogostost uporabe	Odmerek: 75-100 g vabe na postajo  Redčenje (%): -  Število in časovni raspored uporabe: -

Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	75, 100, 120 or 200 g parafinski bloki embalaža: plastika (PE), papir Skupna neto masa do 25 kg.

#### 4.5.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- "- Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi. Vabe namestite na območja, ki niso izpostavljene poplavi.  
- Zamenjajte morebitne vabe v postajah za nastavljanje vab, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo.  
Odstranite preostali proizvod ob koncu tretiranja  
- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse."

Pri trajno nastavljeni vabi:

- Kjer je možno, je priporočljiv pregled tretiranega območja vsake 4 tedne, da bi se izognili pojavu morebitne rezistence.
- Vaba mora biti nameščena in zakrita na strateških mestih, da čimbolj zmanjšamo izpostavljenost pred ne ciljnim organizmi.
- Sledite morebitnim dodatnim navodilom dobre prakse.

#### 4.5.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

#### 4.5.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

"Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo]"

- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.

[...]

- Proizvoda ne uporabljajte kot stalno vabo za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.
- Proizvoda ne uporabljajte v pulzirajoči vabi.
- Proizvoda ne nastavljajte neposredno v rove."

Pri trajno nastavljeni vabi:

- "- Nastavljanje trajnih vab je omejeno izključno na območja z visoko možnostjo ponovne invazije, kadar so se druge metode nadzora izkazale za nezadostne.  
- Strategijo nastavljanja trajnih vab je treba pregledovati v rednih časovnih presledkih v okviru celostnega sistema zatiranja škodljivcev in ocene tveganja ponovnega napada škodljivcev.  
"

#### 4.5.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

#### 4.5.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

#### 4.5.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

### 4.6. Opis uporabe

**Tabela 6. rat - trained professionals – sewer**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: drugo: Siva podgana Razvojna faza: drugo: Odrasli osebk in mladiči
Področje(-a) uporabe	drugo: Other  sewers
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe  Podroben opis: - Vaba, pripravljena za uporabo, ki jo je treba zasidrati ali uporabiti na postajah za vabe, ki vabi preprečuje stik z odpadno vodo. Pokrite in zaščitene vabe so dovoljena tudi, če zagotavljajo enako raven zaščite neciljnih vrst in ljudi kot postaje za vabo, odporne na posege
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 75-200 g vabe na postajo  Redčenje (%): -  Število in časovni raspored uporabe: -
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak

---

Velikosti in material embalaže	75, 100, 120 or 200 g parafinski bloki embalaža: plastika (PE), papir Skupna neto masa do 25 kg.
--------------------------------	--

#### **4.6.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

- Vabe je treba nanašati tako, da ne pridejo v stik z vodo in se ne izperejo.
- Upoštevajte vsa dodatna navodila, ki jih ponuja ustrezni kodeks dobre prakse.

#### **4.6.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

#### **4.6.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

- Vabe postavljajte samo v kanalizacijske sisteme, ki so priključeni na čistilno napravo.
- Ne uporabljajte proizvoda v metodi pulznega nastavljanja vab.

#### **4.6.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

-

#### **4.6.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

-

#### **4.6.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

-

---

## Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO<sup>1</sup>

### 5.1. Navodila za uporabo

- Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Pred nastavljanjem vab opravite pregled prizadetega območja. Opredelite vrsto glodavcev, mesta aktivnosti in določite verjeten razlog ter obseg napada škodljivcev.
- Odstranite hrano, ki je glodavcem na voljo (npr. razsuto zrnje, odpadki hrane). Pred nastavljanjem vab napadenega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev, zaradi česar vabo težje sprejmejo.
- Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje vab in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- Postaje z vabami postavite v neposredno bližino območij, kjer je ste opazili aktivnost glodavcev, npr. na poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rove itd.
- Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali stene.
- Postaje morajo biti jasno označene, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati
- Kadar uporabljate proizvod na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena. V bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo ukrepov v primeru zastrupitve.
- Vaba mora biti v postajah pritrjena tako, da je ni mogoče odvreči iz postaje.
- Postaje namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
- Postaje namestite izven dosega hrane, pijače in krme za živali, in tudi izven dosega pripomočkov ali površin, s katerimi so sicer v stiku.
- Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije.
- Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Po uporabi si umijte roke in druge izpostavljene dele telesa.
- Pogostost obiskov tretiranega območja mora biti usklajena z upravljavcem poslopja glede na raziskavo, izvedeno pred začetkom tretiranja. Ta pogostost mora biti skladna z veljavnim kodeksom dobre prakse.
- Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi proizvoda.
- Če se uživanje vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je potrebno ugotoviti verjeten razlog. Če obstaja verjetnost, da so glodavci na vabo odporni, uporabite močnejši antikoagulacijski rodenticid ali rodenticid, ki ni antikoagulacijski. Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativnem ukrepu nadzora.
- Ob koncu obdobja učinkovanja odstranite preostalo vabo in postaje za nastavljanje vab.

### 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev, v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse.
- Z informacij o proizvodu (etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno, da je proizvod na voljo samo za poklicne uporabnike.
- Izdelka ne smete uporabljati na področju, kjer je bila zaznana rezistenca na aktivno snov.
- Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda, razen če imate dovoljenje za stalno tretiranje področja z določeno vabo.
- Ne uporabljajte drugih antikoagulantov s primerljivo ali šibkejšo učinkovitostjo. Za kolobarjenje razmislite o uporabi rodenticida, ki ne temelji na antikoagulantu, v kolikor je na voljo, ali o uporabi močnejšega antikoagulanta.
- V času tretiranja ne umivajte postaj za nastavljanje vab z vodo.
- Za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve odstranjujte poginule glodavce najmanj dvakrat tedensko v obdobju tretiranja.

---

<sup>1</sup>Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

---

### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

- Ta proizvod vsebuje antikoagulant. V primeru zaužitja se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni. V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.
- Antidot je vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.
- Pri stiku s kožo: kožo temeljito umijte najprej z vodo in nato še z milom in vodo.
- Pri stiku z očmi: odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni vekci ter oko temeljito izperite s tekočino za izpiranje oči ali s čisto vodo. Oči imejte odprte vsaj 10 minut.
- Pri stiku z usti: usta previdno izperite z vodo. Nezavestni osebi nikoli ne dajajte ničesar skozi usta. Ne izzivajte bruhanja. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo izdelka. V kolikor je vabo zaužila domača žival, se posvetujte z veterinarjem.
- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: "Ne premikajte in ne odpirajte."; "Vsebuje rodenticid."; "ime proizvoda in številka dovoljenja"; "naziv in vsebnost aktivne snovi" in "V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112."
- Nevarno za divje živali.

### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Po končanem obdobju tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z lokalno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki.

### **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

- Hraniti v suhem, hladnem in dobro zračenem prostoru, v originalni zaprti embalaži, stran od direktne sončne svetlobe.
- Hraniti zunaj dosega otrok, ptic, domačih in hlevskih živali.
- Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

---

## **Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE**

Rodenticid učinkuje z zamikom od 4 do 10 dni po zaužitju.

Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami. Zaščitite se z rokavicami ali uporabite posebne prijemalne klešče in poginule glodavce zavržite med komunalne odpadke v dvojni plastični vrečki, da preprečite sekundarno zastrupljanje živali.

Po končanem tretiranju je potrebno preostalo nastavljeno vabo varno odstraniti.

Vabi je dodano grenčilo (denatonijev benzoat), ki odvrča domače živali in otroke od morebitnega zaužitja.