

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Vertox 25 Whole Wheat Bait (purple)

Vrsta(e) proizvoda

PT14: Rodenticidi

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/20-12/14

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0024636-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Pestrix žitni mamac Pestrix žitni mamac PRO
--------------------	--

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	PelGar International Limited
	Adresa	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Francuska
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/20-12/14	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0024636-0000	
Datum autorizacije	01/07/2015	
Datum isteka autorizacije	01/07/2026	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Lokacija proizvodnih pogona	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske Promedivet SRL 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/ G jud. Mures, Rumunjska PESTRID d.o.o., ŠANDORA PETEFIJA 109, 31327 BILJE Hrvatska

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Brodifakum
Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Lokacija proizvodnih pogona	Prazska 54 280 02 Kolin Češka

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	aktivna tvar	56073-10-0	259-980-5	0,0025 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

XX Ostalo: RB - mamac - (pripremljen za uporabu)

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	H373: Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .. EUH208: Sadrži 1,2-benzizotiazolin-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P102: Čuvati izvan dohvata djece. P260: Ne udisati prašinu. P314: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet . P501: Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima.

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba 1 - Opća javnost - suzbijanje kućnih miševa u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru.
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: Primjena mamaca Detaljan opis: Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za kućne miševe do 20 g po mjestu postavljanja. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: - Za suzbijanje infestacije miševima: 5-20 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja. - Postaviti 5-20 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja na svakih 5 metara (na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije) na područjima gdje su miševi aktivni. Miševi su vrlo radoznali i pomicanje kutija s mamacima svaka 2-3 dana tijekom pregleda ili dopunjavanja mamaca može pomoći kontrolnom programu (deratizaciji). Tijekom prvih 10-14 dana treba često provjeravati mamce i zamijeniti svaki kojeg su grizli glodavci ili je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom. Ako su pojedeni svi mamci s određenih područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeđen, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Maksimalna količina mamaca po pakiranju: 50 g

Pojedinačna pakiranja od 15 g, 20 g, 25 g, 30 g ili 50 g u vrećicama od: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, u vanjskoj ambalaži: spremnicima od PE/PP (kadice, kante ili vrećice).
Pojedinačna pakiranja od 15 g, 20 g, 25 g, 30 g ili 50 g u vrećicama od: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, u vanjskoj ambalaži: kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE.
Pojedinačna pakiranja od 15 g, 20 g, 25 g, 30 g ili 50 g u vrećicama od: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, u vanjskoj ambalaži: kartonskim kutijama (karton od vlaknastih ploča / karton).
Rasuti mamac od 10 g, 15 g, 20 g pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije (kadice su složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji)
Maksimalna veličina pakiranja: 50 g.
Rasuti mamac od 10 g, 15 g i 20 g pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem.
Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja, namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu.
Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama su složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike s toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom.
Maksimalna veličina pakiranja: 50 g.

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za suzbijanje infestacije kućnim miševima u zatvorenom treba upotrijebiti 5 do 20 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji)

- Postaviti 5-20 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja na svakih 5 metara (na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije) na područjima gdje su miševi aktivni. Miševi su vrlo radoznali i pomicanje kutija s mamcima svaka 2-3 dana tijekom pregleda ili dopunjavanja mamaca može pomoći kontrolnom programu (deratizaciji). Tijekom prvih 10-14 dana treba često provjeravati mamce i zamijeniti svaki kojeg su grizli glodavci ili je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.
- Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.
- Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. Informacije o proizvodu (tj. Uputa i/ili deklaracija) jasno preporučuju da u slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina (DDD).
- Ne koristiti ovaj proizvod kao trajni mamac ili za pulsno izlaganje mamaca.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba 2 - Opća javnost - suzbijanje štakora u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru.
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: Primjena mamaca Detaljan opis: Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za štakore do 60 g po mjestu izlaganja Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja na svakih 10 m Jaka infestacija - 10 do 60 g.mamca po mjestu izlaganja svakih 5 m Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 m Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca. Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne

	<p>primijećuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.</p>
<p>Kategorija(e) korisnika</p>	<p>opća javnost (neprofesionalci)</p>
<p>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</p>	<p>Maksimalna količina mamaca po pakiranju: 150 g Pojedinačna pakiranja od 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g ili 60 g u vrećicama od: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, u vanjskoj ambalaži: spremnicima od PE/PP (kadice, kante ili vrećice) s po 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 75 g, 100 g, 120 g ili 150 g mamca. Pojedinačna pakiranja od 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g ili 60 g u vrećicama od: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, u vanjskoj ambalaži: kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 75 g, 100 g, 120 g ili 150 g mamca. Pojedinačna pakiranja od 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g ili 60 g u vrećicama od: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, u vanjskoj ambalaži: kartonskim kutijama (karton od vlaknastih ploča / karton) s po 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 75 g, 100 g, 120 g ili 150 g mamca. Rasuti mamac od 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 50 g, 60 g pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije (kadice su složene kao 1/4/8/12/15 kom u kartonskoj kutiji) Maksimalna veličina pakiranja: 150 g. Rasuti mamac od 10 g, 15 g i 20 g, 25 g, 50 g, 60 g pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja, namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu. Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama su složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike s toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Maksimalna veličina pakiranja: 150 g.</p>

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Za suzbijanje infestacije štakorima u zatvorenom treba upotrijebiti 10 do 60 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 10 m.

- Postaviti 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja na svakih 10 metara (na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije) na područjima gdje su štakori aktivni.

- Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca. Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne primijecuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.

- Kutije s mamcem treba provjeriti 5 do 7 dana od početka tretmana i barem jednom tjedno nakon toga te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac ponovno dopuniti prema potrebi.

- Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. Informacije o proizvodu (tj. Uputa i/ili deklaracija) jasno preporučuju da u slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina (DDD).

- Ne koristiti ovaj proizvod kao trajni mamac ili za pulsno izlaganje mamaca.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Uporaba 3 - Opća javnost - suzbijanje štakora na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na otvorenom, oko zgrada.
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: Primjena mamaca Detaljan opis: Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za štakore upotrijebiti 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja na svakih 10 m Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja na svakih 10 m Jaka infestacija - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 m Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 m - Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca. Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne primijećuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Maksimalna količina mamaca po pakiranju: 150 g Pojedinačna pakiranja od 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g ili 60 g u vrećicama od: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, u vanjskoj ambalaži: spremnicima od PE/PP (kadice, kante ili vrećice) s po

15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 75 g, 100 g, 120 g ili 150 g mamca.

Pojedinačna pakiranja od 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g ili 60 g u vrećicama od: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, u vanjskoj ambalaži: kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 75 g, 100 g, 120 g ili 150 g mamca.

Pojedinačna pakiranja od 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g ili 60 g u vrećicama od: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, u vanjskoj ambalaži: kartonskim kutijama (karton od vlaknastih ploča / karton) s po 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 75 g, 100 g, 120 g ili 150 g mamca.

Rasuti mamac od 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 50 g, 60 g pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije (kadice su složene kao 1/4/8/12/15 kom u kartonskoj kutiji)

Maksimalna veličina pakiranja: 150 g.

Rasuti mamac od 10 g, 15 g i 20 g, 25 g, 50 g, 60 g pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem.

Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja, namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu.

Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama su složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike s toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Maksimalna veličina pakiranja: 150 g.

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Za suzbijanje infestacije štakorima na otvorenom, oko zgrada treba upotrijebiti 10 do 60 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 10 m.
- Postaviti 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja na svakih 10 metara (na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije) na područjima gdje su štakori aktivni.
- Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca. Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne primijećuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeđen, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.
- Kutije s mamcem treba provjeriti 5 do 7 dana od početka tretmana i barem jednom tjedno nakon toga te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac ponovno dopuniti prema potrebi.
- Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. Informacije o proizvodu (tj. Uputa i/ili deklaracija) jasno preporučuju da u slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina (DDD).
- Ne koristiti ovaj proizvod kao trajni mamac ili za pulsno izlaganje mamaca.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. Uporaba 4 - Profesionalni korisnici - miševi - u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: Kućni miš Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: Primjena mamaca Detaljan opis: Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za kućne miševe do 20 g u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: 5-20 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja. Jaka infestacija - 5 do 20 g.mamca po mjestu izlaganja na svaka 2 metra.

	<p>Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 5 do 20 g.mamca po mjestu izlaganja na svakih 5 metara.</p> <p>- Miševi su vrlo radoznali i pomicanje kutija s mamcima svaka 2-3 dana tijekom pregleda ili dopunjavanja mamaca može pomoći kontrolnom programu (deratizaciji). Tijekom prvih 10-14 dana treba često provjeravati mamce i zamijeniti svaki kojeg su grizli glodavci ili je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.</p>
<p>Kategorija(e) korisnika</p>	<p>profesionalac</p>
<p>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</p>	<p>Minimalna veličina pakiranja 5 kg</p> <p>Maksimalna količina do 25 kg, pakirano u vreće od: višeslojnog papira iznutra presvučene s PE zaštitnom folijom, višeslojnog papira s odvojenom unutarnjom PE vrećicom, PP vlaknatice s odvojenom unutarnjom PE vrećicom ili PP vlaknatice bez unutarnje obloge s po 5 kg, 10 kg i 20 kg mamca. 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g ili 60 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: spremnicima od PE/PP (kadice, kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g ili 60 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g ili 60 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama (karton od vlaknastih ploča /karton) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>Rasuti mamac u spremnicima od PE/PP (kadice,kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>Rasuti mamac u kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije:</p> <p>40 g – 144 50 g – 120, 144 60 g – 96, 120</p> <p>Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem.</p>

Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja, namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu.

Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama su složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike s toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom u pakiranjima od:

40 g – 144
50 g – 120, 144
60 g – 96, 120
80 g – 72, 96
90 g – 60, 72, 96
100 g – 60, 72, 96
120 g – 48, 60, 72
200 g – 32, 48, 60
240 g – 24, 32, 48, 60

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za suzbijanje infestacije kućnim miševima u zatvorenom treba upotrijebiti 5 do 20 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije ili svakih 5 metara u slučaju blage infestacije - u području gdje su miševi aktivni.

- Postaviti 5-20 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja na svakih 5 metara (na svaka 2 metra u slučaju jake infestacije) na područjima gdje su miševi aktivni. Miševi su vrlo radoznali i pomicanje kutija s mamcima svaka 2-3 dana tijekom pregleda ili dopunjavanja mamaca može pomoći kontrolnom programu (deratizaciji). Tijekom prvih 10-14 dana treba često provjeravati mamce i zamijeniti svaki kojeg su grizli glodavci ili je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.
- Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.
- Slijediti sve dodatne upute preporučene relevantnim Kodeksom najbolje prakse.
- Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati odrediti vjerojatni uzrok i opseg infestacije.
- Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetočinama (IPM), koje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole.
- Status otpornosti ciljne populacije trebalo bi uzeti u obzir prilikom razmatranja izbora rodenticida koji će se koristiti. U onim područjima gdje se sumnja na rezistenciju na određene aktivne sastojke, treba izbjegati njihovu uporabu. Za kontrolu širenja rezistencije, preporučljivo je naizmjenično koristiti mamce koji sadrže različite antikoagulantne aktivne sastojke
- Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označeni tijekom trajanja cijelog postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antikoagulansom, kao i upute o postupcima prve pomoći u slučaju otrovanja; navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.
- Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. Informacije o proizvodu (tj. Uputa i/ili deklaracija) jasno preporučuju da u slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina (DDD).
- Ovaj proizvod ne koristiti kao trajni mamac ili za pulsno izlaganje mamaca.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Tijekom rukovanja proizvodom, nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).

Ovaj proizvod ne koristiti kao trajni mamac za sprečavanje infestacije ili praćenje aktivnosti glodavaca.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Prilikom postavljanja mamaca u blizini sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.5. Opis uporabe

Tablica 5. Uporaba 5 - Profesionalni korisnici - štakori - u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: Primjena mamaca Detaljan opis: Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 10-60 g u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja u razmaku od 10 m (5 m kod jake infestacije) Razrjeđenje (%): 0

	<p>Broj i vremenski raspored primjene: 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja u razmaku od 10 m. Jaka infestacija - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 m Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 m - Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamec do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca. - Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne primijećuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.</p>
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Najmanja veličina pakiranja 5 kg. Maksimalna količina do 25 kg, pakirano u vreće od: višeslojnog papira iznutra presvučene s PE zaštitnom folijom, višeslojnog papira s odvojenom unutarnjom PE vrećicom, PP vlaknatice s odvojenom unutarnjom PE vrećicom ili PP vlaknatice bez unutarnje obloge s po 5 kg, 10 kg i 20 kg mamca. 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: spremnicima od PE/PP (kadice, kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca. 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca. 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama (karton od vlaknastih ploča /karton) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca. Rasuti mamac u spremnicima od PE/PP (kadice,kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca. Rasuti mamac u kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p>

Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije:

40 g – 144

50 g – 120, 144

60 g – 96, 120

Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem.

Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja, namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu.

Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama su složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike s toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom u pakiranjima od:

40 g – 144

50 g – 120, 144

60 g – 96, 120

80 g – 72, 96

90 g – 60, 72, 96

100 g – 60, 72, 96

120 g – 48, 60, 72

200 g – 32, 48, 60

240 g – 24, 32, 48, 60

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Za suzbijanje infestacije štakorima u zatvorenom treba upotrijebiti 10 do 60 g mamca po mjestu postavljanja (zaštitnoj deratizacijskoj kutiji) na svakih 10 m.
- Postaviti 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja na svakih 10 metara (na svakih 5 metara u slučaju jake infestacije) na područjima gdje su štakori aktivni.
- Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamec do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca.
- Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne primjećuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeđen, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.
- Kutije s mamcem treba provjeriti 5 do 7 dana od početka tretmana i barem jednom tjedno nakon toga te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac ponovno dopuniti prema potrebi.
- Slijediti sve dodatne upute preporučene relevantnim Kodeksom najbolje prakse.
- Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati odrediti vjerojatni uzrok i opseg infestacije.
- Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetočinama (IPM), koje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole.
- Status otpornosti ciljne populacije trebalo bi uzeti u obzir prilikom razmatranja izbora rodenticida koji će se koristiti. U onim područjima gdje se sumnja na rezistenciju na određene aktivne sastojke, treba izbjegati njihovu uporabu. Za kontrolu širenja rezistencije, preporučljivo je naizmjenično koristiti mamce koji sadrže različite antikoagulantne aktivne sastojke

- Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označeni tijekom trajanja cijelog postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antikoagulansom, kao i upute o postupcima prve pomoći u slučaju otrovanja; navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.
- Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. Informacije o proizvodu (tj. Uputa i/ili deklaracija) jasno preporučuju da u slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina (DDD).
- Ne koristiti ovaj proizvod kao trajni mamac ili za pulsno izlaganje mamaca.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Tijekom rukovanja proizvodom, nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).
Ovaj proizvod ne koristiti kao trajni mamac za sprečavanje infestacije ili praćenje aktivnosti glodavaca.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Prilikom postavljanja mamaca u blizini sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.6. Opis uporabe

Tablica 6. Uporaba 6 - Profesionalni korisnici - kućni miševi i/ili štakori - na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: <i>Mus musculus</i> i/ili <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš i/ili smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na otvorenom uokolo zgrada
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: Primjena mamaca Detaljan opis: Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količina(e) kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: Za kućne miševе upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Za štakore upotrijebiti 10-60 g mamca po mjestu postavljanja u razmaku od 10 m</p> <p>Razrjeđenje (%): 0</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p>Za suzbijanje infestacije miševima postaviti 5-20 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja. Jaka infestacija - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja na svaka 2 metra. Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja na svakih 5 metara. - Miševi su vrlo radoznali i pomicanje kutija s mamcima svaka 2-3 dana tijekom pregleda ili dopunjavanja mamaca može pomoći kontrolnom programu (deratizaciji). Tijekom prvih 10-14 dana treba često provjeravati mamce i zamijeniti svaki kojeg su grizli glodavci ili je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.</p> <p>Za štakore upotrijebiti 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja u razmaku od 10 m. Jaka infestacija - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 m Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 m - Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamec do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca. - Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne primijećuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.</p>

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Najmanja veličina pakiranja 5 kg.</p> <p>Maksimalna količina do 25 kg, pakirano u vreće od: višeslojnog papira iznutra presvučene s PE zaštitnom folijom, višeslojnog papira s odvojenom unutarnjom PE vrećicom, PP vlaknatice s odvojenom unutarnjom PE vrećicom ili PP vlaknatice bez unutarnje obloge s po 5 kg, 10 kg i 20 kg mamca. 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: spremnicima od PE/PP (kadice, kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama (karton od vlaknastih ploča /karton) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>Rasuti mamac u spremnicima od PE/PP (kadice,kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>Rasuti mamac u kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije:</p> <p>40 g – 144 50 g – 120, 144 60 g – 96, 120</p> <p>Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja, namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu. Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama su složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike s toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom u pakiranjima od:</p> <p>40 g – 144 50 g – 120, 144 60 g – 96, 120 80 g – 72, 96 90 g – 60, 72, 96</p>

100 g – 60, 72, 96
120 g – 48, 60, 72
200 g – 32, 48, 60
240 g – 24, 32, 48, 60

4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za suzbijanje infestacije miševima postaviti 5-20 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja.

Jaka infestacija - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja na svaka 2 metra.

Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja na svakih 5 metara.

- Miševi su vrlo radoznali i pomicanje kutija s mamcima svaka 2-3 dana tijekom pregleda ili dopunjavanja mamaca može pomoći kontrolnom programu (deratizaciji). Tijekom prvih 10-14 dana treba često provjeravati mamce i zamijeniti svaki kojeg su grizli glodavci ili je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeđen, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.

Za štakore upotrijebiti 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja u razmaku od 10 m.

Jaka infestacija - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 m

Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 m

- Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamec do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca.

- Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne primijećuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeđen, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.

- Zaštititi mamac od atmosferskih uvjeta (kiše, snijega, itd). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.

- Zamijeniti svaki mamac u zaštitnoj (deratizacijskoj) kutiji u kojoj je mamac oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.

- Slijediti sve dodatne upute preporučene relevantnim Kodeksom najbolje prakse.

- Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati odrediti vjerojatni uzrok i opseg infestacije.

- Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetočinama (IPM), koje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole.

- Status otpornosti ciljne populacije trebalo bi uzeti u obzir prilikom razmatranja izbora rodenticida koji će se koristiti. U onim područjima gdje se sumnja na rezistenciju na određene aktivne sastojke, treba izbjegati njihovu uporabu. Za kontrolu širenja rezistencije, preporučljivo je naizmjenično koristiti mamce koji sadrže različite antikoagulantne aktivne sastojke

- Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označeni tijekom trajanja cijelog postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antikoagulansom, kao i upute o postupcima prve pomoći u slučaju otrovanja; navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.

- Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. Informacije o proizvodu (tj. Uputa i/ili deklaracija) jasno preporučuju da u slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina (DDD).

- Ne koristiti ovaj proizvod kao trajni mamac ili za pulsno izlaganje mamaca.

4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Tijekom rukovanja proizvodom, nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).

Proizvod ne postavljati izravno u jazbine glodavaca.

Ovaj proizvod ne koristiti kao trajni mamac za sprečavanje infestacije ili praćenje aktivnosti glodavaca.

4.6.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Prilikom postavljanja mamaca u blizini sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.6.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.6.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.7. Opis uporabe

Tablica 7. Uporaba 7 - Osposobljeni profesionalci - kućni miševi i/ili štakori - u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: <i>Mus musculus</i> i/ili <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš i/ili smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome U zatvorenom prostoru
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: Primjena mamaca

	<p>Detaljan opis: Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamaca.</p>
Količina(e) kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: Za kućne miševe upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja (deratizacijskoj) kutiji ili prekrivenom mjestu. Za štakore upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja (deratizacijskoj) kutiji ili prekrivenom mjestu na svakih 10 m.</p> <p>Razrjeđenje (%): 0</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p>Za suzbijanje infestacije miševima postaviti 5-20 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja.</p> <p>Jaka infestacija - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja na svaka 2 metra.</p> <p>Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja na svakih 5 metara.</p> <p>- Miševi su vrlo radoznali i pomicanje kutija s mamcima svaka 2-3 dana tijekom pregleda ili dopunjavanja mamaca može pomoći kontrolnom programu (deratizaciji). Tijekom prvih 10-14 dana treba često provjeravati mamce i zamijeniti svaki kojeg su grizli glodavci ili je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeđen, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.</p> <p>Za štakore upotrijebiti 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja u razmaku od 10 m.</p> <p>Jaka infestacija - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 m</p> <p>Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 m</p> <p>- Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamec do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca.</p> <p>- Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne primijećuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeđen, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.</p>
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najmanja veličina pakiranja 5 kg.

Maksimalna količina do 25 kg, pakirano u vreće od: višeslojnog papira iznutra presvučene s PE zaštitnom folijom, višeslojnog papira s odvojenom unutarnjom PE vrećicom, PP vlaknatice s odvojenom unutarnjom PE vrećicom ili PP vlaknatice bez unutarnje obloge s po 5 kg, 10 kg i 20 kg mamca. 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: spremnicima od PE/PP (kadice, kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.

15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.

15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama (karton od vlaknastih ploča /karton) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.

Rasuti mamac u spremnicima od PE/PP (kadice,kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.

Rasuti mamac u kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.

Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije:

40 g – 144

50 g – 120, 144

60 g – 96, 120

Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem.

Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja, namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu.

Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama su složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike s toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom u pakiranjima od:

40 g – 144

50 g – 120, 144

60 g – 96, 120

80 g – 72, 96

90 g – 60, 72, 96

100 g – 60, 72, 96

120 g – 48, 60, 72

200 g – 32, 48, 60

4.7.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za suzbijanje infestacije miševima postaviti 5-20 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja.

Jaka infestacija - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja na svaka 2 metra.

Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja na svakih 5 metara.

- Miševi su vrlo radoznali i pomicanje kutija s mamcima svaka 2-3 dana tijekom pregleda ili dopunjavanja mamaca može pomoći kontrolnom programu (deratizaciji). Tijekom prvih 10-14 dana treba često provjeravati mamce i zamijeniti svaki kojeg su grizli glodavci ili je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojedena, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.

Za štakore upotrijebiti 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja u razmaku od 10 m.

Jaka infestacija - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 m

Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 m

- Redovito treba provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamce do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Tijekom prvih 10-14 dana treba provoditi česte kontrole mamaca. Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca.

- Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne primijećuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojedena, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.

- Slijediti sve dodatne upute preporučene relevantnim Kodeksom najbolje prakse.

- Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati odrediti vjerojatni uzrok i opseg infestacije.

- Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetočinama (IPM), koje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole.

- Status otpornosti ciljne populacije trebalo bi uzeti u obzir prilikom razmatranja izbora rodenticida koji će se koristiti. U onim područjima gdje se sumnja na rezistenciju na određene aktivne sastojke, treba izbjegati njihovu uporabu. Za kontrolu širenja rezistencije, preporučljivo je naizmjenično koristiti mamce koji sadrže različite antikoagulantne aktivne sastojke

- Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označeni tijekom trajanja cijelog postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antikoagulansom, kao i upute o postupcima prve pomoći u slučaju otrovanja; navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.

- Ne koristiti ovaj proizvod kao trajni mamac.

- Kod pulsno postavljanja mamca: zamijeniti pojedeni mamac prvo nakon 3 dana, a zatim u intervalima od najviše 7 dana.

4.7.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.

Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja u čestim intervalima (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse)

Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju najezde glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

Tijekom rukovanja proizvodom, nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).

4.7.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Prilikom postavljanja mamaca u blizini sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.7.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.7.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.8. Opis uporabe

Tablica 8. Uporaba 8 - Osposobljeni profesionalci - kućni miševi i/ili štakori - na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: <i>Mus musculus</i> i/ili <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš i/ili smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na otvorenom uokolo zgrada.
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: Primjena mamaca Detaljan opis: Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja. ili na prekrivena mjesta postavljanja mamaca.

Količina(e) kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: Za kućne miševe upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja (deratizacijskoj) kutiji ili prekrivenom mjestu. Za štakore upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja (deratizacijskoj) kutiji ili prekrivenom mjestu na svakih 10 m.</p> <p>Razrjeđenje (%): 0</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p>Za miševe upotrijebiti 5 - 20 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja ili prekrivenom mjestu.</p> <p>Jaka infestacija - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja (deratizacijskoj) kutiji ili prekrivenom mjestu na svaka 2 metra.</p> <p>Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja (deratizacijskoj) kutiji ili prekrivenom mjestu na svakih 5 metara.</p> <p>- Miševi su vrlo radoznali i pomicanje kutija s mamcima svaka 2-3 dana tijekom pregleda ili dopunjavanja mamaca može pomoći kontrolnom programu (deratizaciji). Tijekom prvih 10-14 dana treba često provjeravati mamce i zamijeniti svaki kojeg su grizli glodavci ili je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.</p> <p>Za štakore upotrijebiti 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja u razmaku od 10 m.</p> <p>Jaka infestacija - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 m</p> <p>Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 m</p> <p>- Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamec do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca. Tijekom prvih 10-14 dana treba provoditi česte kontrole mamaca.</p> <p>- Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne primijećuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.</p>
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Najmanja veličina pakiranja 5 kg.</p> <p>Maksimalna količina do 25 kg, pakirano u vreće od: višeslojnog papira iznutra presvučene s PE zaštitnom folijom, višeslojnog papira s odvojenom unutarnjom PE vrećicom,</p>

PP vlaknatice s odvojenom unutarnjom PE vrećicom ili PP vlaknatice bez unutarnje obloge s po 5 kg, 10 kg i 20 kg mamca. 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: spremnicima od PE/PP (kadice, kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.

15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.

15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama (karton od vlaknastih ploča /karton) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.

Rasuti mamac u spremnicima od PE/PP (kadice,kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.

Rasuti mamac u kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.

Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije:

40 g – 144

50 g – 120, 144

60 g – 96, 120

Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem.

Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja, namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu.

Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama su složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike s toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom u pakiranjima od:

40 g – 144

50 g – 120, 144

60 g – 96, 120

80 g – 72, 96

90 g – 60, 72, 96

100 g – 60, 72, 96

120 g – 48, 60, 72

200 g – 32, 48, 60

240 g – 24, 32, 48, 60

4.8.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za suzbijanje infestacije miševima postaviti 5-20 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja.

Jaka infestacija - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja na svaka 2 metra.

Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 5 do 20 g mamca po mjestu izlaganja na svakih 5 metara.

- Miševi su vrlo radoznali i pomicanje kutija s mamcima svaka 2-3 dana tijekom pregleda ili dopunjavanja mamaca može pomoći kontrolnom programu (deratizaciji). Tijekom prvih 10-14 dana treba često provjeravati mamce i zamijeniti svaki kojeg su grizli glodavci ili je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.

Za štakore upotrijebiti 10-60 g mamca u zaštitne (deratizacijske) kutije osigurane od neovlaštenog otvaranja u razmaku od 10 m.

Jaka infestacija - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 m

Blaga infestacija - u području aktivnosti glodavaca - 10 do 60 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 m

- Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedene ili oštećene mamec do prestanka njihove konzumacije. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima (svježi tragovi kretanja ili izmet). Ne premještati ili remetiti mjesta izlaganja nekoliko dana nakon postavljanja mamca. Tijekom prvih 10-14 dana treba provoditi česte kontrole mamaca.

- Ukoliko se nakon 7-10 dana u blizini postavljenih mamaca ne primijećuju znakovi aktivnosti štakora, mamce treba premjestiti na područje njihove veće aktivnosti. Ako su pojedeni svi mamci s određenog područja, treba povećati količinu mamaca postavljanjem većeg broja deratizacijskih kutija. Ne povećavati propisanu količinu mamca po mjestu postavljanja mamca. Zamijeniti svaki mamac koji je pojeden, oštećen vodom ili kontaminiran zemljom.

- Kutije s mamcem treba provjeriti 5 do 7 dana od početka tretmana i barem jednom tjedno nakon toga te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca.

Mamac ponovno dopuniti prema potrebi.

- Slijediti sve dodatne upute preporučene relevantnim Kodeksom najbolje prakse.

- Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati odrediti vjerojatni uzrok i opseg infestacije.

- Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetočinama (IPM), koje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole.

- Status otpornosti ciljne populacije trebalo bi uzeti u obzir prilikom razmatranja izbora rodenticida koji će se koristiti. U onim područjima gdje se sumnja na rezistenciju na određene aktivne sastojke, treba izbjegati njihovu uporabu. Za kontrolu širenja rezistencije, preporučljivo je naizmjenično koristiti mamce koji sadrže različite antikoagulantne aktivne sastojke

- Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označeni tijekom trajanja cijelog postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antikoagulansom, kao i upute o postupcima prve pomoći u slučaju otrovanja; navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.

- Na kraju tretmana treba ukloniti sav preostali mamac.

- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.

- Kod primjene izravno u jazbine: Mamce postaviti na način da se smanji mogućnost izlaganja na najmanju mjeru ne-ciljnih organizmima i djece. Prekriti ili blokirati ulaze u rupe u kojima je mamac postavljen da se smanji rizik od rasipanja i odbijanja mamca.

- Kod pulsog postavljanja mamca: Zamijeniti pojedeni mamac prvo nakon 3 dana, a zatim u intervalima od najviše 7 dana. Sakupiti rasuti mamac i uginule glodavce. [Gdje je primjenjivo] Slijediti specifične upute koje su određene odgovarajućim kodeksom dobre prakse na nacionalnoj razini.

4.8.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr.korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
 Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja,redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja u čestim intervalima (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
 Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju najezde glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.
 Kod primjene izravno u jazbine:mamce postaviti na način da se smanji mogućnost izlaganja ne-ciljnim organizmima i djeci. Prekriti ili blokirati ulaze u rupe u kojima je mamac postavljen kako bi se smanjio rizik od rasipanja i odbijanja mamca.
 Tijekom rukovanja proizvodom, nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).

4.8.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada se kutije s mamcem postavljaju u blizini površinskih voda (npr.rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.8.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.8.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.9. Opis uporabe

Tablica 9. Uporaba 9 - Osposobljeni profesionalci - štakori - kanalizacija

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi štakor Stadij razvoja: ostalo: Odrasle i mlade jedinke
Područje(a) uporabe	ostalo: Other Kanalizacija
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: Primjena mamaca Detaljan opis: Mamac za izravnu primjenu za pričvršćivanje ili postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce koje sprječavaju da mamac dođe u dodir s otpadnim vodama.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: U kanalizaciji postaviti 200 g do 300 g mamca svakih 30-50 m (ne više od 300 g po kanalizacijskom šahtu) Razrjeđenje (%): 0

	<p>Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p>U kanalizaciji postaviti 200 g do 300 g mamca svakih 30-50 m (ne više od 300 g po kanalizacijskom šahtu).</p> <p>Zaštitne (deratizacijske) kutije ili vrećice s mamcem dobro pričvrstiti da ih voda ne može odnijeti. Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedeni ili dotrajali mamac do prestanka potrošnje. Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima.</p>
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Najmanja veličina pakiranja 5 kg.</p> <p>Maksimalna količina do 25 kg, pakirano u vreće od: višeslojnog papira iznutra presvučene s PE zaštitnom folijom, višeslojnog papira s odvojenom unutarnjom PE vrećicom, PP vlaknatice s odvojenom unutarnjom PE vrećicom ili PP vlaknatice bez unutarnje obloge s po 5 kg, 10 kg i 20 kg mamca. 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: spremnicima od PE/PP (kadice, kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g ili 200 g pojedinačno pakiranog mamca u vrećice od sljedećih materijala: papir/PE, AL/PE ili papir/AL/PE, isporučeno u: kartonskim kutijama (karton od vlaknastih ploča /karton) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>Rasuti mamac u spremnicima od PE/PP (kadice,kante ili vrećice) s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>Rasuti mamac u kartonskim kutijama iznutra presvučenim PE s po 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg i 20 kg mamca.</p> <p>Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Više kadica je pakirano u kartonske kutije: 40 g – 144 50 g – 120, 144 60 g – 96, 120</p>

Rasuti mamac do 20 g (štakori i miševi) i do 60 g (samo štakori) pakiran u kadice s toplinski zabrtvljenim poklopcem. Kadice su pakirane u zaštitne (deratizacijske) kutije od HDPE ili PP koje su zaštićene od neovlaštenog otvaranja, namijenjene za jednokratnu ili višekratnu primjenu. Takve kadice sa zaštitnim (deratizacijskim) kutijama su složene kao 1/2/4 kom u kartonskoj kutiji ili u blister pakiranju ili u kartonskoj vrećici ili u toplinski zabrtvljenoj vrećici ili u vrećici od višeslojne plastike s toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom u pakiranjima od:

- 40 g – 144
- 50 g – 120, 144
- 60 g – 96, 120
- 80 g – 72, 96
- 90 g – 60, 72, 96
- 100 g – 60, 72, 96
- 120 g – 48, 60, 72
- 200 g – 32, 48, 60
- 240 g – 24, 32, 48, 60

4.9.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

U kanalizaciji postaviti 200 g do 300 g mamca svakih 30-50 m (ne više od 300 g po kanalizacijskom šahtu).

Zaštitne (deratizacijske) kutije s mamcem treba dobro pričvrstiti da ih voda ne može odnijeti.

Redovito provjeravati potrošnju mamca i zamijeniti pojedeni ili oštećeni mamac do prestanka potrošnje.

Ponoviti tretiranje ukoliko postoje dokazi o novoj infestaciji glodavcima.

Mamce treba postaviti na način da ne dođu u dodir s vodom i da ih voda ne može odnijeti.

- Slijediti sve dodatne upute preporučene relevantnim Kodeksom najbolje prakse.

- Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati odrediti vjerojatni uzrok i opseg infestacije.

- Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetočinama (IPM), koje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole.

- Status otpornosti ciljne populacije trebalo bi uzeti u obzir prilikom razmatranja izbora rodenticida koji će se koristiti. U onim područjima gdje se sumnja na rezistenciju na određene aktivne sastojke, treba izbjegati njihovu uporabu. Za kontrolu širenja rezistencije, preporučljivo je naizmjenično koristiti mamce koji sadrže različite antikoagulantne aktivne sastojke

- Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označeni tijekom trajanja cijelog postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antikoagulansom, kao i upute o postupcima prve pomoći u slučaju otrovanja; navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.

4.9.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

(Ako to zahtijeva nacionalna politika ili zakonodavstvo): Postaviti mamce samo u kanalizacijski sustav koji je povezan sa sustavom za obradu otpadnih voda.

Tijekom rukovanja proizvodom, nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374).

Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju najezde glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

4.9.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada se kutije s mamcem postavljaju u blizini površinskih voda (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.9.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.9.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Prije uporabe treba pročitati i pridržavati se Uputa za uporabu proizvoda, kao i svih informacija koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje.

Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.

Prije uporabe rodenticida, treba razmotriti i ne-kemijske metode kontrole (npr. uporabu zamki kao alternativne mjere kontrole).

Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostaci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Osim toga, nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to uznemiruje populaciju glodavaca i otežava prihvaćanje mamaca.

Ne otvarati vrećice koje sadrže mamac (Osposobljeni profesionalci - mamac u vrećicama - u vrećicama koje se ne otvaraju).

Kutije s mamcima treba postaviti u neposrednu blizinu mjesta na kojima je uočena aktivnost glodavaca.

Gdje je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti za tlo ili drugu površinu.

Ne postavljati kutije s mamcima u blizini sustava za odvodnju vode, gdje mogu doći u dodir s vodom.

Kutije s mamcem treba postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim.

Kutije s mamcem treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.

Tijekom uporabe proizvoda ne jesti, piti niti pušiti. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.

Profesionalni korisnici & Osposobljeni profesionalci: Ako se i nakon razdoblja tretmana od 35 dana mamci nastavljaju konzumirati i ne opaža se smanjena aktivnost glodavaca, treba odrediti mogući uzrok tomu.

Gdje su isključeni drugi elementi, vjerojatno je da postoje rezistentni glodavci, pa treba razmotriti uporabu neantikoagulantnih rodenticida, ukoliko su dostupni ili snažnijeg antikoagulantnog rodenticida. Također treba razmotriti uporabu zamki kao alternativne mjere kontrole.

Profesionalni korisnici & Osposobljeni profesionalci: - Rasute žitarice: Mamac postaviti na mjesto za postavljanje pomoću uređaja za doziranje. Potrebno je navesti postupke za smanjivanje prašine (npr. vlažno brisanje). Nakon provedenog tretmana treba ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcima.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Proizvode koji sadrže brodifakum ne koristiti kao trajne mamce (npr. za sprečavanje infestacije glodavaca ili otkrivanje aktivnosti glodavaca).

Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima: Otropane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu, odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.

Tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretmana, barem onoliko često koliko se provodi izvid kutija s postavljenim mamcem.

Uporabom ovog proizvoda, glodavci bi trebali biti suzbijeni unutar 35 dana. Podaci o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) trebaju jasno sadržavati preporuku da u slučaju sumnje na nedostatak učinkovitosti na kraju provedenog tretmana (aktivnost glodavaca i dalje prisutna), korisnik treba potražiti savjet od dobavljača proizvoda ili zvati ovlaštenu tvrtku za suzbijanje glodavaca

(Za proizvode namijenjene profesionalnim korisnicima): Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da proizvod nije dostupan općoj javnosti ("samo za profesionalne korisnike").

(Za proizvode namijenjene osposobljenim profesionalnim korisnicima): Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da proizvod mogu nabaviti samo osposobljeni profesionalni korisnici koji posjeduju certifikat koji potvrđuje sukladnost s odgovarajućim zahtjevima izobrazbe (npr. "samo za osposobljene profesionalce").

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadrži antikoagulans. Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i uključuju krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima može doći do pojave modrica i prisutnosti krvi u izmetu ili urinu.

Antidot: Vitamin K1 koji smiju primjenjivati samo medicinski/veterinarski stručnjaci

U slučaju:

Dodira s kožom: oprati izloženu kožu vodom, a zatim sapunom i vodom

Dodira s očima: oči isprati tekućinom za ispiranje očiju ili vodom, očne kapke držati otvorenima barem 10 minuta.

U slučaju gutanja: pažljivo isprati usta vodom. Nikada ne davati ništa na usta osobi bez svijesti. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati spremnik ili deklaraciju proizvoda.

Ako je kućni ljubimac progutao proizvod, potražiti savjet veterinara.

Kutije za izlaganje mamaca moraju imati istaknute slijedeće informacije: "ne micati i ne otvarati", "sadrži rodenticid", "naziv proizvoda i broj odobrenja", "aktivna tvar(i)" i "u slučaju nesreće, nazvati Centar za kontrolu otrovanja (01/2348-342)".

Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Po završetku tretiranja, zbrinuti ostatke mamca i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Preporučuje se nositi rukavice.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Rok uporabe: 24 mjeseca

Čuvati na suhom, hladnom i prozračnom mjestu. Spremnik držati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla.

Pohraniti na mjestu koje je nepristupačno djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

Držati samo u izvornom spremniku

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

Zbog odgođenog početka djelovanja antikoagulantnih rodenticida, nakon njihova uzimanja, potrebno je od 4 do 10 dana do pojave vidljivih znakova otrovanja.

Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, prilikom njihova odlaganja koristiti rukavice ili alate kao što su kliješta.

Ovaj proizvod sadrži gorcu tvar i boju.