

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

Nome do produto: Racumin pasta

Tipo(s) do produto: TP 14 - Rodenticidas

Número da autorização: PT/DGS ARMPB-12/2014

**Número de referência do ativo
R4BP 3:** PT-0008231-0000

Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	1
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	2
2.2. Tipo de formulação	2
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	2
4. Utilização(ões) autorizada(s)	3
4.1.1 Instruções específicas de utilização	4
4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas	4
4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de	4
4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua	4
4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em	5
5. Orientações gerais para a utilização	5
5.1. Instruções de utilização	5
5.2. Medidas de redução do risco	5
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e	5
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	5
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de	5
6. Outras informações	5

Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto

Racumin pasta

1.2. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	BayerCropScience (Portugal), Produtos para a Agricultura, Lda.
	Endereço	Rua Quinta do Pinheiro, 5 2794-003 CARNAXIDE OEIRAS Portugal
Número da autorização	PT/DGS ARMPB-12/2014	
Número de referência do ativo R4BP 3	PT-0008231-0000	
Data da autorização	10/11/2014	
Data de caducidade da autorização	30/06/2018	

1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante	Bayer S.A.S
Endereço do fabricante	Rue Jean-Marie Leclair, 16 - CS 90106 69266 LYON Cedex 09 Lyon França
Localização das instalações de fabrico	Via C. Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo (VE) Vigonovo Itália
	Via Sorgaglia 25 35020 Arre (PD) Arre Itália

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	18 - Cumatetralilo
Nome do fabricante	Bayer S.A.S.
Endereço do fabricante	Rue Jean-Marie Leclair, 16 - CS 90106 69266 LYON Cedex 09 Lyon França
Localização das instalações de fabrico	Alfred-Nobel-Str. 50 Monheim am Rhein 40789 Monheim am Rhein Alemanha

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Cumatetralilo		Substância ativa	5836-29-3	227-424-0	0.0375

2.2. Tipo de formulação

PA - Pasta

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo	<p>Nocivo por ingestão.</p> <p>"Pode afectar os órgãos ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos após exposição prolongada ou repetida indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição."</p>
Recomendações de prudência	<p>Não respirar poeiras.</p> <p>Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.</p> <p>Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.</p> <p>EM CASO DE INGESTÃO:Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.</p> <p>Enxaguar a boca.</p>

Em caso de indisposição, consulte um médico.

Eliminar o conteúdo em centros de receção de lixo ou pontos de recolha apropriados.

4. Utilização(ões) autorizada(s)

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - Uso pelo público em geral

Tipo de produto	TP 14 - Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Dentro e em redor de edifícios domésticos, industriais e comerciais.
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Mus musculus-Rato doméstico-Jovens e adultos Rattus norvegicus-Ratazana-Juvenis e adultos Rattus rattus-Ratazana-jovens e adultos
Campos de utilização	Interior Exterior Utilização dentro e em redor de habitações.
Método(s) de aplicação	Aplicação de isco - O produto deve ser aplicado pelo público em geral, no controlo de roedores, exclusivamente em caixas porta-isco opacas, seguras e invioláveis. São consideradas seguras, as caixas porta-iscos nas quais os iscos são inacessíveis a crianças e organismos não visados. Além disso, a caixa deve dispor de um fecho que impeça a sua abertura por crianças. Doses de aplicação: No interior de edifícios: - Ratazanas, infestação severa: de 50g a 100g de producto / caixa porta isco. Distância entre caixas: de 3 a 10 metros. - Ratazanas, infestação ligeira: de 50g a 100g de producto / caixa porta isco. Distância entre caixas: de 5 a 20 metros. - Ratos, infestação severa: de 10 g a 20g de producto / caixa porta isco. Distância entre caixas de 2 a 10 metros. - Ratos, infestação ligeira: de 10 g a 20g de producto / caixa porta isco. Distância entre caixas de 5 a 20 metros. Em redor de edifícios: - Ratazanas, infestação severa: de 50g a 100g de producto / caixa porta isco. Distância entre caixas: de 3 a 10 metros. - Ratazanas, infestação ligeira: de 50g a 100g de producto / caixa porta isco. Distância entre caixas: de 5 a 20 metros.
Frequência de aplicação e dosagem	Conforme indicado na descrição detalhada acima. - 0 - Conforme necessário pela presença da praga.

Categoria(s) de utilizadores

Público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem

Saqueta - Plástico: PET - < 1,5 Kg

Caixa - Papel, cartão - < 1,5 Kg

4.1.1 Instruções específicas de utilização

O produto deve ser aplicado pelo público em geral, no controlo de roedores, exclusivamente em caixas porta-isco opacas, seguras e invioláveis. São consideradas seguras, as caixas porta-iscos nas quais os iscos são inacessíveis a crianças e organismos não visados. Além disso, a caixa deve dispor de um fecho que impeça a sua abertura por crianças. As caixas porta isco podem ser colocados dentro e em redor de edifícios domésticos, industriais e comerciais, excluindo instalações pecuárias, em zonas infestadas (ao longo de paredes, janelas ...).

O número de saquetas individuais de papel por caixa porta isco deverá ser adaptada à taxa efetiva. O nº de caixas porta-isco é função da área a tratar e da taxa de infestação. As distâncias entre caixas porta isco deverá ser respeitada.

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

- Impedir o acesso a crianças e a animais domésticos ou selvagens.
 - Coloque as caixas porta-isco ao abrigo da chuva e em zonas não inundáveis.
 - Conservar unicamente no recipiente de origem.
 - As caixas porta-isco devem conter apenas rodenticidas.
 - É recomendado o uso de luvas.
 - Não abrir as caixas porta-isco.
 - Lave as mãos depois de a utilizar.
 - Retire todas as caixas porta-isco após o tratamento.
- A indicar nas caixas porta-isco:
- Não abrir esta caixa porta-isco ou as saquetas que contém.
 - (S2) Manter for do alcance das crianças.
 - (S13) Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Em caso de exposição, contacte imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV – tel: 808 250 143) ou um medico e descreva-lhe a situação (informe sobre o rótulo e magnitude da exposição):

- Em caso de inalação: permaneça em repouso e respire ar fresco.
- Em caso de contacto com a pele: Retire a roupa contaminada e lave a pele com sabão, enxaguando abundantemente com água. Não use solventes ou diluentes.
- Em caso de contacto com os olhos: lave abundantemente com água corrente (tépidas, se possível) durante vários minutos, mantendo as pálpebras abertas debaixo do fluxo de água.
- Em caso de ingestão, consultar imediatamente o medico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Não provoque o vômito. Não coma ou beba, qualquer que tenha sido a quantidade ingerida. Em caso de emergência, ligue o 112 ou para o CIAV (tel: 808 250 143).
- Informação para o medico: O produto Racumin Pasta contém um rodenticida anticoagulante, podendo ser necessário tratamento com vitamina K1 durante muito tempo.

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

- Não limpe as caixas porta-isco entre duas aplicações.
- Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.
- Não elimine o produto no ambiente ou canalizações.
- Elimine as caixas porta-isco em centros de receção de lixo ou pontos de recolha apropriados.
- As embalagens não devem ser reutilizadas ou recicladas.
- Os restos de isco não consumido, não utilizado ou resíduos em volta das caixas porta-isco devem ser recolhidos e eliminados em centros de receção de lixo ou pontos de recolha apropriados.

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Manter sempre os recipientes bem fechados em locais frescos e secos, longe de pessoas não autorizadas, alimentos e animais domésticos.
Evitar a exposição à luz solar direta.
Manter afastado de fontes de combustão.
O produto pode armazenar-se e utilizar-se até dois anos após a data de fabrico.

5. Orientações gerais para a utilização

5.1. Instruções de utilização

ver usos autorizados

5.2. Medidas de redução do risco

ver usos autorizados

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

ver usos autorizados

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

ver usos autorizados

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

ver usos autorizados

6. Outras informações