

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: REPELENT sprej FORTE

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-2014-0035

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0008182-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	6
5.1. Pokyny pro používání	6
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	6
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	7
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	8
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	8
6. Další informace	8

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

REPELENT sprej FORTE
Reskito Repellent FORTE DEET 28 %
ComarEX repellent Forte spray

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	ALPA, a. s.
	Adresa	Hornoměstská 378 59401 Velké Meziříčí Česká republika
Číslo povolení	CZ-2014-0035	
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0008182-0000	
Datum udělení povolení	28/04/2016	
Datum skončení platnosti povolení	05/06/2025	

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	ALPA a. s.
Adresa výrobce	Hornoměstská 378 41501 Velké Meziříčí Česká republika
Umístění výrobních závodů	Hornoměstská 378 41501 Velké Meziříčí Česká republika

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	23 - N,N-diethyl-m-toluamid
Název výrobce	Vertellus Specialities Belgium NV
Adresa výrobce	Haven 611, Tijsmantunnel 2040 Antwerp Belgie
Umístění výrobních závodů	Haven 611, Tijsmantunnel 2040 Antwerp Belgie

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
N,N-diethyl-m-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	účinná látka	134-62-3	205-149-7	28
Ethanol	Ethanol	Neúčinná látka	64-17-5	200-578-6	62,7
Směs Ledová řeka (parfém)		Neúčinná látka			0,3
Propylenglykol	Propan-1,2-diol	Neúčinná látka	57-55-6	200-338-0	5
Isopropylmyristat	(2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid	Neúčinná látka	110-27-0	203-751-4	4

2.2. Typ složení přípravku

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Odstraňte obsah /obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů..

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Neprofesionální použití.

Typ přípravku

Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Repelentní sprej určený k aplikaci přímo na kůži nebo oblečení za účelem ochrany lidského zdraví.

Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 12 let.

U dětí starších 12 let a dospělých je možné přípravek aplikovat maximálně jednou denně.

U dětí starších 12 let se přípravek neaplikuje na ruce.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Ixodidae:
Obecný název: Klíště obecné
Vývojové stadium: všechna vývojová stadia

Latinský název: aedes aegypti
Obecný název: Komár
Vývojové stadium: Dospělci

Latinský název: Simuliidae:
Obecný název: Muchnička zdobná
Vývojové stadium: Dospělci

Latinský název: Tabanidae:
Obecný název: Bzikavka dešťová
Vývojové stadium: Dospělci

Oblast použití

Venkovní

Přípravek se aplikuje pravidelnými nástříky tak, aby rovnoměrně pokryl pokožku nebo oblečení.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Nástřík

Podrobný popis:

Přípravek se aplikuje pravidelnými nástříky tak, aby rovnoměrně pokryl pokožku nebo

oblečení.

Komár egyptský

Přípravek při dávce 0,20 mg účinné látky DEET na cm² (tomu odpovídá 0,7 mg biocidního přípravku na cm²) je dostatečně účinný po dobu 4 hodin proti komárům při rovnoměrné aplikaci přímo na pokožku nebo oblečení.

Při dávce 0,41 mg účinné látky DEET na cm² (tomu odpovídá 1,5 mg biocidního přípravku na cm²) je dostatečně účinný proti komárům po dobu až 6 hodin.

Klíště obecné

Přípravek při dávce 0,20 mg účinné látky DEET na cm² (tomu odpovídá 0,7 mg biocidního přípravku na cm²) je dostatečně účinný po dobu 3-4 hodin proti klíšťatům při rovnoměrné aplikaci přímo na pokožku nebo oblečení.

Při dávce 0,41 mg účinné látky DEET na cm² (tomu odpovídá 1,5 mg biocidního přípravku na cm²) je dostatečně účinný proti klíšťatům po dobu až 6 hodin.

Muchnička zdobná

Přípravek při dávce 0,16 mg účinné látky DEET na cm² (tomu odpovídá 0,6 mg biocidního přípravku na cm²) je dostatečně účinný po dobu 3-4 hodin proti muchničkám při rovnoměrné aplikaci přímo na pokožku nebo oblečení.

Bzikavka dešťová

Přípravek při dávce 0,16 mg účinné látky DEET na cm² (tomu odpovídá 0,6 mg biocidního přípravku na cm²) je dostatečně účinný po dobu 3 hodin proti bzikavce při rovnoměrné aplikaci přímo na pokožku nebo oblečení.

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: max. 6 g přípravku na jednu aplikaci
Ředění (%): 100
Počet a načasování aplikace:
Nejvýše jednou denně

Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Hliníková tlaková nádoba opatřená mechanickým rozstříkovacím uzávěrem.

Velikosti obalu pro neprofesionální použití: 20,0 až 750,0 ml

Velikosti obalu pro profesionální použití: není povoleno.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Přípravek se nastříká a rozetře na nechráněná místa kůže.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Přípravkem ošetřenou kůži nevystavovat slunečnímu záření.

Po návratu z venkovního prostředí omyjte co nejdříve ošetřenou kůži mýdlem a vodou.

Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 12 let.

Přípravek se neaplikuje na ruce u dětí nad 12 let

Skladujte přípravek odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Přípravek není určen pro průmyslové použití a profesionální uživatele.

Uchovávejte přípravek mimo dosah dětí.

Zamezte styku přípravku s očima a ústy.

U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce.

Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.

Nevdechujte aerosoly.

Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Nevystavujte nádobu slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Prázdnou nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Nestříkejte obsah nádoby do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Maximální doba skladovatelnosti přípravku je 36 měsíců.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Přípravek může ohrozit zdraví při požití a při zasažení očí.

Nepoužívat na nadměrně opálenou nebo narušenou pokožku.

Pokud by byla potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo označení.

Po zasažení očí je několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout.

Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání: Přemístěte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Obal se zbytky přípravku odstraňte jako nebezpečný odpad.
Prázdný obal odložte do separovaného sběru druhotných surovin.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Uchovávejte při teplotě +5 až + 25 °C.
Skladovatelnost při normálních podmínkách skladování je nejméně 36 měsíců od data výroby.

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

Přípravek se aplikujte pravidelnými nástřiky tak, aby rovnoměrně pokryl pokožku nebo oblečení.

U dětí na 12 let neaplikujte na ruce.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Přípravkem ošetřenou kůži nevystavovat slunečnímu záření.

Po návratu z venkovního prostředí omyjte co nejdříve ošetřenou kůži mýdlem a vodou.

Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 12 let.

Přípravek se nesmí nanášet na ruce u dětí starších 12 let.

Skladujte přípravek odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Přípravek není určen pro průmyslové použití a profesionální uživatele.

Při používání přípravku nejezte, nepijte ani nekuřte

Uchovávejte přípravek mimo dosah dětí.

Zamezte styku přípravku s očima a ústy.

U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce.

Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.

Nevdechujte aerosoly.

Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Nevystavujte nádobu slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Prázdnou nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Nestříkejte obsah nádoby do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Maximální doba skladovatelnosti přípravku je 36 měsíců.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Přípravek může ohrozit zdraví při požití a při zasažení očí.

Nepoužívat na nadměrně opálenou nebo narušenou pokožku.

Pokud by byla potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo označení.

Po zasažení očí je několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou (nepolykejte). Vypijte 1-2 sklenice vody obsahující lžičku aktivního uhlí. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc

Při nadýchání: Přemístěte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Obal se zbytky přípravku odstraňte jako nebezpečný odpad.
Prázdný obal odložte do separovaného sběru druhotných surovin.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte při teplotě +5 až + 25 °C.

Skladovatelnost při normálních podmínkách skladování je nejméně 36 měsíců od data výroby.
Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.

6. Další informace

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než výše uvedených, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.