



TERVISEAMET

Bayer A/S
Arne Jacobsen Alle 13
2300 Kopenhaagen
Taani

01.11.2021 nr 10.1-5/21/419-3

Eesti riikliku loa EE-0027039-0000 andmine

Terviseametile esitati 03.06.2021 biotsiidiregistri (R4BP) kaudu biotsiidi **Harmonix Rodent Paste** vastastikuse järjestikku tunnustamise taotlus (NA-MRS: BC-FJ066782-33) tooteliigis 14 vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 17.

Terviseamet kiitis heaks referentliikmesriigi Saksamaa koostatud biotsiidi omaduste kokkuvõtte.

Biotsiidi toimeaine kolekaltsiferool on lubatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/637.

Terviseamet annab 01.11.2021 vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 33 riikliku loa EE-0027039-0000 kehtivusaja lõppkuupäevaga 24.07.2025 biotsiidi Harmonix Rodent Paste turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks kooskõlas käesoleva otsuse lisas (lisatud) toodud biotsiidi omaduste kokkuvõttega.

Vastastikuse tunnustamise alusel antud luba kehtib samadel tingimustel referentliikmesriigi antud loaga vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 32.

Biotsiidi kättesaadavaks tegemisel peab järgima Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklite 69 ja 72 nõudeid ja heakskiidetud biotsiidi omaduste kokkuvõtet.

Loomanik või tema esindaja esitab pädevale asutusele loa uuendamise taotluse vähemalt 550 päeva enne loa kehtivusaja lõppkuupäeva vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 31.

Loaomanik peab teatama ettenägematust ja kahjulikust mõjust vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 47.

Luba on võimalik tühistada vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklitele 48 ja 49.

Luba on võimalik muuta vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklitele 48 ja 50.

Lugupidamisega



Enda Veskimäe
osakonnajuhataja
kemikaaliohutuse osakond

Lisa: Loa number EE-0027039-0000 biotsiidi omaduste kokkuvõte, 19 lehel

ET

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Harmonix Rodent Paste

Tooteliik 14. Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Loa number: EE-0027039-0000

R4BP registrinumber: EE-0027039-0000

1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus	Harmonix Rodent paste
----------------------	-----------------------

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Bayer A/S
	Aadress	Arne Jacobsen Alle 13, 2300 Kopenhaagen, Taani
Loa number	EE-0027039-0000	
<i>R4BP registrinumber</i>	EE-0027039-0000	
Loa andmise kuupäev	01.11.2021	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	24.07.2025	

1.3. Toote tootja(d)

Tootja nimi	Bayer SAS
Tootja aadress	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon (Cedex 09) Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	INDUSTRIALCHIMICA Srl. Via Sorgaglia 40, I-35020 Arre Itaalia Kollant S.r.l., via C. Colombo 7/7, 30030 Vigonovo (VE) Itaalia IRIS 1126A, avenue du Moulinas - Route de Saint Privat F-, 30340 SALINDRES Prantsusmaa

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	Cholecalciferol
Tootja nimi	Bayer S.A.S
Tootja aadress	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon (Cedex 09) Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Fermenta Biotech Limited, Village Takoli; P.O. Nagwain, Mandi ringkond - 175 121 Himachal Pradesh India Fermenta Biotech Limited, Z-109 B & C, SEZ II, Dahej, Taluka - Vagara, Bharuchi ringkond - 392130 Gujarat India

2. TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Cholecalciferol		Toimeaine	67-97-0	200-673-2	0,077

2.2. Oleku kirjeldus

RB - Sööt (kasutusvalmis)

3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	
Hoiatuslaused	

4. LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1. Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Koduhiir, rändrott, kodurott – kutseline kasutaja – siseruumides

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane rodentitsiidide korral
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid Teaduslik nimetus: Rattus rattus Tavanimetus: Kodurott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid
Kasutukoht	Sisetingimustes siseruumides
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis sööt, mida kasutatakse avamiskindlates lõksudes (avamiskindlate lõksude kohta vt dokumenti CA-Nov16-Doc.4.1c-Final.)
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Rotid: 100 g kuni 200 g sööta söödapunkti kohta. Hiired: 20 g sööta söödapunkti kohta. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus:

	<p>Rotid:</p> <p>100–200 g sööta söödapunkti kohta sõltuvalt arvukuse tasemest.</p> <p>Kui on vaja rohkem kui ühte lõksu, peaks lõksude minimaalne vahekaugus olema 10–20 meetrit (väikese arvukuse korral) ja 3–10 meetrit (suure arvukuse korral).</p> <p>Kui sööt on ühe kontrollvahemiku jooksul täielikult ära tarbitud, tuleb lisada 200 g toodet.</p> <p>Hiired:</p> <p>20 g sööta söödapunkti kohta sõltuvalt arvukuse tasemest.</p> <p>Kui on vaja rohkem kui ühte lõksu, peaks lõksude minimaalne vahekaugus olema 5–20 meetrit (väikese arvukuse korral) ja 2-5 meetrit (suure arvukuse korral).</p> <p>Kui sööt on ühe kontrollvahemiku jooksul täielikult ära tarbitud, tuleb lisada 20 g toodet.</p>
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>Sööt eraldi kotikestes, pikakiuline paber, 20 g</p> <p>Esmane pakend: Teekott (tselluloos), 20 g</p> <p>Sekundaarne pakend:</p> <p>Pakendi tüüp: Ämber</p> <p>Pakendi suurus/maht: kuni 10 kg</p> <p>Pakendi materjal: LDPE sisemine kotike plastist PP ämbris</p> <p>Pakendi tüüp: Karp</p> <p>Pakendi suurus/maht: kuni 15 kg</p> <p>Pakendi materjal: Sisemine COEX PET/LDPE plastkotike pappkarbis</p>

	Pakendi tüüp: Kott Pakendi suurus/maht: 5 kg Pakendi materjal: Plast: COEX PET/LDPE plastkott, käepideme ja uuesti suletava lukuga
--	--

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

- 1) Lõksud tuleb üle vaadata vähemalt iga 1 kuni 2 päeva järel tõrje alguses ja seejärel vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas sööta on tarbitud ja lõksud on terved ning eemaldada näriliste korjused. Vajadusel täitke lõks uuesti söödaga.
- 2) Viia läbi tõrjepiirkonna eeluuring ja kohapealne uuring, et selgitada välja näriliste liigid, nende tegevuskohad ning määrata kindlaks näriliste esinemise tõenäoline põhjus ja ulatus.
- 3) Eemaldada närilistele kergesti kättesaadav toit (nt maha kukkunud teravili või toidujäätmed). Lisaks sellele mitte puhastage tõrjepiirkonda vahetult enne tõrje teostamist, kuna see üksnes häirib näriliste populatsiooni ja raskendab sööda tarbimise saavutamist.
- 4) Sööt peaks olema kinnitatud nii, et seda ei saa lõksust minema viia.
- 5) Eemaldada alles jäänud sööt või lõksud tõrjeperioodi lõpus.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

- 1) Mitte kasutage toodet püsisöödana näriliste esinemise ennetamiseks või näriliste tegevuse jälgimiseks.
- 2) Selle toote kasutamine peaks kõrvaldama närilised 35 päeva jooksul. Tooteteabes (s.t. etiketil ja/või infolehel) peab olema selgelt märgitud, et kui tõrje lõpuks kahtlustatakse tõhususe puudumist (s.t. endiselt võib täheldada näriliste esinemist), peab kasutaja pöörduma toote tarnija poole või kutsuma kohale kahjuritõrje spetsialisti.
- 3) Mitte pesta lõkse veega kasutuskordade vahel.
- 4) Mitte kasutada toodet pulseerivaks tõrjeks.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Lõksude paigutamisel vee äravoolustsüsteemide lähedusse veenduda, et sööt ei puutu veega kokku.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

4.2. Kasutusala kirjeldus

Tabel 2. Kasutus # 2 – Koduhiir, rändrott, kodurott – kutseline kasutaja – Välistingimustes: hoonete ümbruses

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane rodentitsiidide korral
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	<p>Teaduslik nimetus: <i>Rattus norvegicus</i> Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p> <p>Teaduslik nimetus: <i>Rattus rattus</i> Tavanimetus: Kodurott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p> <p>Teaduslik nimetus: <i>Mus musculus</i> Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p>
Kasutukoht	Välistingimustes Välistingimustes: hoonete ümbruses
Kasutusmeetod(id)	<p>Meetod: Kasutamine söödana</p> <p>Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis sööt, mida kasutatakse avamiskindlates lõksudes (avamiskindlate lõksude kohta vt dokumenti CA-Nov16-Doc.4.1c-Final.)</p>
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kasutusmäär: Rotid: 100 g kuni 200 g sööta söödapunkti kohta. Hiired: 20 g sööta söödapunkti kohta.</p> <p>Lahjendus (%): -</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus: Rotid: 100–200 g sööta söödapunkti kohta sõltuvalt arvukuse tasemest.</p> <p>Kui on vaja rohkem kui ühte lõksu, peaks lõksude minimaalne vahekaugus olema 10–20 meetrit (väikese arvukuse korral) ja 3–10 meetrit (suure arvukuse korral).</p> <p>Kui sööt on ühe kontrollvahemiku jooksul täielikult ära tarbitud, tuleb lisada 200 g toodet.</p> <p>Hiired:</p>

	<p>20 g sööta söödapunkti kohta sõltuvalt arvukuse tasemest.</p> <p>Kui on vaja rohkem kui ühte lõksu, peaks lõksude minimaalne vahekaugus olema 5–20 meetrit (väikese arvukuse korral) ja 2-5 meetrit (suure arvukuse korral).</p> <p>Kui sööt on ühe kontrollvahemiku jooksul täielikult ära tarbitud, tuleb lisada 20 g toodet.</p>
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>Sööt eraldi kotikestes, pikakiuline paber, 20 g</p> <p>Esmane pakend: Teekott (tselluloos), 20 g</p> <p>Sekundaarne pakend:</p> <p>Pakendi tüüp: Ämber</p> <p>Pakendi suurus/maht: kuni 10 kg</p> <p>Pakendi materjal: LDPE sisemine kotike plastist PP ämbris</p> <p>Pakendi tüüp: Karp</p> <p>Pakendi suurus/maht: kuni 15 kg</p> <p>Pakendi materjal: Sisemine COEX PET/LDPE plastkotike pappkarbis</p> <p>Pakendi tüüp: Kott</p> <p>Pakendi suurus/maht: 5 kg</p> <p>Pakendi materjal: Plast: COEX PET/LDPE plastkott, käepideme ja uuesti suletava lukuga</p>

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

- 1) Paigutada lõksud piirkonda, kus ei esine üleujutust.
- 2) Lõksud tuleb üle vaadata vähemalt iga 1 kuni 2 päeva järel tõrje alguses ja seejärel vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas sööta on tarbitud ja lõksud on terved ning eemaldada näriliste korjused. Vajadusel täitke lõks uuesti söödaga.
- 3) Asendada sööt lõksus, kui sööt on saanud veekahjustusi või mustusega saastunud.
- 4) Viia läbi tõrjepiirkonna eeluuring ja kohapealne uuring, et selgitada välja näriliste liigid, nende tegevuskohad ning määrata kindlaks näriliste esinemise tõenäoline põhjus ja ulatus.
- 5) Eemaldada närilistele kergesti kättesaadav toit (nt maha kukkunud teravili või toidujäätmed). Lisaks sellele mitte puhastada tõrjepiirkonda vahetult enne tõrje teostamist, kuna see üksnes häirib näriliste populatsiooni ja raskendab sööda tarbimise saavutamist.
- 6) Sööt peaks olema kinnitatud nii, et seda ei saa lõksust minema viia.
- 7) Tõrje tuleb lõpetada, kui sööta enam ei tarbita.
- 8) Eemaldada alles jäänud sööt või lõksud tõrjeperioodi lõpus.

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

- 1) Mitte paigutada toodet otse urgudesse.
- 2) Tooteteabes (s.t. etiketil ja/või infolehel) peab olema selgelt märgitud, et:
 - a) toode pole ette nähtud laiatarbemüügiks (nt „ainult kutseliseks kasutamiseks”).
 - b) toodet tuleb kasutada sobivates avamiskindlates lõksudes (nt „kasutada ainult avamiskindlates lõksudes”).
 - c) kasutajad peavad märgistama lõksud nõuetekohaselt SPC punktis 5.3 kirjeldatud teabega (nt märgistama lõksud vastavalt tootenõuetele).
- 3) Selle toote kasutamine peaks kõrvaldama närilised 35 päeva jooksul. Tooteteabes (s.t. etiketil ja/või infolehel) peab olema selgelt märgitud, et kui tõrje lõpuks kahtlustatakse tõhususe puudumist (s.t. endiselt võib täheldada näriliste esinemist), peab kasutaja pöörduma toote tarnija poole või kutsuma kohale kahjuritõrje spetsialisti..
- 4) Mitte pesta lõkse veega kasutuskordade vahel.
- 5) Tõrje ajal leida ja eemaldada surnud närilised vähemalt sama sageli, kui lõkse kontrollitakse.
- 6) Paigutada surnud närilised olmeprügi hulka või suunata jäätmejaama. Vältida otsest kokkupuudet.
- 7) Mitte kasutada toodet püsisöödana näriliste esinemise ennetamiseks või näriliste tegevuse jälgimiseks.
- 8) Mitte kasutada toodet pulseerivaks tõrjeks.

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Lõksude paigutamisel pinnaveekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või vee äravoolusüsteemide lähedusse vältida sööda kokkupuudet veega.

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

4.3. Kasutusala kirjeldus

Tabel 3. Kasutus # 3 – Koduhiir, rändrott, kodurott - Väljaõppe saanud kutseline kasutaja – Siseruumides

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane rodentitsiidide korral
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	<p>Teaduslik nimetus: <i>Rattus norvegicus</i> Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p> <p>Teaduslik nimetus: <i>Rattus rattus</i> Tavanimetus: Kodurott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p> <p>Teaduslik nimetus: <i>Mus musculus</i> Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p>
Kasutuskohat	Sisetingimustes siseruumides
Kasutusmeetod(id)	<p>Meetod: Kasutamine söödana</p> <p>Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis sööt kasutamiseks avamiskindlates lõksudes</p> <p>Kaetud ja kaitstud söödapunktid, kui need tagavad sama kaitsetaseme muudele liikidele ja inimestele nagu avamiskindlad lõksud</p>
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kasutusmäär: Rotid: 100 g kuni 200 g sööta söödapunkti kohta. Hiired: 20 g sööta söödapunkti kohta.</p> <p>Lahjendus (%): -</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus: Rotid: 100–200 g sööta söödapunkti kohta sõltuvalt arvukuse tasemest.</p> <p>Kui on vaja rohkem kui ühte lõksu, peaks lõksude minimaalne vahekaugus olema 10–20 meetrit (väikese arvukuse korral) ja 3–10 meetrit (suure arvukuse korral).</p>

	<p>Kui sööt on ühe kontrollvahemiku jooksul täielikult ära tarbitud, tuleb lisada 200 g toodet.</p> <p>Hiired:</p> <p>20 g sööta söödapunkti kohta sõltuvalt arvukuse tasemest.</p> <p>Kui on vaja rohkem kui ühte lõksu, peaks lõksude minimaalne vahekaugus olema 5–20 meetrit (väikese arvukuse korral) ja 2-5 meetrit (suure arvukuse korral).</p> <p>Kui sööt on ühe kontrollvahemiku jooksul täielikult ära tarbitud, tuleb lisada 20 g toodet.</p> <p>Püsisööd (vt kasutuspõhiseid kasutusjuhiseid)</p>
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>Sööt eraldi kotikestes, pikakiuline paber, 20 g</p> <p>Esmane pakend: Teekott (tselluloos), 20 g</p> <p>Sekundaarne pakend:</p> <p>Pakendi tüüp: Ämber</p> <p>Pakendi suurus/maht: kuni 10 kg</p> <p>Pakendi materjal: LDPE sisemine kotike plastist PP ämbris</p> <p>Pakendi tüüp: Karp</p> <p>Pakendi suurus/maht: kuni 15 kg</p> <p>Pakendi materjal: Sisemine COEX PET/LDPE plastkotike pappkarbis</p>

	Pakendi tüüp: Kott Pakendi suurus/maht: 5 kg Pakendi materjal: Plast: COEX PET/LDPE plastkott, käepideme ja uuesti suletava lukuga
--	--

4.3.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- 1) Viia läbi tõrjepiirkonna eeluuring ja kohapealne uuring, et selgitada välja näriliste liigid, nende tegevuskohad ning määrata kindlaks näriliste esinemise tõenäoline põhjus ja ulatus.
- 2) Toode tuleb paigutada nende kohtade vahetusse lähedusse, kus on varem täheldatud näriliste tegevust (nt liikumisteed, pesitsuskohad, toitumisalad, augud, urud vms).
- 3) Sööt peaks olema kinnitatud nii, et seda ei saa lõksust minema viia.

4.3.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- 1) Mitte kasutada toodet pulseerivaks tõrjeks.
- 2) Tooteteabes (s.t. etiketil ja/või infolehel) peab olema selgelt märgitud, et toodet võib tarnida ainult väljaõppe saanud kutselisele kasutajale, kellel on tunnistus, mis tõendab vastavust kehtivatele koolitusnõuetele (nt „ainult väljaõppe saanud kutselisele kasutajale”).
- 3) Mitte kasutada piirkondades, kus võib kahtlustada resistentsust toimeaine suhtes.
- 4) Mitte pesta lõkse ega vahendeid, mida kasutatakse kaetud ja kaitstud söödapunktides, kasutuskordade vahel veega.

4.3.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Söödapunktide paigutamisel vee äravoolusüsteemide lähedusse veenduda, et sööt ei puutu veega kokku.

4.3.4. Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

vt punkti 5.4

4.3.5. Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

vt punkti 5.5

4.4. Kasutusala kirjeldus

Tabel 4. Kasutus # 4 – Koduhiir, rändrott, kodurott – Väljaõppe saanud kutseline kasutaja – Väli tingimustes: hoonete ümbruses

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane rodentitsiidide korral
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	<p>Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p> <p>Teaduslik nimetus: Rattus rattus Tavanimetus: Kodurott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p> <p>Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p>
Kasutuskohat	Välitingimustes Välitingimustes: hoonete ümbruses
Kasutusmeetod(id)	<p>Meetod: Kasutamine söödana</p> <p>Üksikasjalik kirjeldus:</p> <p>Kasutusvalmis sööt kasutamiseks avamiskindlates lõksudes</p> <p>Kaetud ja kaitstud söödapunktid, kui need tagavad sama kaitsetaseme muudele liikidele ja inimestele nagu avamiskindlad lõksud</p> <p>Kasutusvalmis sööda otsene paigutamine urgude.</p>
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kasutusmäär: Rotid: 100 g kuni 200 g sööta söödapunkti kohta. Hiired: 20 g sööta söödapunkti kohta.</p> <p>Lahjendus (%): -</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus:</p> <p>Rotid:</p>

	<p>100–200 g sööta söödapunkti kohta sõltuvalt arvukuse tasemest.</p> <p>Kui on vaja rohkem kui ühte lõksu, peaks lõksude minimaalne vahekaugus olema 10–20 meetrit (väikese arvukuse korral) ja 3–10 meetrit (suure arvukuse korral).</p> <p>Kui sööt on ühe kontrollvahemiku jooksul täielikult ära tarbitud, tuleb lisada 200 g toodet.</p> <p>Hiired:</p> <p>20 g sööta söödapunkti kohta sõltuvalt arvukuse tasemest.</p> <p>Kui on vaja rohkem kui ühte lõksu, peaks lõksude minimaalne vahekaugus olema 5–20 meetrit (väikese arvukuse korral) ja 2-5 meetrit (suure arvukuse korral).</p> <p>Kui sööt on ühe kontrollvahemiku jooksul täielikult ära tarbitud, tuleb lisada 20 g toodet.</p> <p>Püsisööd (vt kasutusjuhiseid kasutusjuhiseid)</p>
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>Sööt eraldi kotikestes, pikakiuline paber, 20 g</p> <p>Esmane pakend: Teekott (tselluloos), 20 g</p> <p>Sekundaarne pakend:</p> <p>Pakendi tüüp: Ämber</p> <p>Pakendi suurus/maht: kuni 10 kg</p> <p>Pakendi materjal: LDPE sisemine kotike plastist PP ämbris</p> <p>Pakendi tüüp: Karp</p> <p>Pakendi suurus/maht: kuni 15 kg</p>

	Pakendi materjal: Sisemine COEX PET/LDPE plastkotike pappkarbis Type of the packaging: Kott Pakendi suurus/maht: 5 kg Pakendi materjal: Plast: COEX PET/LDPE plastkott, käepideme ja uuesti suletava lukuga
--	--

4.4.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

- 1) Paigutada söödapunktid piirkonda, kus ei esine üleujutust.
- 2) Asendada sööt söödapunktis, kui sööt on saanud veekahjustusi või mustusega saastunud.
- 3) Viia läbi tõrjepiirkonna eeluuring ja kohapealne uuring, et selgitada välja näriliste liigid, nende tegevuskohad ning määrata kindlaks näriliste esinemise tõenäoline põhjus ja ulatus.
- 4) Toode tuleb paigutada nende kohtade vahetusse lähedusse, kus on varem täheldatud näriliste tegevust (nt liikumised, pesitsuskohad, toitumisalad, augud, urud vms).
- 5) Sööt peaks olema kinnitatud nii, et seda ei saa lõksust minema viia.

Täiendavad elemendid, mida tuleb arvestada otsesel paigutamisel urgudesse:

- 6) Sööda paigutamisel tuleb vältida võimalust, et mittesihtliigid ja lapsed sellega kokku puutuvad.
- 7) Katta või blokeerida urgude sissepääsud, kuhu sööt on paigutatud, et vähendada sööda kõrvaldamise ja mujale sattumise riski.

4.4.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

- 1) Mitte kasutada toodet pulseerivaks tõrjeks.
- 2) Tooteteabes (s.t. etiketil ja/või infolehel) peab olema selgelt märgitud, et toodet võib tarnida ainult väljaõppe saanud kutselisele kasutajale, kellel on tunnistus, mis tõendab vastavust kehtivatele koolitusnõuetele (nt „ainult väljaõppe saanud kutselisele kasutajale”).
- 3) Mitte kasutada piirkondades, kus võib kahtlustada resistentsust toimeaine suhtes.
- 4) Mitte pesta lõkse ega vahendeid, mida kasutatakse kaetud ja kaitstud söödapunktides, kasutuskordade vahel veega.

4.4.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Lõksude paigutamisel pinnaveekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või vee äravoolusüsteemide lähedusse vältida sööda kokkupuudet veega.

4.4.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

vt punkti 5.4

4.4.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

vt punkti 5.4

4.5. Kasutusala kirjeldus

Tabel 5. Kasutus # 5 – Koduhiir, rändrott, kodurott – Väljaõppe saanud kutseline kasutaja – Välistingimustes, avatud alad ja prügimäed

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane rodentitsiidide korral
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	<p>Teaduslik nimetus: <i>Rattus norvegicus</i> Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p> <p>Teaduslik nimetus: <i>Rattus rattus</i> Tavanimetus: Kodurott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p> <p>Teaduslik nimetus: <i>Mus musculus</i> Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja noored isendid</p>
Kasutuskohat	Välistingimustes Välistingimustes: avatud alad ja prügimäed
Kasutusmeetod(id)	<p>Meetod: Kasutamine söödana</p> <p>Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis sööt kasutamiseks avamiskindlates lõksudes</p> <p>Kaetud ja kaitstud söödapunktid, kui need tagavad sama kaitsetaseme muudele liikidele ja inimestele nagu avamiskindlad lõksud</p> <p>Kasutusvalmis sööda otsene paigutamine urgu.</p>

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kasutusmäär: Rotid: 100 g kuni 200 g sööta söödapunkti kohta. Hiired: 20 g sööta söödapunkti kohta.</p> <p>Lahjendus (%): -</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus:</p> <p>Rotid:</p> <p>100–200 g sööta söödapunkti kohta sõltuvalt arvukuse tasemest.</p> <p>Kui on vaja rohkem kui ühte lõksu, peaks lõksude minimaalne vahekaugus olema 10–20 meetrit (väikese arvukuse korral) ja 3–10 meetrit (suure arvukuse korral).</p> <p>Kui sööt on ühe kontrollvahemiku jooksul täielikult ära tarbitud, tuleb lisada 200 g toodet.</p> <p>Hiired:</p> <p>20 g sööta söödapunkti kohta sõltuvalt arvukuse tasemest.</p> <p>Kui on vaja rohkem kui ühte lõksu, peaks lõksude minimaalne vahekaugus olema 5–20 meetrit (väikese arvukuse korral) ja 2-5 meetrit (suure arvukuse korral).</p> <p>Kui sööt on ühe kontrollvahemiku jooksul täielikult ära tarbitud, tuleb lisada 20 g toodet.</p>
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>Sööt eraldi kotikestes, pikakiuline paber, 20 g</p> <p>Esmane pakend: Teekott (tselluloos), 20 g</p> <p>Sekundaarne pakend:</p>

	<p>Pakendi tüüp: Ämber</p> <p>Pakendi suurus/maht: kuni 10 kg</p> <p>Pakendi materjal: LDPE sisemine kotike plastist PP ämbris</p>
	<p>Pakendi tüüp: Karp</p> <p>Pakendi suurus/maht: kuni 15 kg</p> <p>Pakendi materjal: Sisemine COEX PET/LDPE plastkotike pappkarbis</p>
	<p>Pakendi tüüp: Kott</p> <p>Pakendi suurus/maht: 5 kg</p> <p>Pakendi materjal: Plast: COEX PET/LDPE plastkott, käepideme ja uuesti suletava lukuga</p>

4.5.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- 1) Paigutada söödapunktid piirkonda, kus ei esine üleujutust.
- 2) Asendada sööt söödapunktis, kui sööt on saanud veekahjustusi või mustusega saastunud.
- 3) Viia läbi tõrjepiirkonna eeluuring ja kohapealne uuring, et selgitada välja näriliste liigid, nende tegevuskohad ning määrata kindlaks näriliste esinemise tõenäoline põhjus ja ulatus.
- 4) Toode tuleb paigutada nende kohtade vahetusse lähedusse, kus on varem täheldatud näriliste tegevust (nt liikumisteed, pesitsuskohad, toitumisalad, augud, urud vms).
- 5) Sööt peaks olema kinnitatud nii, et seda ei saa lõksust minema viia.

Täiendavad elemendid, mida tuleb arvestada otsesel paigutamisel urgudesse:

- 6) Sööda paigutamisel tuleb vältida võimalust, et mittesihtliigid ja lapsed sellega kokku puutuvad.
- 7) Katta või blokeerida urgude sissepääsud, kuhu sööt on paigutatud, et vähendada sööda kõrvaldamise ja mujale sattumise riski.

4.5.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- 1) Sekundaarse mürgistuse vältimiseks leida ja eemaldada surnud närilised tõrjealast iga kontrolli käigus.
- 2) Tõrje alguses kontrollida söödapunkte vähemalt iga 1–2 päeva järel ning seejärel vähemalt kord nädalas. Sama kehtib ka tõrjete korral, mis kestavad üle 35 päeva.
- 3) Mitte kasutada toodet püsisöödana näriliste esinemise ennetamiseks või näriliste tegevuse jälgimiseks.
- 4) Mitte kasutada toodet pulseerivaks tõrjeks.
- 5) Tooteteabes (s.t. etiketil ja/või infolehel) peab olema selgelt märgitud, et toodet võib tarnida ainult väljaõppe saanud kutselisele kasutajale, kellel on tunnistus, mis tõendab vastavust kehtivatele koolitusnõuetele (nt „ainult väljaõppe saanud kutselisele kasutajale”).
- 6) Mitte kasutada piirkondades, kus võib kahtlustada resistentsust toimeaine suhtes.
- 7) Mitte pesta lõkse ega vahendeid, mida kasutatakse kaetud ja kaitstud söödapunktides, kasutuskordade vahel veega.

4.5.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeeetmed

hädaolukorras.

Lõksude paigutamisel pinnaveekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või vee äravoolusüsteemide lähedusse vältida sööda kokkupuudet veega.

4.5.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

vt punkti 5.4

4.5.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

vt punkti 5.5

5. ÜLDISED KASUTAMISJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhendid

- 1) Enne kasutamist lugeda ja järgida tooteteavet ning igasugust tootega kaasnevat või müügikohas antud teavet.
- 2) Toodet tuleb kasutada ainult integreeritud kahjuritõrje (IPM) süsteemi osana, mis hõlmab muuhulgas hügieenimeetmeid ja võimaluse korral füüsilisi tõrjemeetodeid.
- 3) Võimaluse korral peavad lõksud olema kinnitatud maapinna või muude konstruktsioonide külge.
- 4) Toode paigutada lastele, lindudele, lemmikloomadele ja koduloomadele ning teistele kõrvalistele loomadele kättesaamatusse kohta.
- 5) Toode paigutada eemale toiduainetest, jookidest ja loomasöödast, samuti vahenditest või pindadest, mis nendega kokku puutuvad.
- 6) Lõksud peavad olema selge märgistusega, mis näitab, et need sisaldavad rodentitsiide ning et neid ei tohi liigutada ega avada (etiketil nõutava teabe kohta vt punkti 5.3).
- 7) Toote kasutamisel mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast toote kasutamist pesta käsi ja otseses kokkupuutes olnud nahka.
- 8) Kui sööda tarbimine on näriliste levikuga võrreldes väike, siis kaaluda võimalust paigutada lõksud ümber teistesse paikadesse ning valida mõni teine sööt.
- 9) Kui pärast 35-päevast tõrjeperioodi jätkub sööda tarbimine endiselt ja näriliste aktiivsuse langust ei täheldata, tuleb kindlaks teha selle tõenäoline põhjus. Kui muud elemendid on välistatud, on põhjus tõenäoliselt näriliste resistentsus, seetõttu kaaluda alternatiivse tõrjemeetmena (antikoagulantse) rodentitsiidi või mehaaniliste lõksude kasutamist.
- 10) Sööt kotikestes: Mitte avada sööta sisaldavaid kotikesi.

¹ Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisharjutused kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Tooteid ei tohi kasutada üle 35 päeva ilma kahjurite levikut ja tõrje tõhusust hindamata.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

1) Tootega kokkupuute korral:

- Nahale sattumisel pesta nahka veega ning seejärel vee ja seebiga.
- Silma sattumisel loputada silmi loputusvedeliku või veega, hoida silmalauge lahti vähemalt 10 minutit.
- Suhu sattumisel loputada suud hoolikalt veega. Mitte manustada teadvuseta isikule kunagi midagi suu kaudu. Mitte kutsuda esile oksendamist. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidake toote pakendit või etiketti. Toote allaneelamisel lemmiklooma poolt pöörduda loomaarsti poole.

2) Ohtlik elusloodusele.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Tõrje lõppedes kõrvaldada söömata jäänud sööt ja pakend kasutuselt vastavalt kohalikele nõuetele.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

- 1) Hoida kuivas, jahedas ja korraliku ventilatsiooniga kohas. Hoida mahuti suletuna ja kaitsta seda otsese päikesevalguse eest.
- 2) Hoida lastele, lindudele, lemmikloomadele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.
- 3) Kõlblikkusaeg: 36 kuud

6. MUU TEAVE

1) Närilised võivad olla haigusekandjad. Ärge puudutage surnud närilisi paljaste kätega, kasutage nende eemaldamisel kindaid või tööriistu, näiteks tange.

2) Toode sisaldab mõruainet ja värvainet.

3) SPC redaktori tehniliste puuduste tõttu loetleme siinkohal järgmised punktid praegusel hetkel kehtiva SPC kohaselt:

Kolekaltsiferool (D3-vitamiin, toimeaine) BP sisaldus (massiprotsentides) 0,077 (tehniline), 0,075 (puhas)

Toimeaine minimaalne puhtus vastavalt määrusele (EL) 2019/637: 970 g/kg

[(Ph. Eur. * 7,0; 01/2008:0575 korrigeeritud 6,5): min. 970 g/kg (sisaldab ka võimalikku kolekaltsiferooli eelühendit)]

Eesti Mürgistusteabekeskuse number: 16662