

# Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

**Denumirea produsului:** STORM PELLETS

**Tipul (tipurile) de produs (produse):** TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

**Numărul curent:** RO/2014/0059/MRA/ 14134 N

**Numărul curent R4BP 3:** RO-0006302-0000

## Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	4
4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	4
4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	5
4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	5
4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	5
4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	6
4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	7
4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	7
4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	8
4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	8
4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	9
4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	9
4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	9
4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	9
4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	9
4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	10
4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	11

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	11
4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	11
4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	11
4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	12
4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	12
4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	13
4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	13
4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	13
5. Direcții generale de utilizare	13
5.1. Instrucțiuni de utilizare	13
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	14
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	15
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	15
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	15
6. Alte informații	15

## Informații administrative

### 1.1. Denumirea comercială a produsului

STORM PELLETS

### 1.2. Detinatorul autorizației

<b>Numele și adresa detinatorului autorizației</b>	Numele	BASF S.R.L.
	Adresa	Soseaua Pipera nr. 43, Sector 2 Bucuresti, 014254 Bucuresti-2 România
<b>Numărul curent</b>	RO/2014/0059/MRA/ 14134 N	
<b>Numărul curent R4BP 3</b>	RO-0006302-0000	
<b>Data autorizației</b>	05/07/2013	
<b>Data de expirare a autorizației</b>	08/03/2023	

### 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

<b>Numele producatorului</b>	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch
<b>Adresa producătorului</b>	Huobstrasse 3, 8088 Pfäffikon SZ Elveția
<b>Adresa locurilor de producție</b>	St. Michaels Industrial Estate, WA8 8TJ Widnes, Regatul Unit

### 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

<b>Substanța activă</b>	34 - Flocumafen
<b>Numele producătorului</b>	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch
<b>Adresa producătorului</b>	Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ Elveția
<b>Adresa locurilor de producție</b>	Lower Road, Halebank, WA8 8 NS Widnes, Regatul Unit

## 2. Compoziția și formularea produsului

### 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Flocumafen	4-hydroxy-3- [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 1,2,3,4-tetrahydro-3- [4- (4- trifluoromethylbenzyloxy) phenyl]-1-	Substanța activă	90035-08-8	421-960-0	0.005
Citric Acid	2-hydroxypropane-1,2,3- tricarboxylic acid		77-92-9	201-069-1	0.5

### 2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)

## 3. Fraze de pericol și de precauție

<b>Fraze de pericol</b>	<p>Poate dăuna fătului.</p> <p>Poate provoca leziuni ale organelor sânge în caz de expunere prelungită sau repetată..</p>
<b>Fraze de precauție</b>	<p>Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.</p> <p>A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.</p> <p>Purtați mănuși de protecție.</p> <p>ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:Sunați un medic sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic..</p> <p>A se depozita sub cheie.</p>

## 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

### 4.1 Modul de utilizare

#### Utilizarea 1 - Use # 1 – Șoareci de casă și șobolani – experți – la interior

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Inaplicabil pentru rodenticide
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	Mus musculus-șoarecele de casă-populație tanara și adulți Rattus norvegicus-șobolanul brun-populație tanara și adulți Rattus rattus-șobolanul negru-populație tanara și adulți
<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior La interior - Trained professional - experți
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Momeală gata de utilizare în capcane protejate - Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării Metoda pulsației Formulare momeala - Momeala gata de aplicare pentru a fi utilizată în stații rezistente de momeala; - Stații de momeala acoperite și protejate (atâta timp cât oferă același tip de protecție pentru speciile nevizate și oameni ca stații rezistente de momeala)
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala. Pentru șobolani – 50 g de momeală per punct de momeala. - - - Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala/stație de momeala  Pentru șobolani – 50 g de momeală per punct de momeala/stație de momeala  Metoda“ pulsației”: Înlocuiți momeala consumată după 3 zile, după care la un interval de maximum 7 zile. Mutati momeala neconsumată în zonele active. La fiecare vizită, înlocuiți momeala consumată.  Plasați momeala în zona infestată, în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării. Dacă controlul nu este obținut, supravegheați zona din nou pentru a stabili motivele și luați în considerare mutarea sau creșterea stațiilor de momeala.

**Categoria (categoriile) de utilizatori**

**Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare**

instruiți profesional

Momeala vrac sau ambalata in saci de hartie sau plastic laminat (PE si/sau PP) care contin 50 grame momeala, ambalați în:

Containere de plastic: 3 kg – 10 kg, PP sau HDPE sau PET, inchidere: capac de PP sau de PE;

Pungi resigilabile: 3 kg – 10 kg, hartie laminata, pungi resigilabile flexibile;

Cutii de carton resigilabile: 3 kg – 10 kg, resigilabile din carton LDPE.

#### 4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.
- Momeliile trebuie amplasate pentru a minimaliza expunerea speciilor nevizate și a copiilor.
- [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile specifice prevăzute de codul de bune practici relevant la nivel national.
- Inlocuiți momeala consumată după 3 zile, după care la maximum 7 zile.
- Colectați orice momeala imprăștiată și rozătoarele moarte.

#### 4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și ai împrejurimilor acestora) în legătură cu perioada de tratament pentru combaterea rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul].
- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinfestare.
- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Nu spălați stățiile de momeala sau ustensilele folosite cu apă între aplicări;
- Informațiile despre produs (eticheta sau prospect) trebuie să arate în mod clar că produsul este destinat doar experților care dețin un certificat ce demonstrează conformitatea cu cerințele de utilizare aplicabile (exemplu "Doar pentru experți");
- Nu utilizați produsul în zonele unde este cunoscut fenomenul de rezistență la substanța activă.
- Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului (dacă nu este autorizat pentru tratament permanent).
- Nu alternați utilizarea diferitelor produse anticoagulante cu potențial comparabil sau redus în managementul fenomenului de rezistență. Pentru alternarea tratamentelor, utilizați dacă este disponibil, un rodenticid non-anticoagulant sau un anticoagulant mai puternic.
- Frecvența vizitelor în zonele tratate trebuie stabilită de către utilizator, în urma evaluării eficacității tratamentului. Această frecvență

trebuie alineata cu recomandarile prevazute de codul de bune practici.

#### 4.1.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.1.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Vezi instructiunile generale de utilizare.

#### 4.1.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi instructiunile generale de utilizare.

### 4.2 Modul de utilizare

#### Utilizarea 2 - Use # 2 – Șoareci de casa și șobolani – experți – la exterior și în jurul clădirilor

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Inaplicabil pentru rodenticide
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	Mus musculus-șoarecele de casă-populatie tanara si adulti Rattus norvegicus-șobolanul brun-populatie tanara si adulti Rattus rattus-șobolanul negru-populatie tanara si adulti
<b>Domeniul de utilizare</b>	în aer liber La exterior, în jurul clădirilor - Trained professional - experți
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Momeală gata de utilizare în capcane protejate - Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării  Formulare momeala  Metoda „pulsatiei“  - Momeala gata de aplicare pentru a fi utilizata in statii rezistente de momeala;



	<p>- Statii de momeala acoperite si protejate (atata timp cat ofera acelasi tip de protectie pentru specile nevizate si oameni ca statii rezistente de momeala);</p> <p>- Utilizare directa a momelilor gata de utilizare in vizuina;</p>
<p><b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b></p>	<p>Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala. Pentru șobolani – 50 g de momeală per punct de momeala. - - -  Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala</p> <p>Pentru șobolani – 50 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala</p> <p>Metoda“ pulsatiei”: Inlocuiti momeala consumata dupa 3 zile, dupa care la un interval de maximum 7 zile. Mutati momeala neconsumata in zonele active. La fiecare vizita, inlocuiti momeala consumata.</p> <p>Plasati momeala in zona infestata, in capcane protejate impotriva deschiderii si a deteriorarii. Daca controlul nu este obtinut, supravegheati zona din nou pentru a stabili motivele si luati in considerare mutarea sau cresterea statiilor de momeala.</p>
<p><b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b></p>	<p>instruiți profesional</p>
<p><b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b></p>	<p>Momela vrac sau ambalata in saci de hartie sau plastic laminat (PE si/sau PP) care contin 50 grame momeala, ambalați în:</p> <p>Containere de plastic: 3 kg – 10 kg, PP sau HDPE sau PET, inchidere: capac de PP sau de PE;</p> <p>Pungi resigilabile: 3 kg – 10 kg, hartie laminata, pungi resigilabile flexibile;</p> <p>Cutii de carton resigilabile: 3 kg – 10 kg, resigilabile din carton LDPE.</p>

#### 4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>- Protejați momeala împotriva condițiilor atmosferice. Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.</p> <p>- Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.</p> <p>- Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.</p> <p>- Momelile trebuie amplasate pentru a minimaliza expunerea speciilor nevizate și a copiilor.</p>
--

- [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant la nivel național.
- Înlocuiți momeala consumată după 3 zile, după care la maximum 7 zile. Colectați orice momeala împrăștiată și rozătoarele moarte.
- Acoperiți sau blocați accesul la vizuinele capcane pentru a evita ca momeala să fie respinsă sau împrăștiată.
- Pentru utilizările în exterior, stațiile de momeala trebuie să fie acoperite și plasate în locuri strategice pentru a reduce riscul pentru speciile nevizate.
- Frecvența vizitelor în zonele tratate trebuie stabilită de către utilizator, în urma evaluării eficacității tratamentului. Această frecvență trebuie aliniată cu recomandările prevăzute de codul de bune practici.

#### 4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și ai împrejurimilor acesteia) în legătură cu perioada de tratament pentru combaterea rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul].
- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinfestare.
- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Nu spălați stațiile de momeala sau ustensilele folosite cu apa între aplicări;
- Informațiile despre produs (eticheta sau prospect) trebuie să arate în mod clar ca produsul este destinat doar experților care detin un certificat ce demonstrează conformitatea cu cerințele de utilizare aplicabile (exemplu "Doar pentru experți");
- Nu utilizați produsul în zonele unde este cunoscut fenomenul de rezistență la substanța activă.
- Nu alternați utilizarea diferitelor produse anticoagulante cu potențial comparabil sau redus în managementul fenomenului de rezistență. Pentru alternarea tratamentelor, utilizați, dacă este disponibil, un rodenticid non-anticoagulant sau un anticoagulant mai puternic.

#### 4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vezi instrucțiunile generale de utilizare.

#### 4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi instrucțiunile generale de utilizare.

### 4.3 Modul de utilizare

#### Utilizarea 3 - Use #3 – Șoareci de casă – specialiști – la interior

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Inaplicabil pentru rodenticide
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	Mus musculus-șoarecele de casă-populație tânără și adulți
<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior La interior - Specialiști
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării - Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	15 - 30 g de momeală per punct de momeala - - - 15 - 30 g de momeală per punct de momeala/stație de momeala. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 1 - 2 metri.
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	profesional
<b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>	Momela vrac sau ambalată în saci de hartie sau plastic laminat (PE și/sau PP) care conțin 50 grame momeala, ambalați în:  Containere de plastic: 3 kg – 10 kg, PP sau HDPE sau PET, închidere: capac de PP sau de PE;

Pungi resigilabile: 3 kg – 10 kg, hartie laminata, pungi resigilabile flexibile;

Cutii de carton resigilabile: 3 kg – 10 kg, resigilabile din carton LDPE.

#### 4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Capcanele se inspectează cel puțin o dată la 2-3 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.  
- [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

#### 4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vezi instrucțiunile generale de utilizare.

#### 4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vezi instrucțiunile generale de utilizare.

#### 4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi instrucțiunile generale de utilizare.

### 4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Use #4 – Șobolani – specialiști – la interior

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Inaplicabil pentru rodenticide
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	Rattus norvegicus-șobolanul brun-populație tânără și adulți Rattus rattus-șobolanul negru-populație tânără și adulți
<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior La interior - Specialiști
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Momeală gata de utilizare în capcane protejate - Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	50 g de momeală per punct de momeala - - -  50 g de momeală per punct de momeala/stație de momeala  Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 - 10 metri.  Plasați momeala în zonele infestate în stații de momeală rezistente.
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	profesional
<b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>	Momeala vrac sau ambalată în saci de hartie sau plastic laminat (PE și/sau PP) care conțin 50 grame momeala, ambalată în: Containere de plastic: 3 kg – 10 kg, PP sau HDPE sau PET, închidere: capac de PP sau de PE; Pungi resigilabile: 3 kg – 10 kg, hartie laminată, pungi resigilabile flexibile; Cutii de carton resigilabile: 3 kg – 10 kg, resigilabile din carton LDPE.

#### 4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Capcanele se inspectează după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.
- [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

--

#### 4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vezi instructiunile generale de utilizare.
--

#### 4.4.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

- Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.
---

#### 4.4.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Vezi instructiunile generale de utilizare.
--

#### 4.4.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi instructiunile generale de utilizare.
--

#### 4.5 Modul de utilizare

##### Utilizarea 5 - Use #5 – Șoareci de casă și șobolani – specialiști – la exterior, în jurul clădirilor

<b>Tipul produsului</b>	TP 14 - Rodenticide
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	Inaplicabil pentru rodenticide
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	Mus musculus-șoarecele de casă-populatie tanara si adulti Rattus norvegicus-șobolanul brun-populatie tanara si adulti Rattus rattus-șobolanul negru-populatie tanara si adulti
<b>Domeniul de utilizare</b>	în aer liber la exterior, in jurul cladirilor - Specialiști
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Momeală gata de utilizare în capcane protejate - Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării

### Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala. Pentru șobolani – 50 g de momeală per punct de momeala - - -  
Pentru șoareci – 15 - 30 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 1 - 2 metri.

Pentru șobolani – 50 g de momeală per punct de momeala/statie de momeala. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 - 10 metri.

Plasați momeala în zonele infestate în stații de momeală rezistente.

### Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

### Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Momela vrac sau ambalata în saci de hartie sau plastic laminat (PE și/sau PP) care conțin 50 grame momeala, ambalați în:  
Containere de plastic: 3 kg – 10 kg, PP sau HDPE sau PET, închidere: capac de PP sau de PE;  
Pungi resigilabile: 3 kg – 10 kg, hartie laminata, pungi resigilabile flexibile;  
Cutii de carton resigilabile: 3 kg – 10 kg, resigilabile din carton LDPE.

## 4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de intemperii (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.
- Capcanele se inspectează în cazul șoarecilor – cel puțin o dată la 2-3 zile, iar în cazul șobolanilor – numai după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.
- Înlocuiți momeliile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.
- [Dacă sunt disponibile] Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

## 4.5.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Nu introduceți produsul direct în vizuini.
- Nu spălați stațiile de momeala cu apă între aplicări;

- Informațiile despre produs ( eticheta si/ sau prospect) trebuie sa indice clar urmatoarele:

- Produsul nu trebuie distribuit catre publicul larg (exemplu” pentru specialisti”
- Produsul trebuie utilizat in statii de momeala adecvate (exemplu” a se utiliza doar statiile de momeala rezistente”
- Utilizatorii trebuie sa eticheteze statiile de momeala cu informatiile de la sect. 5.3 din SPC ( exemplu: “etichetati statia de momeala conform recomandarilor produsului”

- Utilizand acest produs trebuie sa combateti rozatoarele in 35 de zile. Informatiile despre produs ( eticheta si/sau prospect ) trebuie sa recomande clar ca in caz de lipsa de eficacitate pana la sfarsitul tratamentului (daca activitatea rozatorului este inca observata), utilizatorul trebuie sa solicite sfatul de la furnizorul produsului sau sa solicite ajutorul unui operator de deratizare specializat.

- Momelile trebuie depozitate in siguranta pentru a se minimaliza riscul consumului de catre animale sau copii. Unde este posibil asigurati momelile pentru a nu fi imprastiate.

#### **4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

- Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### **4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia**

Vezi instrucțiunile generale de utilizare.

#### **4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Vezi instrucțiunile generale de utilizare.

## **5. Direcții generale de utilizare**

### **5.1. Instrucțiuni de utilizare**



- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.
  - Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării.
  - Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (de exemplu, boabe de cereale vărsate sau resturi de mâncare). Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.
  - Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor, care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și, atunci când este posibil, metode fizice de combatere.
  - Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu, găuri de la priză, îndepărtați posibilele alimente și băuturi cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produs și pentru a reduce probabilitatea de reinfestare.
  - Produsul trebuie să fie amplasat în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezența rozătoarelor (de exemplu, căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).
  - Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri.
  - Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind conținutul de rodenticide și interzicerea mutării sau a deschiderii acestora (a se vedea punctul 5.3 privind informațiile care se înscriu pe etichetă).
  - [Dacă legislația locală prevede] Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismente privind riscul de intoxicație primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicație.
- Amplasați produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizate.
- Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele aflate în contact cu acestea.
  - Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului. După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea direct expusă.
  - Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în alte locuri și o eventuală schimbare a formulei momelii.
  - Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situații. Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Luați în considerare și utilizarea de curse, ca măsură de combatere alternativă.
  - Momeală ambalată în plicuri: Nu deschideți plicul cu momeală.
  - Momeala vrac: amplasați momeala în puncte de momeală utilizând un dispozitiv de dozare pentru a reduce praful. Specificați metodele de reducere a prafului (ex. Stergerea umedă)

## 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor în legătură cu perioada de tratament pentru combaterea rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul].
- Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.
- Nu utilizați produsul în zonele unde este cunoscut fenomenul de rezistență la substanța activă.
- Pentru a reduce riscul de intoxicație secundară, cautați și îndepărtați rozătoarele moarte la intervale de timp frecvente în timpul tratamentului în conformitate cu instrucțiunile prevăzute de codul de bune practici.
- Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului.
- Nu alternați utilizarea diferitelor produse anticoagulante cu potențial comparabil sau redus în managementul fenomenului de rezistență. Pentru alternarea tratamentelor, utilizați, dacă este disponibil, un rodenticid non-anticoagulant sau un anticoagulant mai puternic.
- Nu utilizați momeli continuând substanțe active anticoagulante ca stații permanente de momeală pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale [metoda de eliminare va fi descrisă în SPC național și va apărea pe eticheta produsului].
- Momelile trebuie depozitate în siguranță pentru a se minimaliza riscul consumului de către animale sau copii. Unde este posibil asigurați momelile pentru a nu fi împrăștiate.
- Nu spălați capcanele cu apă între aplicări.
- Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale [metoda de eliminare va fi descrisă în SPC național și va apărea pe eticheta produsului].

### 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă.
- Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale. În cazuri severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau în urină.
- Antidot: vitamina K1, administrată numai de personal medical/veterinar.
- În caz de:
  - expunere cutanată, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.
  - expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.
  - expunere orală, clătiți atent gura cu apă. Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie.
- Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „a nu se muta sau deschide”; „conține un produs rodenticid”; „denumirea produsului sau numărul de autorizație”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică [inserați telefonul național de urgență]”.
- Periculos pentru animalele sălbatice.

### 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

- La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.
- Nu utilizați containerele pentru alt scop.

### 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

- A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.
- A se păstra în locuri unde nu au acces copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.
- Perioadă de valabilitate: 3 ani de la data fabricației. A nu se depozita produsul la temperaturi mai mari de 30 C .

## 6. Alte informații

- Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii.
- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați.

- Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.