

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Rodicum Extra

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Číslo autorizácie: SK18-MRS-025

**Referenčné číslo záznamu v
R4BP 3:** SK-0019662-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie	4
4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie	4
4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	4
4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	4
4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	4
4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie	5
4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie	5
4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	5
4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	5
4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	5
5. Všeobecné pokyny pre použitie	6
5.1. Pokyny na používanie	6
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	6
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	6
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	7
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	7

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Rodicum Extra
Rodicum Pasta Plus

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	SBM DEVELOPPEMENT
	Adresa	60 chemin des Mouilles 69130 Ecully Francúzsko
Číslo autorizácie	SK18-MRS-025	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0019662-0000	
Dátum autorizácie	13/11/2018	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	13/02/2023	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	INDUSTRIALCHIMICA Srl
Adresa výrobcu	Via Sorgaglia 40 35020 Arre (PD) Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Via Sorgaglia 40 35020 Arre (PD) Taliansko

Meno/Názov výrobcu	Kollant S.r.l.
Adresa výrobcu	via C. Colombo 7/7 A 30030 Vigonovo (VE) Taliansko
Miesto výrobných priestorov	via C. Colombo 7/7 A 30030 Vigonovo (VE) Taliansko

Meno/Názov výrobcu	IRIS
Adresa výrobcu	1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas 30340 Salindres Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas 30340 Salindres Francúzsko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	18 - Kumatetralyl
Meno/Názov výrobcu	Bayer S.A.S.
Adresa výrobcu	16 rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon (Cedex 09) Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	AlzChem Trostberg GmbH - Chemiepark Trostberg, Dr. Albert Frank Str. 32 83308 Trostberg Nemecko

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Kumatetralyl	Coumatetralyl	Účinná látka	5836-29-3	227-424-0	0.0027

2.2. Typ úpravy

návnada na priame použitie - pasta

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Potkan hnedý

Typ výrobku

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Prípravky na hubenie hlodavcov

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Rattus norvegicus-potkan hnedý-dospelé a mladé jedince

Oblasti použitia

Iné

Vo vnútri a okolo budov

Spôsob(y) aplikácie

v návnadových boxoch -
Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

200 g na deratizačnú staničku - - -
Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5-20 metrov.

Kategória(ie) používateľov

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

10 g návnady v papierovom vrecku vo fľaši (do 750 g, PET), v sáčku (do 750 g, COEX PET/PE) alebo v sáčku (90 g – 750 g, LDPE).
Terciárne balenie (vonkajší obal): COEX PET/PE sáčky v kartónovom obale alebo LDPE vrecká v PP vedre.

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Nie sú.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nie sú.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Nie sú.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nie sú.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Nie sú.

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Hraboše

Typ výrobku

Výrobky typu 14 - Rodenticídy

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Prípravky na hubenie hlodavcov

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Myodes glareolus-Hrdziak lesný-dospelé a mladé jedince

Microtus arvalis-Hraboš poľný-dospelé a mladé jedince

Oblasti použitia

Iné

Okolo budov

Spôsob(y) aplikácie

v návnadových boxoch -

Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

20 g návnady na deratizačnú staničku - -
1 až 3 aplikácie počas 10 dní.
Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov.

Kategória(ie) používateľov

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

10 g návnady v papierovom vrecku vo fľaši (do 750 g, PET), v sáčku (do 750 g, COEX PET/PE) alebo v sáčku (90 g – 750 g, LDPE).
Terciárne balenie (vonkajší obal): COEX PET/PE sáčky v kartónovom obale alebo LDPE vrecká v PP vedre.

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Nie sú.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nie sú.

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Nie sú.

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nie sú.

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Nie sú.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zväziť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce). Zvlášť pri kontrole hrabošov a príležitostne sa objavujúcich potkanov by sa mali zväziť pasce. Používanie biocídnych výrobkov je poslednou voľbou a malo by sa vždy znížiť na minimum.

Je potrebné určiť preferované miesta pobytu hlodavcov (chodníčky, hniezda, miesta živenia sa) v budove a okolo, napr. na základe stôp živenia sa a výkalov alebo vyložením menšieho množstva neotravnej návnady (napr. ovsených vločiek). Pred zahájením deratizácie je nutné odstrániť zvyšky neotravenej návnady.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Neotvárajte vrecúška s návnadou.

Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Pred zahájením deratizácie informujte všetkých užívateľov miestností, budov a ich okolia, kde bola umiestnená návnada, o riziku otravy pre ľudí, domáce a divoké zvieratá ako aj o opatreniach pre prípad otravy, rozsypania návnady alebo nájdení mŕtvych hlodavcov (podľa etikety výrobku).

Deratizácia musí byť ukončená ak návnada prestane byť prijímaná hlodavcami.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu a deratizačné staničky.

Nepoškodené deratizačné staničky je možné opätovne použiť.

Aby sa predišlo opätovnému napadnutiu hlodavcami po úspešnej deratizácii, mali by sa prijať nasledujúce opatrenia:

- Potraviny a vodné zdroje (potraviny, odpadky atď.) by sa mali odstrániť alebo zakryť.
- Je potrebné odstrániť nečistoty a odpad, ktoré by mohli slúžiť hlodavcom ako úkryt. Podľa potreby odstrániť rastliny z priameho okolia budov.
- Podľa možnosti znemožniť prístup hlodavcov do budov a uzavrieť prístupové cesty (škáry, diery, vstupy pre mačky, odvodnenie, a pod.).

Umiestnite deratizačné staničky do miest, kde nehrozia záplavy.

Vymeňte návnadu v deratizačnej stanicičke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“),
- používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“).

Musia sa použiť deratizačné staničky. Návnady musia byť zabezpečené v deratizačných staničkách tak, aby sa zabránilo prenosu návnad hlodavcami, pokiaľ to umožňuje formulácia návnady a deratizačné staničky. Umiestnenie návnad mimo deratizačných staničiek predstavuje vysoké riziko otravy pre ľudí, domáce zvieratá a voľne žijúce zvieratá.

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

Zlikvidujte mŕtve hlodavce v domácom odpade alebo v kafiléri. Zabráňte priamemu kontaktu.

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

Výrobok umiestnite mimo potravín, nápojov a krmív, ako aj náradia alebo povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce ďasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.
Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym alebo veterinárnym personálom.
V prípade:
- Dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom.
- Zasiahnutia očí vždy skontrolujte a vyberte kontaktné šošovky, vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút.
- Orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí. Nevyvolávajte zvracanie.
Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. V prípade potreby kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel. č.: 02/547 741 66. Ak výrobok prehltnú domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom.
Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody volajte Národné toxikologické informačné centrum, tel. č.: 02/547 741 66“.
Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami.
Pri odstraňovaní zvyškov návnady sa vyhýbajte kontaktu s kožou.
Odporúča sa používanie rukavíc.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.
Výrobok uchovávajte mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
Doba použiteľnosti: 24 mesiacov.

6. Ďalšie informácie

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady.
Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.
Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.