

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Grupės pavadinimas: Veterinarinių biocidinių produktų speniams dezinfekuoti grupė (Teat disinfection biocidal product family)

Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: LT/AP-BPV/2019/0275

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: LT-0020851-0000

Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
1.1. Grupės pavadinimas	1
1.2. Produkto tipas (-ai)	1
1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	3
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	3
1. Meta SPC administravimo informacija	3
1.1. meta SPC identifikatorius - Meta PCS 1	3
1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas	3
1.3. Produkto tipas (-ai)	3
2. Meta SPC sudėtis	3
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį	3
2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)	4
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	4
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	4
4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos	6
4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės	6
4.1.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	6
4.1.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	6
4.1.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	6
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	7
5.1. Naudojimo instrukcijos	7

5.2. Rizikos valdymo priemonės	7
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	8
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	8
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	8
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	9
6. Kita informacija	9
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	9
7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis	9
1.Meta SPC administravimo informacija	10
1.1. meta SPC identifikatorius - Meta PCS 2	10
1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas	10
1.3 Produkto tipas (-ai)	10
2. Meta SPC sudėtis	10
2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį	10
2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)	10
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	10
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	11
4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	12
4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	13
4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	13
4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	13
4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	13
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	13
5.1. Naudojimo instrukcijos	13
5.2. Rizikos valdymo priemonės	14
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	14
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	14
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	15
6. Kita informacija	15
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	15

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslis sudėtis	15
1. Meta SPC administravimo informacija	16
1.1. meta SPC identifikatorius - Meta PCS 3	16
1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas	16
1.3 Produkto tipas (-ai)	16
2. Meta SPC sudėtis	16
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį	16
2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)	16
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	17
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	17
4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	18
4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	18
4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	18
4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	18
4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	18
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	19
5.1. Naudojimo instrukcijos	19
5.2. Rizikos valdymo priemonės	19
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	19
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	19
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	20
6. Kita informacija	20
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	20
7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslis sudėtis	20
1. Meta SPC administravimo informacija	21
1.1. meta SPC identifikatorius - Meta PCS 4	21
1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas	21
1.3 Produkto tipas (-ai)	21
2. Meta SPC sudėtis	22
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį	22

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)	22
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	22
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	22
4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	24
4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	25
4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	25
4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	26
4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	26
4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	28
4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	29
4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	30
4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	30
4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	30
4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	32
4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	33
4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	33
4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	34
4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	34
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	34
5.1. Naudojimo instrukcijos	34
5.2. Rizikos valdymo priemonės	34
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	34
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	35
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	35
6. Kita informacija	35
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	35
7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis	35
1. Meta SPC administravimo informacija	36
1.1. meta SPC identifikatorius - Meta PCS 5	36

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas	36
1.3 Produkto tipas (-ai)	37
2. Meta SPC sudėtis	37
2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį	37
2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)	37
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	37
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	37
4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	39
4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	39
4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	40
4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	40
4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	40
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	40
5.1. Naudojimo instrukcijos	40
5.2. Rizikos valdymo priemonės	41
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	41
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	42
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	42
6. Kita informacija	42
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	43
7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksliai sudėtis	43
1.Meta SPC administravimo informacija	44
1.1. meta SPC identifikatorius - Meta PCS 6a	44
1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas	44
1.3 Produkto tipas (-ai)	44
2. Meta SPC sudėtis	45
2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį	45
2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)	45
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	45
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	45

4.1.1	Specifinės naudojimo instrukcijos	47
4.1.2	Specifinės rizikos valdymo priemonės	48
4.1.3	Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	48
4.1.4	Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	48
4.1.5	Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	48
4.2.1	Specifinės naudojimo instrukcijos	50
4.2.2	Specifinės rizikos valdymo priemonės	51
4.2.3	Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	51
4.2.4	Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	51
4.2.5	Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	52
4.3.1	Specifinės naudojimo instrukcijos	53
4.3.2	Specifinės rizikos valdymo priemonės	55
4.3.3	Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	55
4.3.4	Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	55
4.3.5	Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	55
5.	Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	55
5.1.	Naudojimo instrukcijos	55
5.2.	Rizikos valdymo priemonės	55
5.3.	Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	55
5.4.	Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	56
5.5.	Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	56
6.	Kita informacija	57
7.	Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	57
7.1	Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksliai sudėtis	57
1.	Meta SPC administravimo informacija	57
1.1.	meta SPC identifikatorius - Meta PCS 6b	57
1.2.	Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas	57
1.3	Produkto tipas (-ai)	58
2.	Meta SPC sudėtis	58

2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį	58
2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)	58
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	58
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	58
4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	60
4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	61
4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	61
4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	61
4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	61
4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	63
4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	64
4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	64
4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	65
4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	65
4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	66
4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	67
4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	67
4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	67
4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	67
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	67
5.1. Naudojimo instrukcijos	67
5.1. Naudojimo instrukcijos	68
5.2. Rizikos valdymo priemonės	68
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	68
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	69
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	69
6. Kita informacija	69
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	69
7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksliai sudėtis	69

1. Meta SPC administravimo informacija	70
1.1. meta SPC identifikatorius - Meta PCS 7	70
1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas	70
1.3 Produkto tipas (-ai)	70
2. Meta SPC sudėtis	70
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį	70
2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)	71
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	71
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	71
4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	73
4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	73
4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	73
4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	73
4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	74
4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	76
4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	76
4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	77
4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	77
4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	77
4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	78
4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	79
4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką	79
4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	79
4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	79
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	80
5.1. Naudojimo instrukcijos	80
5.2. Rizikos valdymo priemonės	80
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	80
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	81

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	81
6. Kita informacija	81
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	81
7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis	81

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

1. Administracinė informacija

1.1. Grupės pavadinimas

Veterinarinių biocidinių produktų speniams dezinfekuoti grupė (Teat disinfection biocidal product family)

1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Evans Vanodine International PLC
	Adresas	Brierley Road Walton Summit PR5 8AH Preston Jungtinė Karalystė
Autorizacijos liudijimo numeris	LT/AP-BPV/2019/0275	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0020851-0000	
Autorizacijos liudijimo data	21/05/2019	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	21/05/2029	

1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	„Evans Vanodine International“
Gamintojo adresas	Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Jungtinė Karalystė

1.5. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	„ACF Minera S.A.“
Gamintojo adresas	San Martin No. 499 - Iquique Čilė
Gamybos vieta	Lagunas Mine - Pozo Almonte Čilė

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	„Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.“
Gamintojo adresas	Los Militares 4290, Piso 4 - Las Condes, Santiago Čilė
Gamybos vieta	Nueva Victoria Plant, Pedro de Valdivia Plant - Northern Chile (Šiaurės Čilė) Čilė

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	„Cosayach Nitratos S.A.“
Gamintojo adresas	Hnos Amunategui 178 - Santiago Čilė
Gamybos vieta	S.C.M. Cosayach Cala Cala - Pozo Almonte Čilė

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	„ISE Chemical Corporation“
Gamintojo adresas	Kitaimaizumi 3695 - Oamishirasato City Chiba Japonija
Gamybos vieta	Shirasato Plant - - Japonija

2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.112 - 2.346
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	0.38 - 19.993

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

AL - Bet koks kitas skystis

II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 1

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.112 - 0.12

Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (1.1 mol EO vidutinis molinis santykis)	157627-86-6	500-337-8	0.71 - 1.19
---------------------------------	---	-------------	-----------	-------------

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Laikyti talpykloje turinčioje atsparią vidinę dangą.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Prieš melžimą

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš melžimą.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma

Mielės-Mielės-Netaikoma

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -

Naudojimas prieš melžimą

Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis

karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -

Naudojimas prieš melžimą

Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Žr. aukščiau ---
Žr. aukščiau
Žr. aukščiau ---
Žr. aukščiau

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 5–25 l
Statinė (DTPE), 200 l
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

-

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Šią dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros. Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Naudot nepraskiestą.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo produktu. Pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemines medžiagas atsparias pirštines (pirštinių medžiagų produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis :

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.
- Prarijus: neskatinėti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
- Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
- Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

NEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptominių ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti į mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotekų valymo stoties sistemą.

Vengti patekimo į aplinką.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.
Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.
Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	Pre-Dip
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	LT-0020851-0001 1-1

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.112
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	0.953

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 2

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-2

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.25 - 0.33
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (1.1 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	0.38 - 0.63

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Laikyti talpykloje turinčioje atsparią vidinę dangą.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma
Mielės-Mielės-Netaikoma

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas rankiniu būdu -

Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas rankiniu būdu:

Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -

Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

	<p>Mirkymas automatinio būdu -</p> <p>Naudojimas po melžimo</p> <p>Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).</p> <p>Mirkymas automatinio būdu: karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>Purškimas automatinio būdu naudojant robotą - Naudojimas po melžimo</p> <p>Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).</p> <p>Purškimas automatinio būdu naudojant robotą: karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</p>
<p>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</p>	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p>
<p>Vartotojų kategorija (-os)</p>	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

-

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.
Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.
Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).
Naudoti nepraskiestą.
Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas rankiniu būdu

Pripildyti 2/3 mirkymo indo produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad spenys būtų pamerktas per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.
Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.
Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.
Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

3. Mirkymas automatinio būdu

Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami produktu.
Visas procesas yra automatizuotas.

4. Automatinis purškimas naudojant robotą

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, produktas iš roboto „rankos“ automatiškai purškiamas ant spenių. Purkštuvus plaunamas automatiškai.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

· Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.

· Prarijus: neskatinti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

· Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.

· Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti į mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotekų valymo stoties sistemą. Vengti patekimo į aplinką.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.
Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.
Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	PV-Pro
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	LT-0020851-0002 1-2

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.291

Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	157627-86-6	500-337-8	0.5
---------------------------------	--	-------------	-----------	-----

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 3

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-3

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.269 - 0.5245
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	2.304 - 4.4702

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Gali ésdinti metalus.
Pavojingumo frazės	Laikyti tik originalioje talpykloje. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. Laikyti talpykloje turinčioje atsparią vidinę dangą. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Po melžimo – mirkymas rankiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma Mielės-Mielės-Netaikoma
Naudojimo sritis	vidaus Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas rankiniu būdu - Naudojimas po melžimo Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes. Mirkymas rankiniu būdu: karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

-

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.
Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).
Naudoti nepraskiestą.
Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas rankiniu būdu
Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį.
Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.
Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.
 - Prarijus: neskatinti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
 - Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
 - Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.
- NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS**

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptominių ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti į mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotekų valymo stoties sistemą.

Vengti patekimo į aplinką.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.

Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	Masofilm
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	LT-0020851-0003 1-3

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.269

Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	157627-86-6	500-337-8	2.304
---------------------------------	--	-------------	-----------	-------

Prekinis pavadinimas

Visqodip

Autorizacijos liudijimo numeris

LT-0020851-0004 1-3

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.5245
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	4.4702

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 4

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-4

1.3 Produkto tipas (-ai)

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.272 - 0.273
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	2.31 - 2.31

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje talpykloje.
Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.
Laikyti talpykloje turinčioje atsparią vidinę dangą.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Prieš melžimą

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš melžimą.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma Mielės-Mielės-Netaikoma
Naudojimo sritis	vidaus Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu - Naudojimas prieš melžimą Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu: a. Mirkymas karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui b. Apdorojimas putomis karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

	<p>Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą - Naudojimas prieš melžimą</p> <p>Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).</p> <p>Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.</p> <p>2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:</p> <p>karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Naudokite nepraskiestą.

Šią dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros. Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Naudoti nepraskiestą.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti 2/3 mirkymo indo produktu. Pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemiškai atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma

Mielės-Mielės-Netaikoma

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -

Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas /apdorojimas putomis rankiniu būdu:

a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis

- karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui

- avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui

- ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -

Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Mirkymas automatinio būdu -

Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

	<p>Mirkymas automatiiniu būdu: karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>Purškimas automatiiniu būdu naudojant robotą - Naudojimas po melžimo</p> <p>Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).</p> <p>Automatinis purškimas naudojant robotą: karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Naudoti nepraskiestą.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad spenys būtų pamerktas per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

3. Mirkymas automatinio būdu

Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami produktu.

Visas procesas yra automatizuotas.

4. Automatinis purškimas naudojant robotą

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, produktas iš roboto „rankos“ automatiškai purškiamas ant spenių. Purkštuvai plaunami automatiškai.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Jei reikia dezinfekcijos prieš melžiant ir pamelžus, dezinfekcijai prieš melžiant reikėtų naudoti kitą priemonę, kurios sudėtyje nėra jodo.
Rankinis purškimas naudojant elektroninį purkštuvą:
Produkto tvarkymo etapu mūvėkite pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių medžiagą leidimo prekiauti turėtojas turi nurodyti gaminio aprašyme).

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Prieš ir po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš ir po melžimo.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma

Mielės-Mielės-Netaikoma

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -

Naudojimas prieš ir po melžimo

Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (2–6 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

a. Mirkymas

- karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui
- avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui
- ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis

- karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui
- avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui
- ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -

Naudojimas prieš ir po melžimo

Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (2–6 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

	<p>2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui • ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Po melžimo: siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Naudoti nepraskiestą.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas rankiniu būdu

Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo produktu. Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

Iškarto po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

Iš karto po melžimo spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. konkrečias rizikos mažinimo priemones.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.
 - Prarijus: neskatinti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
 - Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
 - Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.
- NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS**

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptominių ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti į mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotekų valymo stoties sistemą.

Vengti patekimo į aplinką

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.
Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.
Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	Allantocare Pre-Post Gold
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	LT-0020851-0005 1-4

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.272
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	2.31

Prekinis pavadinimas

Contact

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0020851-0006 1-4

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.273
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	2.31

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 5

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-5

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.526 - 0.527
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	4.479 - 4.492

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje talpykloje.
Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.
Laikyti talpykloje turinčioje atsparią vidinę dangą.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	VETERINARINES HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma Mielės-Mielės-Netaikoma
Naudojimo sritis	vidaus Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas / apdorojimas putomis - Naudojimas po melžimo Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes. 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu: a. Mirkymas karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui b. Apdorojimas putomis karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą - Naudojimas po melžimo Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes. 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą: karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui Mirkymas automatinio būdu - Naudojimas po melžimo Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną). Mirkymas automatinio būdu: karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

	<p>Purškimas automatinio būdu naudojant robotą - Naudojimas po melžimo</p> <p>Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).</p> <p>Automatinis purškimas naudojant robotą: karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</p>
<p>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</p>	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p>
<p>Vartotojų kategorija (-os)</p>	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

-

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Naudoti nepraskiestą.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad spenys būtų pamerktas per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

3. Mirkymas automatinio būdu

Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami produktu.

Visas procesas yra automatizuotas.

4. Automatinis purškimas naudojant robotą

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, produktas iš roboto „rankos“ automatiškai purškiamas ant spenių. Purkštuvus plaunamas automatiškai

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mėvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.

· Prarijus: neskatinti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

· Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.

· Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

· suteikti simptominių ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti į mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotekų valymo stoties sistemą.

Vengti patekimo į aplinką.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.

Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

.

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslūs sudėtis

Prekinis pavadinimas	Masocare Extra
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	LT-0020851-0007 1-5

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.526
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	4.479

Prekinis pavadinimas	Masocare RTU
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	LT-0020851-0008 1-5

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.526
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	4.479

Prekinis pavadinimas

Masodine RTU

Autorizacijos liudijimo numeris

LT-0020851-0009 1-5

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.527
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	4.492

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 6a

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-6

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0.881 - 1.191
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	7.448 - 10.076

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje talpykloje.
Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.
Laikyti talpykloje turinčioje atsparią vidinę dangą.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Prieš melžimą

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš melžimą.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma

Mielės-Mielės-Netaikoma

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -
Naudojimas prieš melžimą
Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu
Naudojimas prieš melžimą
Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis

karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -

Naudojimas prieš melžimą

Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Žr. aukščiau - - -

Žr. aukščiau

Žr. aukščiau. - - -

Žr. aukščiau.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 5–25 l
Statinė (DTPE), 200 l
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Sumaišyti 1 dalį produkto su 3 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo atskiestu produktu.

Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.
Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:
Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma

Mielės-Mielės-Netaikoma

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu
a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis
karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -
Naudojimas po melžimo
Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Mirkymas automatinio būdu -
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Mirkymas automatinio būdu:
karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas automatinio būdu naudojant robotą -
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Automatinis purškimas naudojant robotą:
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Žr. aukščiau - - -
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau. - - -
Žr. aukščiau.

Žr. aukščiau - - -
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau - - -

	Žr. aukščiau
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Ipilti 1 dalį produkto į 3 dalis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

Paruošti šviežių tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

1. Mirkymas /apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo atskiestu produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

3. Mirkymas automatinio būdu

Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami atskiestu produktu.

Visas procesas yra automatizuotas.

4. Automatinis purškimas naudojant robotą

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, atskiestas produktas iš roboto „rankos“ automatiškai purškiamas ant spenių. Purkštuvus plaunamas automatiškai.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemiškai atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Prieš ir po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš ir po melžimo
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma Mielės-Mielės-Netaikoma
Naudojimo sritis	vidaus Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu - Naudojimas prieš ir po melžimo Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (iki 5 kartų per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes. 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu: a. Mirkymas • karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui • ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui b. Apdorojimas putomis • karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui • ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą - Naudojimas prieš ir po melžimo Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (iki 5 kartų per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

	<p>2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui • ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Po melžimo: siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Sumaišyti 1 dalį produkto su 3 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo atskiestu produktu. Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

Iškarto po melžimo pamerkti spenius į atskiestą produktą, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

Iš karto po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:
Naudojant rankinio purškimo būdu mėvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. konkrečias rizikos mažinimo priemones.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

· Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.

· Prarijus: neskatinti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

· Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.

· Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptominių ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Neišpilti į kanalizaciją.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.
Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.
Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

6. Kita informacija

Atkreipkite dėmesį, kad jei papildoma ši „Meta-PCS“ grupė, naudojimo koncentracijos turi būti ribose, kurioms taikomas aplinkos rizikos vertinimas.

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslai sudėtis

Prekinis pavadinimas

Pro-Tec 1:3

Autorizacijos liudijimo numeris

LT-0020851-0010 1-6

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	1.036
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	8.762

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 6b

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-7

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	1.646 - 2.228
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	14.034 - 16.51

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje talpykloje.
Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.
Laikyti talpykloje turinčioje atsparią vidinę dangą.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Prieš melžimą

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš melžimą
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma Mielės-Mielės-Netaikoma
Naudojimo sritis	vidaus Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu - Naudojimas prieš melžimą Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu Naudojimas prieš melžimą Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu: a. Mirkymas karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui b. Apdorojimas putomis karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą - Naudojimas prieš melžimą Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą: karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 5–25 l
Statinė (DTPE), 200 l
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Paruošti šviežių tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Sumaišyti 1 dalį produkto su 7 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti 2/3 mirkymo indo atskiestu produktu.

Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemines medžiagas atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buvolių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma

Mielės-Mielės-Netaikoma

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu
a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis
karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Rankinis purškimas naudojant elektroninį purkštuvą -
Naudojimas po melžimo
Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Mirkymas automatinio būdu -
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Mirkymas automatinio būdu:
karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas automatinio būdu naudojant robotą -
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Automatinis purškimas naudojant robotą:
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Žr. aukščiau - - -
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau. - - -

	<p>Žr. aukščiau.</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5–25 l</p> <p>Statinė (DTPE), 200 l</p> <p>DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Įpilti 1 dalį produkto į 3 dalis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

1. Mirkymas /apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo atskiestu produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

3. Mirkymas automatinio būdu

Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami atskiestu produktu.

Visas procesas yra automatizuotas.

4. Automatinis purškimas naudojant robotą

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, atskiestas produktas iš roboto „rankos“ automatiškai purškiamas ant spenių. Purkštuvus plaunamas automatiškai.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemiškoms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Prieš ir po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš ir po melžimo.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma Mielės-Mielės-Netaikoma
Naudojimo sritis	vidaus Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu - Naudojimas prieš ir po melžimo Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (2–6 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes. 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu: a. Mirkymas • karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui • ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui b. Apdorojimas putomis • karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui • ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -

	<p>Naudojimas prieš ir po melžimo</p> <p>Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (iki 5 kartų per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.</p> <p>2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui • ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.</p> <p>Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.</p> <p>Po melžimo: siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes). Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.</p> <p>Paruošti šviežią tirpalą kasdien.</p> <p>Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.</p> <p>Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.</p> <p>Prieš melžimą ir po melžimo naudojamų tirpalų atskiedimas skiriasi, todėl reikia naudoti atskirus mirkymo indus. Žr. konkrečias instrukcijas. Prieš melžimą – gerai išmaišyti 1 dalį produkto su 7 dalimis švaraus vandens. Po melžimo – gerai išmaišyti 1 dalį produkto su 3 dalimis švaraus vandens.</p> <p>1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu</p>

Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo atskiestu produktu. Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.
Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.
Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

Iškarto po melžimo pamerkti spenius į atskiestą produktą, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.
Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą
Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.
Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

Iš karto po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:
mūvėti apsaugines chemiškoms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:
Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemiškoms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).
Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. konkrečias rizikos mažinimo priemones.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.
- Prarijus: neskatinėti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
- Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
- Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

NEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

--

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Neišpilti į kanalizaciją.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.
Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.
Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

6. Kita informacija

Atkreipkite dėmesį, kad jei papildoma ši „Meta-PCS“ grupė, naudojimo koncentracijos turi būti ribose, kurioms taikomas aplinkos rizikos vertinimas.

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslūs sudėtis

Prekinis pavadinimas

Masodine 1:3

Autorizacijos liudijimo numeris

LT-0020851-0011 1-7

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	1.937
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	16.51

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 7

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-8

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2 - 2.346
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	18 - 19.993

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai pažeidžia akis.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje talpykloje.
Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.
Laikyti talpykloje turinčioje atsparią vidinę dangą.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS CENTRĄ arba kreipkitės į gydytoją..

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Prieš melžimą

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš melžimą.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma

Mielės-Mielės-Netaikoma

Naudojimo sritis

	<p>vidaus</p> <p>Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu - Naudojimas prieš melžimą Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.</p> <p>Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu Naudojimas prieš melžimą Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.</p> <p>1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu: a. Mirkymas karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>b. Apdorojimas putomis karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą - Naudojimas prieš melžimą Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.</p> <p>2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą: karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Sumaišyti 1 dalį produkto su 9 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo atskiestu produktu.

Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prereikęs papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemiškai atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Po melžimo

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma

Mielės-Mielės-Netaikoma

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu
a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis
karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -
Naudojimas po melžimo
Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Mirkymas automatiškai būdu -
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Mirkymas automatiškai būdu:
karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas automatiškai būdu naudojant robotą -
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Automatinis purškimas naudojant robotą:
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Žr. aukščiau - - -
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau. - - -
Žr. aukščiau.

Žr. aukščiau - - -
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau - - -
Žr. aukščiau

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 5–25 l
Statinė (DTPE), 200 l
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Sumaišyti 1 dalį produkto su 4 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas /apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti ¾ mirkymo indo atskiestu produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prereikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

3. Mirkymas automatinio būdu

Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami atskiestu produktu.

Visas procesas yra automatizuotas.

4. Automatinis purškimas naudojant robotą

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, atskiestas produktas iš roboto „rankos“ automatiškai purškiamas ant spenių. Purkštuvus plaunamas automatiškai.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu, mirkymas automatinio būdu ir purškimas automatinio būdu naudojant robotą:

Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mėvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034). Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Prieš ir po melžimo

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš ir po melžimo.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bakterijos-Bakterijos-Netaikoma Mielės-Mielės-Netaikoma
Naudojimo sritis	vidaus Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu - Naudojimas prieš ir po melžimo Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (iki 5 kartų per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes. 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu: a. Mirkymas • karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui

	<ul style="list-style-type: none"> • ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui <p>b. Apdorojimas putomis</p> <ul style="list-style-type: none"> • karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui • ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui <p>Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą - Naudojimas prieš ir po melžimo</p> <p>Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (iki 5 kartų per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.</p> <p>2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui • ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui
<p>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</p>	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p>
<p>Vartotojų kategorija (-os)</p>	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Po melžimo: siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Prieš melžimą ir po melžimo naudojamų tirpalų atskiedimas skiriasi, todėl reikia naudoti atskirus mirkymo indus. Žr. konkrečias instrukcijas.

Paruošti šviežių tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Prieš melžimą – sumaišyti 1 dalį produkto su 9 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

Po melžimo – sumaišyti 1 dalį produkto su 4 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti $\frac{2}{3}$ mirkymo indo atskiestu produktu. Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

Iškarto po melžimo pamerkti spenius į atskiestą produktą, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

Iš karto po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu, mirkymas automatinio būdu ir purškimas automatinio būdu naudojant robotą:

Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mėvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034). Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. konkrečias rizikos mažinimo priemones.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.
- Prarijus: neskatinti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
- Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
- Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

· suteikti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Neišpilti į kanalizaciją.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.
Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.
Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

6. Kita informacija

Atkreipkite dėmesį, kad jei papildoma ši „Meta-PCS“ grupė, naudojimo koncentracijos turi būti ribose, kurioms taikomas aplinkos rizikos vertinimas.

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Masocare 1:4

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0020851-0012 1-8

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2.346
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	19.993