

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Lanirat rodenticid momeală

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

Numărul curent: RO/2022/0331/MRS/HU-2013-PA-14-00044-0000

Numărul curent R4BP 3: RO-0029390-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	18
5.1. Instrucțiuni de utilizare	18
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	20
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	20
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	20
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	21
6. Alte informații	21

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Lanirat rágcsálóirtó szer
Lanirat whole grain rodenticide

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Metatox Kft.
	Adresa	Kossuth utca 8. 5520 Szeghalom Ungaria
Numărul curent	RO/2022/0331/MRS/HU-2013-PA-14-00044-0000	
Numărul curent R4BP 3	RO-0029390-0000	
Data autorizației	06/05/2022	
Data de expirare a autorizației	31/12/2024	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft
Adresa producătorului	Kossuth u. 8. 5520 Szeghalom Ungaria
Adresa locurilor de producție	Kossuth u. 8. 5520 Szeghalom Ungaria

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	12 - Bromodiolonă
Numele producătorului	PelGar International Ltd.
Adresa producătorului	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Bromodiolonă	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Substanța activă	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol	Poate dăuna fătului. Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată sânge.
Fraze de precauție	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Nu inspirați praful. Purtați mănuși de protecție. ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.

Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

Aruncați conținutul la conform reglementărilor locale.

Aruncați recipientul la conform reglementărilor locale.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Tabelul 1. Utilizarea nr. 1 – Șoareci de casă – specialiști – la interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: adults and juveniles
Domeniul de utilizare	de interior La interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 20-25 g/per stație de momeală Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: Pentru controlul șoarecilor: 20-25 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 3 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g sac individuale în găleată de plastic - 3 kg și 5 kg 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g sac individuale în cutie de carton - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în găleată de plastic - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în cutie de carton - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în pungă de plastic - 20 kg, 25 kg și 50 kg

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

Efectuați un sondaj prealabil al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și a determina cauza probabilă și întinderea infestării.

Eliminați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare).

În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru deranjează doar populația de rozătoare și face mai dificilă acceptarea momealelor.

Produsul trebuie utilizat doar ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control.

Luați în considerare măsurile de control preventiv (găuri de priză, îndepărtați potențialele alimente și băuturi pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produs și pentru a reduce probabilitatea de a fi invadată.

Stațiile de momeală trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor unde a fost observată anterior activitatea rozătoarelor (de exemplu, căile de călătorie, siturile de cuibărire, pâlcurile, găurile, burlele etc.)

Dacă este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la sol sau la alte structuri.

Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate în mod clar pentru a arăta că conțin rozătoare și că nu trebuie să fie mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3 pentru ca informațiile să fie afișate pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în zonele publice, zonele tratate ar trebui marcate în perioada de tratament și o notificare care explică riscul de intoxicații primare sau secundare de către anticoagulant, precum și indicarea primelor măsuri care trebuie luate în caz de otrăvire puse la dispoziție alături de momeli.

Momeala trebuie să fie asigurată astfel încât să nu poată fi târâtă departe de stația de momeală.

Așezați produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă și a altor animale care nu vizează.

Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțele chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (materialul cu mănuși care trebuie specificat de către titularul autorizației în informațiile despre produs)

Purtați protecție respiratorie (ochelari sau mască) în timp ce decantați produsul.

Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți sau nu fumați.

Spălați mâinile și pielea direct expusă după utilizarea produsului.

Dacă absorbția de momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea stațiilor de momeală în alte locuri și posibilitatea de a schimba o altă formulare de momeală.

Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile se continuă să se consume momeli și nu se poate observa declinul activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă.

În cazul în care au fost excluse alte elemente, este posibil să existe rozătoare rezistente, astfel încât să se ia în considerare utilizarea unui rodenticid neanticoagulant, acolo unde este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic.

De asemenea, luați în considerare utilizarea capcanelor ca o măsură alternativă de control.

Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

Așezați momeala în stația de momeală folosind un dispozitiv de dozare. Specificați metodele de minimizare a prafului (de exemplu, ștergerea umedă).

Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2 până la 3 zile (în cazul șoarecilor) sau la fiecare 5 până la 7 zile (în cazul șobolanilor) la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptat, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta corpurile rozătoarelor. Reumpleți momeala atunci când este necesar.

Urmați orice instrucțiuni suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Când utilizați aer liber în jurul clădirilor:

Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă etc.). Plasați stațiile de momeală în zonele care nu pot fi inundate.

Înlocuiți orice momeală într-o stație de momeală în care momeala a fost deteriorată de apă sau contaminată de murdărie.

4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați eventualii participanți (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și împrejurimile lor) despre campania de combatere a rozătoarelor.

Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte la intervale frecvente în timpul tratamentului (de exemplu, cel puțin de două ori pe săptămână).

Produsele nu trebuie utilizate peste 35 de zile fără o evaluare a stării infestării și a eficacității tratamentului.

Nu folosiți momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru prevenirea infestării rozătoarelor sau monitorizarea activităților de rozătoare.

Informațiile despre produs (adică eticheta și / sau prospectul) trebuie să arate clar că:

produsul nu va fi furnizat publicului larg (de exemplu, "numai pentru profesioniști").

produsul trebuie utilizat în stații de momeală adecvate rezistente la manipulare (de exemplu, "utilizarea numai în stațiile de momeală rezistente la modificări").

utilizatorii trebuie să eticheteze corect stațiile de momeală cu informațiile menționate în secțiunea 5.3 din SPC (de exemplu, „stații de momeală pe etichete conform recomandărilor produsului”).

Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile.

Informațiile despre produs (adică etichetă și / sau prospect) recomandă în mod clar ca, în caz de suspiciune de lipsă de eficacitate

până la sfârșitul tratamentului (adică se observă activitatea rozătoarelor), utilizatorul să solicite sfatul furnizorului de produse sau să apeleze la un dăunător serviciu de control.

Nu spălați stațiile de momeală cu apă între aplicații.

Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.

Nu aplicați acest produs direct în grape.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Tabelul 2. Utilizarea nr. 2 – Șobolani – specialiști – la interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: adults and juveniles
Domeniul de utilizare	de interior La interior Metoda: cerere momeală

Metoda (metodele) de aplicare	Descriere detaliata: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 200 g de momeală pe stație de momeală Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: Pentru controlul șobolanilor: 200 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 5 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g sac individuale în găleată de plastic - 3 kg și 5 kg 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g sac individuale în cutie de carton - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în găleată de plastic - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în cutie de carton - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în pungă de plastic - 20 kg, 25 kg și 50 kg

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

Efectuați un sondaj prealabil al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și a determina cauza probabilă și întinderea infestării.

Eliminați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare).

În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru deranjează doar populația de rozătoare și face mai dificilă acceptarea momealelor.

Produsul trebuie utilizat doar ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control.

Luați în considerare măsurile de control preventiv (găuri de priză, îndepărtați potențialele alimente și băuturi pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produs și pentru a reduce probabilitatea de a fi invadată.

Stațiile de momeală trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor unde a fost observată anterior activitatea rozătoarelor (de exemplu, căile de călătorie, siturile de cuibărire, pâlcurile, găurile, burlele etc.)

Dacă este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la sol sau la alte structuri.

Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate în mod clar pentru a arăta că conțin rozătoare și că nu trebuie să fie mutate sau

deschise (vezi secțiunea 5.3 pentru ca informațiile să fie afișate pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în zonele publice, zonele tratate ar trebui marcate în perioada de tratament și o notificare care explică riscul de intoxicații primare sau secundare de către anticoagulant, precum și indicarea primelor măsuri care trebuie luate în caz de otrăvire puse la dispoziție alături de momeli.

Momeala trebuie să fie asigurată astfel încât să nu poată fi târâtă departe de stația de momeală.

Așezați produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă și a altor animale care nu vizează.

Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțele chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (materialul cu mănuși care trebuie specificat de către titularul autorizației în informațiile despre produs)

Purtați protecție respiratorie (ochelari sau mască) în timp ce decantați produsul.

Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți sau nu fumați.

Spălați mâinile și pielea direct expusă după utilizarea produsului.

Dacă absorbția de momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea stațiilor de momeală în alte locuri și posibilitatea de a schimba o altă formulare de momeală.

Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile se continuă să se consume momeli și nu se poate observa declinul activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă.

În cazul în care au fost excluse alte elemente, este posibil să existe rozătoare rezistente, astfel încât să se ia în considerare utilizarea unui rodenticid neanticoagulant, acolo unde este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic.

De asemenea, luați în considerare utilizarea capcanelor ca o măsură alternativă de control.

Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

Așezați momeala în stația de momeală folosind un dispozitiv de dozare. Specificați metodele de minimizare a prafului (de exemplu, ștergerea umedă).

Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2 până la 3 zile (în cazul șoarecilor) sau la fiecare 5 până la 7 zile (în cazul șobolanilor) la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptat, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta corpurile rozătoarelor. Reumpleți momeala atunci când este necesar.

Urmați orice instrucțiuni suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Când utilizați aer liber în jurul clădirilor:

Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă etc.). Plasați stațiile de momeală în zonele care nu pot fi inundate.

Înlocuiți orice momeală într-o stație de momeală în care momeala a fost deteriorată de apă sau contaminată de murdărie.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați eventualii participanți (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și împrejurimile lor) despre campania de combatere a rozătoarelor.
 Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte la intervale frecvente în timpul tratamentului (de exemplu, cel puțin de două ori pe săptămână).
 Produsele nu trebuie utilizate peste 35 de zile fără o evaluare a stării infestării și a eficacității tratamentului.
 Nu folosiți momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru prevenirea infestării rozătoarelor sau monitorizarea activităților de rozătoare.
 Informațiile despre produs (adică eticheta și / sau prospectul) trebuie să arate clar că:
 produsul nu va fi furnizat publicului larg (de exemplu, "numai pentru profesioniști").
 produsul trebuie utilizat în stații de momeală adecvate rezistente la manipulare (de exemplu, "utilizarea numai în stațiile de momeală rezistente la modificări").
 utilizatorii trebuie să eticheteze corect stațiile de momeală cu informațiile menționate în secțiunea 5.3 din SPC (de exemplu, „stații de momeală pe etichete conform recomandărilor produsului”).
 Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile.
 Informațiile despre produs (adică eticheta și / sau prospect) recomandă în mod clar ca, în caz de suspiciune de lipsă de eficacitate până la sfârșitul tratamentului (adică se observă activitatea rozătoarelor), utilizatorul să solicite sfatul furnizorului de produse sau să apeleze la un dăunător serviciu de control.
 Nu spălați stațiile de momeală cu apă între aplicații.
 Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.
 Nu aplicați acest produs direct în grape.

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Tabelul 3. Utilizarea nr. 3 – Șoareci de casă și/sau șobolani – specialiști – la exterior, în jurul clădirilor

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: adults and juveniles denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: Adults and juveniles

Domeniul de utilizare	<p>în aer liber</p> <p>La exterior, în jurul clădirilor</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: cerere momeală</p> <p>Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării</p>
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: Pentru controlul șoarecilor: 20-25 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 3 metri. Pentru controlul șobolanilor: 200 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 5 metri.</p> <p>Diluare (%): -</p> <p>Numărul și calendarul de aplicare:</p> <p>Pentru controlul șoarecilor:</p> <p>20-25 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 3 metri.</p> <p>Pentru controlul șobolanilor:</p> <p>200 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 5 metri.</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>profesional</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g sac individuale în găleată de plastic - 3 kg și 5 kg</p> <p>25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g sac individuale în cutie de carton - 3 kg și 5 kg</p> <p>momeală dezlegată în găleată de plastic - 3 kg și 5 kg</p> <p>momeală dezlegată în cutie de carton - 3 kg și 5 kg</p> <p>momeală dezlegată în pungă de plastic - 20 kg, 25 kg și 50 kg</p>

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

Efectuați un sondaj prealabil al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de

activitate și a determina cauza probabilă și întinderea infestării.

Eliminați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare).

În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru deranjează doar populația de rozătoare și face mai dificilă acceptarea momealelor.

Produsul trebuie utilizat doar ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control.

Luați în considerare măsurile de control preventiv (găuri de priză, îndepărtați potențialele alimente și băuturi pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și pentru a reduce probabilitatea de revașare.

Stațiile de momeală trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor unde a fost observată anterior activitatea rozătoarelor (de exemplu, căile de călătorie, siturile de cuibărire, pâlcurile, găurile, burlele etc.)

Dacă este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la sol sau la alte structuri.

Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate clar pentru a arăta că conțin rozătoare și că nu trebuie să fie mutate sau deschise (a se vedea secțiunea 5.3 pentru ca informațiile să fie afișate pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în zonele publice, zonele tratate ar trebui marcate în perioada de tratament și o notificare care explică riscul de intoxicații primare sau secundare de către anticoagulant, precum și indicarea primelor măsuri care trebuie luate în caz de otrăvire puse la dispoziție alături de momeli.

Momeala trebuie să fie asigurată astfel încât să nu poată fi târâtă departe de stația de momeală.

Așezați produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă și a altor animale care nu vizează.

Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțele chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (materialul cu mănuși care trebuie specificat de către titularul autorizației în informațiile despre produs)

Purtați protecție respiratorie (ochelari sau mască) în timp ce decantați produsul.

Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nu fumați.

Spălați mâinile și pielea direct expusă după utilizarea produsului.

Dacă absorbția de momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea stațiilor de momeală în alte locuri și posibilitatea de a schimba o altă formulare de momeală.

Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile se continuă să se consume momeli și nu se poate observa declinul activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă.

În cazul în care au fost excluse alte elemente, este posibil să existe rozătoare rezistente, astfel încât să se ia în considerare utilizarea unui rodenticid neanticoagulant, acolo unde este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic.

De asemenea, luați în considerare utilizarea capcanelor ca o măsură alternativă de control.

Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

Așezați momeala în stația de momeală folosind un dispozitiv de dozare. Specificați metodele de minimizare a prafului (de exemplu, ștergerea umedă).

Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la 2 - 3 zile (în cazul șoarecilor) sau la fiecare 5 până la 7 zile (în cazul șobolanilor) la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptat, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta corpurile rozătoarelor. Reumpleți momeala atunci când este necesar.

Urmați orice instrucțiuni suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Când utilizați aer liber în jurul clădirilor:

Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă etc.). Plasați stațiile de momeală în zonele care nu pot fi inundate.

Înlocuiți orice momeală într-o stație de momeală în care momeala a fost deteriorată de apă sau contaminată de murdărie.

4.3.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați eventualii participanți (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și împrejurimile lor) despre campania de combatere a rozătoarelor.

Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte la intervale frecvente în timpul tratamentului (de exemplu, cel puțin de două ori pe săptămână).

Produsele nu trebuie utilizate peste 35 de zile fără o evaluare a stării infestării și a eficacității tratamentului.

Nu folosiți momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru prevenirea infestării rozătoarelor sau monitorizarea activităților de rozătoare.

Informațiile despre produs (adică eticheta și / sau prospectul) trebuie să arate clar că:

produsul nu va fi furnizat publicului larg (de exemplu, "numai pentru profesioniști").

produsul trebuie utilizat în stații de momeală adecvate rezistente la manipulare (de exemplu, "utilizarea numai în stațiile de momeală rezistente la modificări").

utilizatorii trebuie să eticheteze corect stațiile de momeală cu informațiile menționate în secțiunea 5.3 din SPC (de exemplu, „stații de momeală pe etichete conform recomandărilor produsului”).

Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile.

Informațiile despre produs (adică etichetă și / sau prospect) recomandă în mod clar ca, în caz de suspiciune de lipsă de eficacitate până la sfârșitul tratamentului (adică se observă activitatea rozătoarelor), utilizatorul să solicite sfatul furnizorului de produse sau să apeleze la un dăunător serviciu de control.

Nu spălați stațiile de momeală cu apă între aplicații.

Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.

Nu aplicați acest produs direct în grape.

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Tabelul 1. Utilizarea nr. 1 – Șoareci de casă și/sau șobolani – experți – la interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Inaplicabil pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: adults and juveniles denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: adults and juveniles
Domeniul de utilizare	de interior La interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Formule de momeală: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru controlul șoarecilor: 20-25 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 3 metri. Pentru controlul șobolanilor: 200 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: Pentru controlul șoarecilor: 20-25 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 3 metri. Pentru controlul șobolanilor: 200 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 5 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g sac individuale în găleată de plastic - 3 kg și 5 kg 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g sac individuale în cutie de carton - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în găleată de plastic - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în cutie de carton - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în pungă de plastic - 20 kg, 25 kg și 50 kg

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

Efectuați un sondaj prealabil al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și a determina cauza probabilă și întinderea infestării.

Eliminați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare).

În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru deranjează doar populația de rozătoare și face mai dificilă acceptarea momealelor.

Produsul trebuie utilizat doar ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control.

Luați în considerare măsurile de control preventiv (găuri de priză, îndepărtați potențialele alimente și băuturi pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și pentru a reduce probabilitatea de revașare.

Stațiile de momeală trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor unde a fost observată anterior activitatea rozătoarelor (de exemplu, căile de călătorie, siturile de cuibărire, pâlcurile, găurile, burlele etc.)

Dacă este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la sol sau la alte structuri.

Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate clar pentru a arăta că conțin rozătoare și că nu trebuie să fie mutate sau deschise (a se vedea secțiunea 5.3 pentru ca informațiile să fie afișate pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în zonele publice, zonele tratate ar trebui marcate în perioada de tratament și o notificare care explică riscul de intoxicații primare sau secundare de către anticoagulant, precum și indicarea primelor măsuri care trebuie luate în caz de otrăvire puse la dispoziție alături de momeli.

Momeala trebuie să fie asigurată astfel încât să nu poată fi târâtă departe de stația de momeală.

Așezați produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă și a altor animale care nu vizează.

Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțele chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (materialul cu mănuși care trebuie specificat de către titularul autorizației în informațiile despre produs)

Purtați protecție respiratorie (ochelari sau mască) în timp ce decantați produsul.

Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nu fumați.

Spălați mâinile și pielea direct expusă după utilizarea produsului.

Dacă absorbția de momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea stațiilor de momeală în alte locuri și posibilitatea de a schimba o altă formulare de momeală.

Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile se continuă să se consume momeli și nu se poate observa declinul activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă.

În cazul în care au fost excluse alte elemente, este posibil să existe rozătoare rezistente, astfel încât să se ia în considerare utilizarea unui rodenticid neanticoagulant, acolo unde este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic.

De asemenea, luați în considerare utilizarea capcanelor ca o măsură alternativă de control.

Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

Așezați momeala în stația de momeală folosind un dispozitiv de dozare. Specificați metodele de minimizare a prafului (de exemplu, ștergerea umedă).

Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la 2 - 3 zile (în cazul șoarecilor) sau la fiecare 5 până la 7 zile (în cazul șobolanilor) la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta corpurile rozătoarelor. Reumpleți momeala atunci când este necesar.

Urmați orice instrucțiuni suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Când utilizați aer liber în jurul clădirilor:

Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă etc.). Plasați stațiile de momeală în zonele care nu pot fi inundate.

Înlocuiți orice momeală într-o stație de momeală în care momeala a fost deteriorată de apă sau contaminată de murdărie.

4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați eventualii participanți (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și împrejurimile lor) despre campania de combatere a rozătoarelor.

Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte la intervale frecvente în timpul tratamentului (de exemplu, cel puțin de două ori pe săptămână).

Produsele nu trebuie utilizate peste 35 de zile fără o evaluare a stării infestării și a eficacității tratamentului.

Nu folosiți momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru prevenirea infestării rozătoarelor sau monitorizarea activităților de rozătoare.
 Informațiile despre produs (adică eticheta și / sau prospectul) trebuie să arate clar că:
 produsul nu va fi furnizat publicului larg (de exemplu, "numai pentru profesioniști").
 produsul trebuie utilizat în stații de momeală adecvate rezistente la manipulare (de exemplu, "utilizarea numai în stațiile de momeală rezistente la modificări").
 utilizatorii trebuie să eticheteze corect stațiile de momeală cu informațiile menționate în secțiunea 5.3 din SPC (de exemplu, „stații de momeală pe etichete conform recomandărilor produsului”).
 Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile.
 Informațiile despre produs (adică etichetă și / sau prospect) recomandă în mod clar ca, în caz de suspiciune de lipsă de eficacitate până la sfârșitul tratamentului (adică se observă activitatea rozătoarelor), utilizatorul să solicite statul furnizorului de produse sau să apeleze la un dăunător serviciu de control.
 Nu spălați stațiile de momeală cu apă între aplicații.
 Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.
 Nu aplicați acest produs direct în grape.

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când așezați stații de momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că evitați contactul cu momeală cu apă.
 Când utilizați exterior în jurul clădirilor:
 Atunci când așezați puncte de momeală aproape de apele de suprafață (de exemplu râuri, bălți, canale de apă, diguri, șanțuri de irigare) sau sisteme de scurgere a apei, asigurați-vă că se evita contactul cu momeală cu apă.

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

4.5 Modul de utilizare

Utilizarea 5 - Tabelul 2. Utilizarea nr. 2 – Șoareci și/sau șobolani – experți – la exterior și în jurul clădirilor

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Inaplicabil pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Rattus norvegicus
 denumirea comună: Brown rat
 etapă de dezvoltare: adults and juveniles

denumirea științifică: Mus musculus
 denumirea comună: House mouse
 etapă de dezvoltare: Adults and juveniles

Domeniul de utilizare

Metoda (metodele) de aplicare	<p>în aer liber</p> <p>La exterior, în jurul clădirilor</p> <p>Metoda: cerere momeală Descriere detaliata: Formule de momeală: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării</p>
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: Pentru controlul șoarecilor: 20-25 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 3 metri. Pentru controlul șobolanilor: 200 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 5 metri.</p> <p>Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare:</p> <p>Pentru controlul șoarecilor:</p> <p>20-25 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 3 metri.</p> <p>Pentru controlul șobolanilor:</p> <p>200 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 5 metri.</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>instruiți profesional</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g sac individuale în găleată de plastic - 3 kg și 5 kg 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g sac individuale în cutie de carton - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în găleată de plastic - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în cutie de carton - 3 kg și 5 kg momeală dezlegată în pungă de plastic - 20 kg, 25 kg și 50 kg</p>

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

Efectuați un sondaj prealabil al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și a determina cauza probabilă și întinderea infestării.

Eliminați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare).

În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru deranjează doar populația de rozătoare și face mai dificilă acceptarea momealelor.

Produsul trebuie utilizat doar ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control.

Luați în considerare măsurile de control preventiv (găuri de priză, îndepărtați potențialele alimente și băuturi pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și pentru a reduce probabilitatea de revașare.

Stațiile de momeală trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor unde a fost observată anterior activitatea rozătoarelor (de exemplu, căile de călătorie, siturile de cuibărire, pâlcurile, găurile, burlele etc.)

Dacă este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la sol sau la alte structuri.

Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate clar pentru a arăta că conțin rozătoare și că nu trebuie să fie mutate sau deschise (a se vedea secțiunea 5.3 pentru ca informațiile să fie afișate pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în zonele publice, zonele tratate ar trebui marcate în perioada de tratament și o notificare care explică riscul de intoxicații primare sau secundare de către anticoagulant, precum și indicarea primelor măsuri care trebuie luate în caz de otrăvire puse la dispoziție alături de momeli.

Momeala trebuie să fie asigurată astfel încât să nu poată fi târâtă departe de stația de momeală.

Așezați produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă și a altor animale care nu vizează.

Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțele chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (materialul cu mănuși care trebuie specificat de către titularul autorizației în informațiile despre produs)

Purtați protecție respiratorie (ochelari sau mască) în timp ce decantați produsul.

Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nu fumați.

Spălați mâinile și pielea direct expusă după utilizarea produsului.

Dacă absorbția de momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea stațiilor de momeală în alte locuri și posibilitatea de a schimba o altă formulare de momeală.

Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile se continuă să se consume momeli și nu se poate observa declinul activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă.

În cazul în care au fost excluse alte elemente, este posibil să existe rozătoare rezistente, astfel încât să se ia în considerare utilizarea unui rodenticid neanticoagulant, acolo unde este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic.

De asemenea, luați în considerare utilizarea capcanelor ca o măsură alternativă de control.

Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

Așezați momeala în stația de momeală folosind un dispozitiv de dozare. Specificați metodele de minimizare a prafului (de exemplu, ștergerea umedă).

Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la 2 - 3 zile (în cazul șoarecilor) sau la fiecare 5 până la 7 zile (în cazul șobolanilor) la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptat, stațiile de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta corpurile rozătoarelor. Reumpleți momeala atunci când este necesar.

Urmați orice instrucțiuni suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Când utilizați aer liber în jurul clădirilor:

Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă etc.). Plasați stațiile de momeală în zonele care nu pot fi inundate.

Înlocuiți orice momeală într-o stație de momeală în care momeala a fost deteriorată de apă sau contaminată de murdărie.

4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați eventualii participanți (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și împrejurimile lor) despre campania de combatere a rozătoarelor.

Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte la intervale frecvente în timpul tratamentului (de exemplu, cel puțin de două ori pe săptămână).

Produsele nu trebuie utilizate peste 35 de zile fără o evaluare a stării infestării și a eficacității tratamentului.

Nu folosiți momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru prevenirea infestării rozătoarelor sau monitorizarea activităților de rozătoare.

Informațiile despre produs (adică eticheta și / sau prospectul) trebuie să arate clar că: produsul nu va fi furnizat publicului larg (de exemplu, "numai pentru profesioniști").

produsul trebuie utilizat în stații de momeală adecvate rezistente la manipulare (de exemplu, "utilizarea numai în stațiile de momeală rezistente la modificări").

utilizatorii trebuie să eticheteze corect stațiile de momeală cu informațiile menționate în secțiunea 5.3 din SPC (de exemplu, „stații de momeală pe etichete conform recomandărilor produsului”).

Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile.

Informațiile despre produs (adică etichetă și / sau prospect) recomandă în mod clar ca, în caz de suspiciune de lipsă de eficacitate până la sfârșitul tratamentului (adică se observă activitatea rozătoarelor), utilizatorul să solicite sfatul furnizorului de produse sau să apeleze la un dăunător serviciu de control.

Nu spălați stațiile de momeală cu apă între aplicații.

Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.

Nu aplicați acest produs direct în grape.

4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când așezați stații de momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că evitați contactul cu momeală cu apa.

Când utilizați exterior în jurul clădirilor:

Atunci când așezați puncte de momeală aproape de apele de suprafață (de exemplu râuri, bălți, canale de apă, diguri, șanțuri de irigare) sau sisteme de scurgere a apei, asigurați-vă că se evita contactul cu momeală cu apa.

4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Citiți și urmați informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

- Efectuați un sondaj prealabil al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și a determina cauza probabilă și întinderea infestării.

- Eliminați produsele alimentare ușor accesibile rozătoarelor (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru deranjează doar populația de rozătoare și face mai dificilă acceptarea momealelor.

- Produsul trebuie utilizat doar ca parte a unui sistem integrat de combatere a dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control.

- Luați în considerare măsurile de control preventiv (de exemplu, găuri de priză, îndepărtați potențialele alimente și băuturi, pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și pentru a reduce probabilitatea de a fi invazionate. (de exemplu, căi de călătorie, situri de cuibărire, pâlcuri de alimentare, găuri, săduri etc.).

- Produsul trebuie plasat în imediata apropiere a locurilor în care activitatea rozătoarelor a fost explorată anterior (de exemplu, căi de călătorie, situri de cuibărire, pâlcuri, găuri, burlane etc.).

- Dacă este posibil, stațiile de momeală trebuie să fie fixate la sol sau la alte structuri.

- Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate clar pentru a arăta că conțin rozătoare și că nu trebuie să fie mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3 pentru ca informațiile să fie afișate pe etichetă).

- Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie marcate în perioada de tratament și o notificare care explică riscul de intoxicații primare sau secundare de către anticoagulant, precum și indicarea primelor măsuri care trebuie luate în caz de intoxicație trebuie să fie puse la dispoziție alături de momeli.

- Momeala trebuie să fie asigurată astfel încât să nu poată fi târâtă de stația de momeală.

- Așezați produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă și a altor animale care nu vizează.

- Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

- Purtați mănuși de protecție chimice rezistente în faza de manipulare a produsului.

- Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nu fumați. Spălați mâinile și pielea direct expusă după utilizarea produsului.

- Frecvența vizitelor în zona tratată ar trebui să fie la latitudinea operatorului, în lumina sondajului efectuat la începutul tratamentului. Această frecvență ar trebui să fie în concordanță cu recomandările furnizate de codul de bune practici relevant.

- Dacă absorbția momealelor este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea punctelor de momeală în alte locuri și posibilitatea de a schimba o altă formulare de momeală.

- Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile se continuă să se consume momeli și nu se poate observa declinul activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă. În cazul în care au fost excluse alte elemente, este posibil să existe rozătoare rezistente, astfel încât să se ia în considerare utilizarea unui rodenticid neanticoagulant, acolo unde este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea, luați în considerare utilizarea capcanelor ca o măsură alternativă de control.

- Scoateți momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

Nu deschideți pliculețele care conțin momeala.

Așezați momeala în stația de momeală folosind un dispozitiv de dozare.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați eventualii participanți despre campania de combatere a rozătoarelor
- Informațiile despre produs (adică etichetă și / sau prospect) trebuie să arate clar că produsul va fi furnizat numai utilizatorilor profesioniști instruiți care dețin certificarea care demonstrează respectarea cerințelor de formare aplicabile (de exemplu, "numai pentru profesioniști instruiți").
- Nu folosiți în zonele în care poate fi suspectată rezistența la substanța activă.
- Produsele nu trebuie utilizate peste 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului, cu excepția cazului în care sunt autorizate pentru tratamente permanente de momeli.
- Nu rotiți utilizarea de anticoagulante diferite cu o putere comparabilă sau mai slabă în scopuri de gestionare a rezistenței Pentru utilizare de rotație, luați în considerare utilizarea unui rozăcid ne-anticoagulant, dacă este disponibil, sau un anticoagulant mai puternic.
- Nu spălați stațiile de momeală sau ustensilele utilizate în punctele de momeală acoperite și protejate cu apă între aplicații.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Dacă sunt ingerate, simptomele, care pot fi amânate, pot include gingii nasale și sângerare. În cazuri grave, pot fi vânătăi și sânge prezent în materiile fecale sau în urină.

Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical / veterinar.

În caz de:

- Expunere dermică, spălați pielea cu apă și apoi cu apă și săpun.
- Expunerea ochilor, verificați și îndepărtați întotdeauna lentilele de contact, clătiți ochii cu lichid sau pentru apă, clătiți ochii, mențineți capacele ochilor deschise cel puțin 10 minute
- Expunere orală, clătiți gura cu grijă cu apă. Nu da niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Nu provocați vărsături. Dacă înghițiți, consultați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta produsului. Contactați un medic veterinar în caz de ingestie de către un animal de companie

Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „nu vă deplasați sau deschideți”; „conține un rodenticid”; „numele produsului sau numărul autorizației”; „substanță (substanțe) active” și „în caz de incident, apelați un centru pentru otrăvă

Periculos pentru viața sălbatică.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La sfârșitul tratamentului, aruncați momeala neurtată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitați într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis și departe de lumina directă a soarelui.
Depozitați în locuri împiedicate de accesul copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de la fermă.
Perioada de valabilitate: 24 de luni

6. Alte informații

Din cauza modului de acțiune întârziat, roenticidele anticoagulante durează de la 4 la 10 zile pentru a fi eficiente după consumul momecii.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile goale, nu folosiți mănuși sau nu folosiți instrumente cum ar fi colțurile atunci când le aruncați.

Acest produs conține un agent de amărăciune și un colorant.