

Resumen de las características del producto biocida

Nombre del producto: LuxSpray 15

Tipo(s) de producto: TP03 - Higiene veterinaria

Número de la autorización: EU-0020125-0000

R4BP 3 Número de referencia de activo: EU-0020125-0009

Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	2
2. Composición y formulación del producto	2
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	2
2.2. Tipo de formulación	3
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	3
4. Uso(s) autorizado(s)	3
5. Instrucciones generales de uso	22
5.1. Instrucciones de uso	22
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	22
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	22
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	22
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	23
6. Información adicional	23

Información administrativa

1.1. Nombre comercial del producto

LuxSpray 15 - Priodine RTU / Kristal Iocare Pre / Super Pre

1.2. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la autorización	Razón social	GEA Farm Technologies GmbH
	Dirección	Siemensstraße 25-27 59199 Bönen Alemania
Número de la autorización	EU-0020125-0000 1-3	

R4BP 3 Número de referencia de activo

EU-0020125-0009

Fecha de la autorización

19/11/2019

Fecha de vencimiento de la autorización

31/10/2029

1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

Nombre del fabricante	GEA Farm Technologies
Dirección del fabricante	Wylve Works BA12 9HT Warminster Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	Wylve Works, Watery Lane BA12 9HT Warminster Reino Unido
	Gewerbestraße 5 5325 Plainfeld Austria
	ul. Olowiana 10 85-461 Bydgoszcz Polonia

1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	1319 - Yodo
Nombre del fabricante	SQM Europe N.V.
Dirección del fabricante	St Pietersvliet 7, bus 8 2000 Antwerp Bélgica
Ubicación de las plantas de fabricación	Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes 4290 Piso 4 Santiago Chile
Sustancia activa	1319 - Yodo
Nombre del fabricante	Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)
Dirección del fabricante	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Japón
Ubicación de las plantas de fabricación	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Japón
Sustancia activa	1319 - Yodo
Nombre del fabricante	Norkem Ltd
Dirección del fabricante	Norkem House, Bexton Lane, WA16 9FB Knutsford Reino Unido
Ubicación de las plantas de fabricación	OFICINA CALA CALA S/N Unknown POZO ALMONTE Chile

2. Composición y formulación del producto

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Yodo		Sustancia activa	7553-56-2	231-442-4	0,16
C9-11 Alcohol Etoxilado	C 9-11 alcohol etoxilado con 6moles de grupos etoxilo. Varios nombres comerciales disponibles incluyendo Imbentin.	Principio no activo	68439-46-3	614-482-0	0,166

2.2. Tipo de formulación

AL - Cualquier otro líquido

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro

Puede ser corrosivo para los metales.

Consejos de prudencia

Evitar su liberación al medio ambiente.

Eliminar el contenido en y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1 Descripción de uso

Uso 1 - Uso 3.1 – Productos listos para su uso - Líquido listo para su uso por profesionales para aplicación antes del ordeño -Inmersión

Tipo de producto

TP03 - Higiene veterinaria

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

-

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Bacteria

Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Nombre científico: Levadura

Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Ámbito de utilización

Interior

Método(s) de aplicación

Método: Sistema abierto : tratamiento por inmersión

Descripción detallada:

Aplicación a través de copa de inmersión: utilizando una copa de inmersión tradicional con válvulas de retención, dispense el producto diluido en el depósito. Atornille la parte del aplicador. Apretar el depósito para llenar el aplicador. Cubra los dos tercios inferiores de cada ubre con el producto. Deseche el producto no utilizado después de cada ordeño.

La misma solución se puede aplicar a varios animales durante la misma sesión de ordeño

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: Cantidad de producto listo para su uso a aplicar por aplicación; - vacas y búfalas: de 3 a 10 ml (se recomiendan 5 ml) - ovejas de 1,5 a 5 ml (se recomiendan 1,5 ml) - cabras de 2,5 a 6 ml (se recomiendan 2,5 ml)
Dilución (%): Formulación lista para usar. La concentración de uso del producto es de 0,16 (p/p) de yodo.
Número y frecuencia de aplicación:
2 aplicaciones antes del ordeño por animal, y por día

Categoría(s) de usuarios

Profesional especializado

Profesional

Tamaños de los envases y material del envasado

Tambor, Plástico: HDPE, 10 l

Tambor, Plástico: HDPE, 20 l

Tambor, Plástico: HDPE, 25 l

Tambor de Plástico: HDPE, 200 l

IBC (recipiente para granel intermediario), plástico: HDPE, 1000 l

Tambor de Plástico: HDPE, 5 l

Todos los tambores, excepto 200 l (200 kg) y 1000 l (1000 kg) pueden ser de color plateado o natural (blanco translúcido). Los tambores de 200 l (200 kg) son de color plateado o azul. Las IBC son de color natural.

Todos los tambores están tapados con tapas o tapones a prueba de manipulaciones y están certificados por la norma UN.

4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Véase Instrucciones generales de uso

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

En caso de que sea necesaria una combinación de desinfección previa y posterior al ordeño, se debe considerar el uso de otro producto que no contenga yodo para la desinfección posterior al ordeño.

4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véase Instrucciones generales de uso

4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase Instrucciones generales de uso

4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase Instrucciones generales de uso

4.2 Descripción de uso

Uso 2 - Uso 3.2 –Productos listos para su uso- Líquido listo para su uso por profesionales para aplicación antes del ordeño - pulverización

Tipo de producto

TP03 - Higiene veterinaria

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

-

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Bacteria
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Nombre científico: Levadura
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Ámbito de utilización

Interior

Método(s) de aplicación

Método: Sistema abierto: tratamiento por pulverización

Descripción detallada:

Aplicación a través de pulverizador neumático: La lanza del sistema de pulverización se coloca en el recipiente del producto diluido. El producto diluido se bombea a una lanza de pulverización situada en la sala de ordeño. La lanza de pulverización se utiliza para cubrir los dos tercios inferiores de las ubres con el producto diluido

Aplicación a través de pulverizador manual: Llene el frasco del pulverizador con el producto diluido. Utilice el pulverizador para cubrir los dos tercios inferiores de cada ubre con el producto diluido

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: Cantidad de producto listo para su uso a aplicar por aplicación; - vacas y búfalas: de 3 a 10 ml (se recomiendan 5 ml) - ovejas de 1,5 a 5 ml (se recomiendan 1,5 ml) - cabras de 2,5 a 6 ml (se recomiendan 2,5 ml)
Dilución (%): Formulación lista para usar. La concentración de uso del producto es de 0,16 (p/p) de yodo.
Número y frecuencia de aplicación:
2 aplicaciones antes del ordeño por animal, y por día

Categoría(s) de usuarios

Profesional especializado

Profesional

Tamaños de los envases y material del envasado

Tambor, Plástico: HDPE, 10 l

Tambor, Plástico: HDPE, 20 l

Tambor, Plástico: HDPE, 25 l

Tambor de Plástico: HDPE, 200 l

IBC (recipiente para granel intermediario), plástico: HDPE, 1000 l

Tambor de Plástico: HDPE, 5 l

Todos los tambores, excepto 200 l (200 kg) y 1000 l (1000 kg) pueden ser de color plateado o natural (blanco translúcido). Los tambores de 200 l (200 kg) son de color plateado o azul. Las IBC son de color natural.
Todos los tambores están tapados con tapas o tapones a prueba de manipulaciones y están certificados por la norma UN.

4.2.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Véase Instrucciones generales de uso

4.2.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Use guantes protectores resistentes a los productos químicos cuando aplique el producto mediante pulverización manual (el material de los guantes será especificado por el titular de la autorización en la información del producto)

En caso de que sea necesaria una combinación de desinfección previa y posterior al ordeño, se debe considerar el uso de otro producto que no contenga yodo para la desinfección posterior al ordeño.

4.2.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véase Instrucciones generales de uso

4.2.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase Instrucciones generales de uso

4.2.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase Instrucciones generales de uso

4.3 Descripción de uso

Uso 3 - Uso 3.3 –Productos listos para su uso- Líquido listo para su uso por profesionales para aplicación antes del ordeño– espuma

Tipo de producto

TP03 - Higiene veterinaria

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

-

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Bacteria
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Nombre científico: Levadura
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Ámbito de utilización

Interior

Método(s) de aplicación

Método: Sistema abierto : tratamiento por inmersión
Descripción detallada:

Aplicación a través de una copa de inmersión de espuma: Cuando la copa de inmersión se aprieta, el líquido es forzado a través de una malla fina, se mezcla con aire y forma espuma. Esto se aplica luego a los dos tercios inferiores de la ubre de la vaca.
La misma solución se puede aplicar a varios animales durante la misma sesión de ordeño.

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: Cantidad de producto listo para su uso a aplicar por aplicación; - vacas y búfalas: de 3 a 10 ml (se recomiendan 5 ml) - ovejas de 1,5 a 5 ml (se recomiendan 1,5 ml) - cabras de 2,5 a 6 ml (se recomiendan 2,5 ml)
Dilución (%): Formulación lista para usar. La concentración de uso del producto es de 0,16 % (p/p) de yodo.
Número y frecuencia de aplicación:
2 aplicaciones antes del ordeño por animal, y por día

Categoría(s) de usuarios

Profesional especializado

Profesional

Tamaños de los envases y material del envasado

Tambor, Plástico: HDPE, 10 l

Tambor, Plástico: HDPE, 20 l

Tambor, Plástico: HDPE, 25 l

Tambor de Plástico: HDPE, 200 l

IBC (recipiente para granel intermediario), plástico: HDPE, 1000 l

Tambor de Plástico: HDPE, 5 l

Todos los tambores, excepto 200 l (200 kg) y 1000 l (1000 kg) pueden ser de color plateado o natural (blanco translúcido). Los tambores de 200 l (200 kg) son de color plateado o azul. Las IBC son de color natural.

Todos los tambores están tapados con tapas o tapones a prueba de manipulaciones y están certificados por la norma UN.

4.3.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Véase Instrucciones generales de uso

4.3.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

En caso de que sea necesaria una combinación de desinfección previa y posterior al ordeño, se debe considerar el uso de otro producto que no contenga yodo para la desinfección posterior al ordeño.

4.3.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véase Instrucciones generales de uso

4.3.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase Instrucciones generales de uso

4.3.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase Instrucciones generales de uso

4.4 Descripción de uso

Uso 4 - Uso 3.4 –Productos listos para su uso- Líquido listo para su uso por profesionales para aplicación después del ordeño– Inmersión

Tipo de producto	TP03 - Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacteria Nombre común: - Etapa de desarrollo: - Nombre científico: Levadura Nombre común: - Etapa de desarrollo: -
Ámbito de utilización	Interior
Método(s) de aplicación	Método: Sistema abierto : tratamiento por inmersión Descripción detallada: Aplicación a través de copa de inmersión: utilizando una copa de inmersión tradicional con válvulas de retención, dispense el producto en el depósito. Atornille la parte del aplicador. Aprete el depósito para llenar el aplicador. Cubra los dos tercios inferiores de cada ubre con el producto. Deseche el producto no utilizado después de cada ordeño. La misma solución se puede aplicar a varios animales durante la misma sesión de ordeño.

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: Cantidad de producto listo para su uso a aplicar por aplicación; - vacas y búfalas: de 3 a 10 ml (se recomiendan 5 ml) - ovejas de 1,5 a 5 ml (se recomiendan 1,5 ml) - cabras de 2,5 a 6 ml (se recomiendan 2,5 ml)
Dilución (%): Formulación lista para usar. La concentración de uso del producto es de 0,16 % (p/p) de yodo
Número y frecuencia de aplicación:
2 aplicaciones después del ordeño por animal, y por día

Categoría(s) de usuarios

Profesional especializado
Profesional

Tamaños de los envases y material del envasado

Tambor, Plástico: HDPE, 10 l
Tambor, Plástico: HDPE, 20 l
Tambor, Plástico: HDPE, 25 l
Tambor de Plástico: HDPE, 200 l
IBC (recipiente para granel intermediario), plástico: HDPE, 1000 l
Tambor de Plástico: HDPE, 5 l

Todos los tambores, excepto 200 l (200 kg) y 1000 l (1000 kg) pueden ser de color plateado o natural (blanco translúcido). Los tambores de 200 l (200 kg) son de color plateado o azul. Las IBC son de color natural.

Todos los tambores están tapados con tapas o tapones a prueba de manipulaciones y están certificados por la norma UN

4.4.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Sumerja por lo menos 2/3 de la ubre con el producto diluido inmediatamente después del ordeño.
Para garantizar un tiempo de contacto suficiente, se debe tener cuidado de que el producto no sea retirado después de la aplicación (por ejemplo, mantener las vacas de pie durante al menos 5 minutos).

4.4.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

En caso de que sea necesaria una combinación de desinfección previa y posterior al ordeño, se debe considerar el uso de otro producto que no contenga yodo para la desinfección antes del ordeño.

4.4.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véase Instrucciones generales de uso

4.4.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase Instrucciones generales de uso

4.4.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase Instrucciones generales de uso

4.5 Descripción de uso

Uso 5 - Uso 3.5 –Productos listos para su uso- Líquido listo para su uso por profesionales para aplicación después del ordeño– pulverización

Tipo de producto	TP03 - Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacteria Nombre común: - Etapa de desarrollo: - Nombre científico: Levadura Nombre común: - Etapa de desarrollo: -
Ámbito de utilización	Interior
Método(s) de aplicación	Método: Sistema abierto: tratamiento por pulverización Descripción detallada: Aplicación a través de pulverizador neumático: La lanza del sistema de pulverización se coloca en el recipiente del producto. El producto se bombea a una lanza de pulverización situada en la sala de ordeño. La lanza de pulverización se utiliza para cubrir los dos tercios inferiores de las ubres con el producto.

	<p>Aplicación a través de pulverizador manual: Llene el frasco del pulverizador con el producto. Utilice el pulverizador para cubrir los dos tercios inferiores de cada ubre con el producto.</p>
<p>Dosis y frecuencia de aplicación</p>	<p>Tasa de aplicación: Cantidad de producto listo para su uso a aplicar por aplicación; - vacas y búfalas: de 3 a 10 ml (se recomiendan 5 ml) - ovejas de 1,5 a 5 ml (se recomiendan 1,5 ml) - cabras de 2,5 a 6 ml (se recomiendan 2,5 ml) Dilución (%): Formulación lista para usar. La concentración de uso del producto es de 0,16 % (p/p) de yodo. Número y frecuencia de aplicación: 2 aplicaciones después del ordeño por animal, y por día</p>
<p>Categoría(s) de usuarios</p>	<p>Profesional especializado Profesional</p>
<p>Tamaños de los envases y material del envasado</p>	<p>Tambor, Plástico: HDPE, 10 l Tambor, Plástico: HDPE, 20 l Tambor, Plástico: HDPE, 25 l Tambor de Plástico: HDPE, 200 l IBC (recipiente para granel intermediario), plástico: HDPE, 1000 l Tambor de Plástico: HDPE, 5 l</p> <p>Todos los tambores, excepto 200 l (200 kg) y 1000 l (1000 kg) pueden ser de color plateado o natural (blanco translúcido). Los tambores de 200 l (200 kg) son de color plateado o azul. Las IBC son de color natural.</p> <p>Todos los tambores están tapados con tapas o tapones a prueba de manipulaciones y están certificados por la norma UN.</p>

4.5.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Pulverice por lo menos 2/3 de la ubre con el producto diluido inmediatamente después del ordeño.

Para garantizar un tiempo de contacto suficiente, se debe tener cuidado de que el producto no sea retirado después de la aplicación (por ejemplo, mantener las vacas de pie durante al menos 5 minutos).

4.5.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Use guantes protectores resistentes a los productos químicos y botas cuando aplique el producto mediante pulverización manual (el material de los guantes será especificado por el titular de la autorización en la información del producto)
Se debe usar una bata protectora (al menos tipo 6, EN 13034)

En caso de que sea necesaria una combinación de desinfección previa y posterior al ordeño, se debe considerar el uso de otro producto que no contenga yodo para la desinfección previa al ordeño.

4.5.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véase Instrucciones generales de uso

4.5.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase Instrucciones generales de uso

4.5.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase Instrucciones generales de uso

4.6 Descripción de uso

Uso 6 - Uso 3.6 –Productos listos para su uso- Líquido listo para su uso por profesionales para aplicación después del ordeño - espuma.

Tipo de producto

TP03 - Higiene veterinaria

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

-

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Bacteria
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Nombre científico: Levadura
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Ámbito de utilización

Interior

Método(s) de aplicación

Método: Sistema abierto : tratamiento por inmersión
Descripción detallada:

Aplicación a través de una copa de inmersión de espuma: Cuando la copa de inmersión se aprieta, el líquido es forzado a través de una malla fina, se mezcla con aire y forma espuma. Esto se aplica luego a los dos tercios inferiores de la ubre de la vaca.

La misma solución se puede aplicar a varios animales durante la misma sesión de ordeño.

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: Cantidad de producto listo para su uso a aplicar por aplicación; - vacas y búfalas: de 3 a 10 ml (se recomiendan 5 ml) - ovejas de 1,5 a 5 ml (se recomiendan 1,5 ml) - cabras de 2,5 a 6 ml (se recomiendan 2,5 ml)
Dilución (%): Formulación lista para usar. La concentración de uso del producto es de 0,16 % (p/p) de yodo.
Número y frecuencia de aplicación:
2 aplicaciones después del ordeño por animal, y por día

Categoría(s) de usuarios

Profesional especializado

Profesional

Tamaños de los envases y material del envasado

Tambor, Plástico: HDPE, 10 l

Tambor, Plástico: HDPE, 20 l

Tambor, Plástico: HDPE, 25 l

Tambor de Plástico: HDPE, 200 l

IBC (recipiente para granel intermediario), plástico: HDPE, 1000 l

Tambor de Plástico: HDPE, 5 l

Todos los tambores, excepto 200 l (200 kg) y 1000 l (1000 kg) pueden ser de color plateado o natural (blanco translúcido). Los tambores de 200 l (200 kg) son de color plateado o azul. Las IBC son de color natural.

Todos los tambores están tapados con tapas o tapones a prueba de manipulaciones y están certificados por la norma UN.

4.6.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Sumerja por lo menos 2/3 de la ubre con el producto diluido inmediatamente después del ordeño.

Para garantizar un tiempo de contacto suficiente, se debe tener cuidado de que el producto no sea retirado después de la aplicación (por ejemplo, mantener las vacas de pie durante al menos 5 minutos).

4.6.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

En caso de que sea necesaria una combinación de desinfección previa y posterior al ordeño, se debe considerar el uso de otro producto que no contenga yodo para la desinfección previa al ordeño.

4.6.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véase Instrucciones generales de uso

4.6.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase Instrucciones generales de uso

4.6.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase Instrucciones generales de uso

4.7 Descripción de uso

Uso 7 - Uso 3.7 –Productos listos para su uso- Líquido listo para su uso por profesionales para aplicación antes y después del ordeño- Inmersión

Tipo de producto

TP03 - Higiene veterinaria

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

-

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Bacteria
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Nombre científico: Levadura
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Ámbito de utilización

Interior

Método(s) de aplicación

Método: Sistema abierto : tratamiento por inmersión
Descripción detallada:

Aplicación a través de copa de inmersión: utilizando una copa de inmersión tradicional con válvulas de retención, dispense el producto diluido en el depósito. Atornille la parte del aplicador. Apretar el depósito para llenar el aplicador. Cubra los dos tercios inferiores de cada ubre con el producto. Deseche el producto no utilizado después de cada ordeño.

La misma solución se puede aplicar a varios animales durante la misma sesión de ordeño

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: Cantidad de producto listo para su uso a aplicar por aplicación; - vacas y búfalas: de 3 a 10 ml (se recomiendan 5 ml) - ovejas de 1,5 a 5 ml (se recomiendan 1,5 ml) - cabras de 2,5 a 6 ml (se recomiendan 2,5 ml)
Dilución (%): Formulación lista para usar. La concentración de uso del producto es de 0,16 % (p/p) de yodo.

Número y frecuencia de aplicación:

2 aplicaciones antes del ordeño por animal, y por día

2 aplicaciones después del ordeño por animal, y por día

Categoría(s) de usuarios

Profesional especializado

Profesional

Tamaños de los envases y material del envasado

Tambor, Plástico: HDPE, 10 l
Tambor, Plástico: HDPE, 20 l
Tambor, Plástico: HDPE, 25 l
Tambor de Plástico: HDPE, 200 l

IBC (recipiente para granel intermediario), plástico: HDPE, 1000 l
Tambor de Plástico: HDPE, 5 l

Todos los tambores, excepto 200 l (200 kg) y 1000 l (1000 kg) pueden ser de color plateado o natural (blanco translúcido). Los tambores de 200 l (200 kg) son de color plateado o azul. Las IBC son de color natural.

Todos los tambores están tapados con tapas o tapones a prueba de manipulaciones y están certificados por la norma UN.

4.7.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Después del ordeño:

Sumerja por lo menos 2/3 de la ubre con el producto diluido inmediatamente después del ordeño.

Para garantizar un tiempo de contacto suficiente, se debe tener cuidado de que el producto no sea retirado después de la aplicación (por ejemplo, mantener las vacas de pie durante al menos 5 minutos).

4.7.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Use guantes protectores resistentes a los productos químicos cuando aplique el producto por inmersión (el material de los guantes será especificado por el titular de la autorización en la información del producto).

Este producto se puede utilizar para la desinfección previa y posterior al ordeño en combinación. Sin embargo, no debe usarse en combinación con un producto diferente a base de yodo.

4.7.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véase Instrucciones generales de uso

4.7.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase Instrucciones generales de uso

4.7.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase Instrucciones generales de uso

4.8 Descripción de uso

Uso 8 - Uso 3.8 – Productos listos para su uso - Líquido listo para su uso por profesionales para aplicación antes y después del ordeño - pulverización

Tipo de producto

TP03 - Higiene veterinaria

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

-

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Bacteria
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Nombre científico: Levadura
Nombre común: -
Etapa de desarrollo: -

Ámbito de utilización

Interior

Método(s) de aplicación

Método: Sistema abierto: tratamiento por pulverización
Descripción detallada:

Aplicación a través de pulverizador neumático: La lanza del sistema de pulverización se coloca en el recipiente del producto diluido. El producto diluido se bombea a una lanza de pulverización situada en la sala de ordeño. La lanza de pulverización se utiliza para cubrir los dos tercios inferiores de las ubres con el producto diluido

Aplicación a través de pulverizador manual: Llene el frasco del pulverizador con el producto diluido. Utilice el pulverizador para cubrir los dos tercios inferiores de cada ubre con el producto diluido

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: Cantidad de producto listo para su uso a aplicar por aplicación; - vacas y búfalas: de 3 a 10 ml (se recomiendan 5 ml) - ovejas de 1,5 a 5 ml (se recomiendan 1,5 ml) - cabras de 2,5 a 6 ml (se recomiendan 2,5 ml)
Dilución (%): Formulación lista para usar. La concentración de uso del producto es de 0,16 % (p/p) de yodo.
Número y frecuencia de aplicación:

2 aplicaciones antes del ordeño por animal, y por día
2 aplicaciones después del ordeño por animal, y por día

Categoría(s) de usuarios

Profesional especializado
Profesional

Tamaños de los envases y material del envasado

Tambor, Plástico: HDPE, 10 l

Tambor, Plástico: HDPE, 20 l

Tambor, Plástico: HDPE, 25 l

Tambor de Plástico: HDPE, 200 l
IBC (recipiente para granel intermediariointermedio), plástico: HDPE, 1000 l

Tambor de Plástico: HDPE, 5 l
Todos los tambores, excepto 200 l (200 kg) y 1000 l (1000 kg) pueden ser de color

plateado o natural (blanco translúcido). Los tambores de 200 l (200 kg) son de color plateado o azul. Las IBC son de color natural.
Todos los tambores están tapados con tapas o taponés a prueba de manipulaciones y están certificados por la norma UN.

4.8.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Después del ordeño:

Sumerja por lo menos 2/3 de la ubre con el producto diluido inmediatamente después del ordeño.
Para garantizar un tiempo de contacto suficiente, se debe tener cuidado de que el producto no sea retirado después de la aplicación (por ejemplo, mantener las vacas de pie durante al menos 5 minutos).

4.8.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Use guantes protectores resistentes a los productos químicos y botas cuando aplique el producto mediante pulverización manual (el material de los guantes será especificado por el titular de la autorización en la información del producto)

Se debe usar una bata protectora (al menos tipo 6, EN 13034)

Este producto se puede utilizar para la desinfección previa y posterior al ordeño en combinación. Sin embargo, no debe usarse en combinación con un producto diferente a base de yodo.

4.8.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véase Instrucciones generales de uso

4.8.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase Instrucciones generales de uso

4.8.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase Instrucciones generales de uso

4.9 Descripción de uso

Uso 9 - Uso 3.9 –Productos listos para su uso- Líquido listo para su uso por profesionales para aplicación antes y después del ordeño - espuma

Tipo de producto	TP03 - Higiene veterinaria
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	-
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacteria Nombre común: - Etapa de desarrollo: - Nombre científico: Levadura Nombre común: - Etapa de desarrollo: -
Ámbito de utilización	Interior
Método(s) de aplicación	Método: Sistema abierto : tratamiento por inmersión Descripción detallada: Aplicación a través de una copa de inmersión de espuma: Cuando la copa de inmersión se aprieta, el líquido es forzado a través de una malla fina, se mezcla con aire y forma espuma. Esto se aplica luego a los dos tercios inferiores de la ubre de la vaca. La misma solución se puede aplicar a varios animales durante la misma sesión de ordeño.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: Cantidad de producto listo para su uso a aplicar por aplicación; - vacas y búfalas: de 3 a 10 ml (se recomiendan 5 ml) - ovejas de 1,5 a 5 ml (se recomiendan 1,5 ml) - cabras de 2,5 a 6 ml (se recomiendan 2,5 ml) Dilución (%): Formulación lista para usar. La concentración de uso del producto es de 0,16 % (p/p) de yodo. Número y frecuencia de aplicación: 2 aplicaciones antes del ordeño por animal, y por día 2 aplicaciones después del ordeño por animal, y por día
Categoría(s) de usuarios	Profesional especializado Profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Tambor, Plástico: HDPE, 10 l Tambor, Plástico: HDPE, 20 l Tambor, Plástico: HDPE, 25 l

Tambor de Plástico: HDPE, 200 l

IBC (recipiente para granel intermediario), plástico: HDPE, 1000 l
Tambor de Plástico: HDPE, 5 l

Todos los tambores, excepto 200 l (200 kg) y 1000 l (1000 kg) pueden ser de color plateado o natural (blanco translúcido). Los tambores de 200 l (200 kg) son de color plateado o azul. Las IBC son de color natural.

Todos los tambores están tapados con tapas o tapones a prueba de manipulaciones y están certificados por la norma UN

4.9.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Después del ordeño:

Sumerja por lo menos 2/3 de la ubre con el producto diluido inmediatamente después del ordeño.

Para garantizar un tiempo de contacto suficiente, se debe tener cuidado de que el producto no sea retirado después de la aplicación (por ejemplo, mantener las vacas de pie durante al menos 5 minutos).

4.9.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Use guantes protectores resistentes a productos químicos cuando aplique el producto por el método de aplicación de espuma (el material del guante será especificado por el titular de la autorización en la información del producto).

Este producto se puede utilizar para la desinfección previa y posterior al ordeño en combinación. Sin embargo, no debe usarse en combinación con un producto diferente a base de yodo

4.9.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véase Instrucciones generales de uso

4.9.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase Instrucciones generales de uso

4.9.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase Instrucciones generales de uso

5. Instrucciones generales de uso

5.1. Instrucciones de uso

Mantener alejado del alcance de los niños.

Lea siempre la etiqueta o folleto antes de usar el producto y siga todas las intrucciones de uso.

El producto debe atemperarse por encima de 20° antes de su uso.

El producto se puede utilizar durante todo el período de lactancia.

Antes de colocar el equipo de ordeño, todos los residuos del producto deben eliminarse con una toalla de un solo uso o con un paño reutilizable. Se debe usar un paño por vaca

Para un uso eficaz contra las bacterias y las levaduras, el producto debe dejarse en contacto con la piel durante al menos 60 segundos.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Véase la sección "Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico" de cada uso.

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Quitar y lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente.

Después de la inhalación: muévase al aire fresco en caso de inhalación accidental de humos por sobrecalentamiento o combustión. Si no se siente bien, consulte a un médico.

Después del contacto con la piel: Lavar con agua y jabón como medida de precaución. Consulte a un médico si persiste la irritación de la piel.

Después del contacto con los ojos: enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, durante al menos 15 minutos. Busque tratamiento médico por un especialista en ojos.

Después de la ingestión: Enjuagar la boca y beber mucha agua para beber. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte a un médico.

Los derrames grandes se deben contener con un kit de derrames químicos, se absorben con material absorbente y se eliminan como desechos peligrosos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

Al final del tratamiento, deseche el producto no utilizado y el embalaje de acuerdo con los requisitos locales. El producto usado se puede tirar a la alcantarilla municipal o al depósito de estiércol según los requisitos locales. Evite la liberación a una planta de tratamiento de aguas residuales de una granja individual.

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos de acuerdo a la normativa vigente. Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Proteger de las heladas

No almacenar a temperaturas superiores a 30 °C.

Vida útil 12 meses

6. Información adicional