

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Grupės pavadinimas: DeLaval veterinarinių biocidinių produktų speniams dezinfekuoti, gaminamų jodo pagrindu, grupė (DeLaval iodine-based teat disinfectant family)

Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: LT/AP-BPV/2022/0290

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: LT-0023878-0000

Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	2
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	2
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 1. Metagrupė 1	2
2. Meta SPC sudėtis	3
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	3
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	10
6. Kita informacija	12
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	12
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 2. Metagrupė 2	13
2. Meta SPC sudėtis	13
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	14
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	14
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	21
6. Kita informacija	22
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	22
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 3. Metagrupė 3	27
2. Meta SPC sudėtis	27
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	28
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	28
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	35
6. Kita informacija	36
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	36
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 4. Metagrupė 4	38
2. Meta SPC sudėtis	39
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	39

4. Meta SPC autorizotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	39
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	46
6. Kita informacija	47
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	47
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 5. Metagrupė 5	48
2. Meta SPC sudėtis	48
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	49
4. Meta SPC autorizotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	49
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	56
6. Kita informacija	57
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	57
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 6. Metagrupė 6	59
2. Meta SPC sudėtis	59
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	60
4. Meta SPC autorizotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	60
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	66
6. Kita informacija	68
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	68
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS 7. Metagrupė 7	69
2. Meta SPC sudėtis	69
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	70
4. Meta SPC autorizotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	70
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	76
6. Kita informacija	78
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	78

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

1. Administracinė informacija

1.1. Grupės pavadinimas

DeLaval veterinarinių biocidinių produktų speniams dezinfekuoti, gaminamų jodo pagrindu, grupė (DeLaval iodine-based teat disinfectant family)

1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	DeLaval NV
	Adresas	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgija
Autorizacijos liudijimo numeris	LT/AP-BPV/2022/0290	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0023878-0000	
Autorizacijos liudijimo data	20/06/2022	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	28/08/2028	

1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	DeLaval NV
Gamintojo adresas	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgija
Gamybos vieta	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgija

1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Gamintojo adresas	Tiekėjas ES: SQM Europe NV - Sint-Pietersvliet 7 bus 8 2000 Antwerpen Belgija
Gamybos vieta	Los Militares 4290 Piso 4 8320000 Las Condes (Santiago) Čilė

2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,15 - 0,75
Alkoholio etoksilatas		Kita sudedamoji dalis	68439-46-3		0 - 6,34
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,06 - 0,33

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

AL - Bet koks kitas skystis
SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS 1. Metagrupė 1

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,21 - 0,25
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,092 - 0,12

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, mirkant rankiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, pamerkiant į jį spenius rankiniu būdu, naudojant mirkymo indą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičius ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas yra paruoštas naudoti, jo nereikia skiesti.

Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Melžiant ir dezinfekuojant spenius rekomenduojama mūvėti pirštines, kad apsaugotumėte savo rankų odą ir užtikrintumėte higieniškas melžimo sąlygas.

Naudojant rankiniu būdu, reikia naudoti švarų mirkymo indą.

Prieš naudojant, įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo kiekvieną spenį pamerkti į paruoštą naudoti produktą.

MIRKYMAS: pamerkti kiekvieną spenį į produktą. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti mirkymo indą;

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.2. skyriuje.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, purškiant rankiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, apipurškiant spenius rankiniu būdu, naudojant purkštuvą.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai
Skiedimas (%): 0 %
Taikymo skaičius ir laikas:
Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 5 l
DTPE talpykla, 10 l
DTPE talpykla, 20 l
DTPE talpykla, 60 l
DTPE statinė, 200 l
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Naudojant rankiniu būdu: reikia naudoti švarų spenių apipurškimo aplikatorių.

Prieš naudojimą įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo apipurkšti kiekvieną spenį paruoštu naudoti produktu:

1) RANKINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti purkštuvo talpyklą;

2) AUTOMATINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę.

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant spenius po melžimo purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).
Žiūrėti bendruosius nurodymus pateikti 5.2. skyriuje.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai mirkant arba purškiant automatiu būdu

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Spenių dezinfekantas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Virusai
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Po melžimo, melžimo aparatas, produktu padengia spenius automatinio būdu su integruota mirkymo arba apipurškimo įranga.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo, 3 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.2. skyriuje.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Bendrujų naudojimo nurodymų nėra. Žiūrėti specifinius naudojimo nurodymus.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

TIESIOGINIS IR NETIESIOGINIS POVEIKIS:

Atsižvelgiant į mūsų patirtį ir jums pateiktą informaciją, produktas neapsižymi jokia nepageidaujama poveikiu, jeigu naudojamas ir tvarkomas taip, kaip nurodyta.

- PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS:

Patekus į akis: Kruopščiai, mažiausiai 15 min plauti gausiu vandens kiekiu. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat nusivilkti visus užterštus drabužius ir nusiauti užterštą avalynę.

Prarijus: Išplauti burną vandeniu. Prarijus didelį kiekį ir (arba) pasireiškus bet kokiems simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą.

- NEATIDĒLIOTINOS APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS:

Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Užtvinkite. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Laikyti tinkamose uždarytose talpyklose paruoštą utilizuoti.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdorojimo, išmeskite nepanaudoto produkto likučius ir pakuotę, laikydamiesi vietinių galiojančių reikalavimų. Panaudotą produktą galima išpilti į kanalizaciją kartu su buitinėmis nuotekomis arba į sрутų rezervuarą, atsižvelgiant į vietinius galiojančius reikalavimus. Neišpilti į atskirus nuotekų valymo įrenginius.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: laikyti vertikaliaje padėtyje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės nei 30 °C temperatūros ir užšalimo.

Tinkamumo laikas: 1 metai.

6. Kita informacija

--

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslūs sudėtis

Prekinis pavadinimas

Tri-Fender	Rinka: EU
Tri-Fender	Rinka: CH
Tri-Fender	Rinka: IS
Tri-Fender	Rinka: NO

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0023878-0001 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,25
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,12

Prekinis pavadinimas

TriActive	Rinka: DK
-----------	-----------

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0023878-0002 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,214
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,092

1. Meta SPC administravimo informacija**1.1. meta SPC identifikatorius**

meta PCS 2. Metagrupė 2

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-2

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis**2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,23 - 0,25
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,097 - 0,11

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sudėtyje yra Natrio jodatas. Gali sukelti alerginę reakciją.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, mirkant rankiniu būdu

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Spenių dezinfekantas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Virusai
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, pamerkiant į jį spenius rankiniu būdu, naudojant mirkymo indą.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičius ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5 l</p> <p>DTPE talpykla, 10 l</p> <p>DTPE talpykla, 20 l</p> <p>DTPE talpykla, 60 l</p> <p>DTPE statinė, 200 l</p> <p>DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas yra paruoštas naudoti, jo nereikia skiesti.

Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Melžiant ir dezinfekuojant spenius rekomenduojama mūvėti pirštines, kad apsaugotumėte savo rankų odą ir užtikrintumėte higieniškas melžimo sąlygas.

Naudojant rankiniu būdu, reikia naudoti švarų mirkymo indą.

Prieš naudojant, įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo kiekvieną spenį pamerkti į paruoštą naudoti produktą.

MIRKYMAS: pamerkti kiekvieną spenį į produktą. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti mirkymo indą.

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.2. skyriuje.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, purškiant rankiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, apipurškiant spenius rankiniu būdu, naudojant purkštuvą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičius ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištisisus metus laktacijos laikotarpiu.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 5 l
DTPE talpykla, 10 l
DTPE talpykla, 20 l
DTPE talpykla, 60 l
DTPE statinė, 200 l
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Naudojant rankiniu būdu: reikia naudoti švarų spenių apipurškimo aplikatorių.

Prieš naudojimą įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo apipuršksti kiekvieną spenį paruoštu naudoti produktu:

1) RANKINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti purkštuvo talpyklą;

2) AUTOMATINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę.

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant spenius po melžimo purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas). Žiūrėti bendruosius nurodymus pateikti 5.2. skyriuje.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai mirkant arba purškiant automatiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas gatavais paruoštais naudoti gaminiais po melžimo. Išsamus aprašymas: Po melžimo, melžimo aparatas, produktu padengia spenius automatiniu būdu su integruota mirkymo arba apipurškimo įranga.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai
Skiedimas (%): 0 %
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Naudoti po melžimo, 3 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 5 l
DTPE talpykla, 10 l
DTPE talpykla, 20 l
DTPE talpykla, 60 l
DTPE statinė, 200 l
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.2. skyriuje.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Bendrųjų naudojimo nurodymų nėra. Žiūrėti specifinius naudojimo nurodymus.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

TIESIOGINIS IR NETIESIOGINIS POVEIKIS:

Atsižvelgiant į mūsų patirtį ir mums pateiktą informaciją, produktas neapsižymi jokia nepageidaujama poveikiu, jeigu naudojamas ir tvarkomas taip, kaip nurodyta.

- PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS:

Patekus į akis: Kruopščiai, mažiausiai 15 min plauti gausiu vandens kiekiu. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat nusivilkti visus užterštus drabužius ir nusiauti užterštą avalynę.

Prarijus: Išplauti burną vandeniu. Prarijus didelį kiekį ir (arba) pasireiškus bet kokiems simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą.

- NEATIDĖLIOTINOS APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS:

Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Užtvinkite. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Laikyti tinkamose uždarytose talpyklose paruoštą utilizuoti.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdoravimo, išmeskite nepanaudoto produkto likučius ir pakuotę, laikydamiesi vietinių galiojančių reikalavimų. Panaudotą produktą galima išpilti į kanalizaciją kartu su buitinėmis nuotekomis arba į srutų rezervuarą, atsižvelgiant į vietinius galiojančius reikalavimus. Neišpilti į atskirus nuotekų valymo įrenginius.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: laikyti vertikaliaje padėtyje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės nei 30 °C temperatūros ir užšalimo.

Tinkamumo laikas: 1 metai.

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Blockade	Rinka: HR
Blockade	Rinka: DK
Blockade	Rinka: FR

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Blockade	Rinka: IT
Blockade	Rinka: ES
LT-0023878-0003 1-2	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,25
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,1

Prekinis pavadinimas

IodoFence	Rinka: AT
IodoFence	Rinka: BE
IodoFence	Rinka: BG
IodoFence	Rinka: HR
IodoFence	Rinka: CY
IodoFence	Rinka: CZ
IodoFence	Rinka: DK

IodoFence	Rinka: EE
IodoFence	Rinka: FI
IodoFence	Rinka: FR
IodoFence	Rinka: DE
IodoFence	Rinka: HU
IodoFence	Rinka: IE
IodoFence	Rinka: IT
IodoFence	Rinka: LV
IodoFence	Rinka: LT
IodoFence	Rinka: LU
IodoFence	Rinka: MT
IodoFence	Rinka: NL
IodoFence	Rinka: PL
IodoFence	Rinka: PT
IodoFence	Rinka: RO
IodoFence	Rinka: SK

IodoFence	Rinka: SI
IodoFence	Rinka: ES
IodoFence	Rinka: SE
IodoFence	Rinka: GB
IodoFence	Rinka: CH
IodoFence	Rinka: NO
Autorizacijos liudijimo numeris	
LT-0023878-0004 1-2	

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,25
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,11

Prekinis pavadinimas

Fortex	Rinka: AT
Fortex	Rinka: HR
Fortex	Rinka: CZ

Fortex	Rinka: DK
Fortex	Rinka: EE
Fortex	Rinka: FI
Fortex	Rinka: FR
Fortex	Rinka: DE
Fortex	Rinka: HU
Fortex	Rinka: IT
Fortex	Rinka: LV
Fortex	Rinka: LT
Fortex	Rinka: LU
Fortex	Rinka: NL
Fortex	Rinka: PL
Fortex	Rinka: PT
Fortex	Rinka: ES
Fortex	Rinka: SE
Fortex	Rinka: CH

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Fortex	Rinka: NO
Fortex	Rinka: IS
LT-0023878-0005 1-2	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,23
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,097

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS 3. Metagrupė 3

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-3

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,15 - 0,15
Alkoholio etoksilat		Kita sudedamoji dalis	68439-46-3		1,25 - 1,25
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,065 - 0,065

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, mirkant rankiniu būdu

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Spenių dezinfekantas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų

	Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, pamerkiant į jį spenius rankiniu būdu, naudojant mirkymo indą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištisus metus laktacijos laikotarpiu.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas yra paruoštas naudoti, jo nereikia skiesti.

Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Melžiant ir dezinfekuojant spenius rekomenduojama mūvėti pirštines, kad apsaugotumėte savo rankų odą ir užtikrintumėte higieniškas melžimo sąlygas.

Naudojant rankiniu būdu, reikia naudoti švarų mirkymo indą.

Prieš naudojant, įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo kiekvieną spenį pamerkti į paruoštą naudoti produktą.

MIRKYMAS: pamerkti kiekvieną spenį į produktą. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti mirkymo indą;

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.2. skyriuje.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, purškiant rankiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, apipurškiant spenius rankiniu būdu, naudojant purkštuvą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Naudojant rankiniu būdu: reikia naudoti švarų spenių apipurškimo aplikatorių.

Prieš naudojimą įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo apipurkšti kiekvieną spenį paruoštu naudoti produktu:

1) RANKINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti purkštuvo talpyklą;

2) AUTOMATINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę.

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant spenius po melžimo purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas). Žiūrėti bendruosius nurodymus pateikti 5.2. skyriuje.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai mirkant arba purškiant automatiškai būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais Išsamus aprašymas: Po melžimo, melžimo aparatas, produktu padengia spenių automatiniu būdu su integruota mirkymo arba apipurškimo įranga.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo, 3 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.

Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra. Žiūrėti bendrusius naudojimo nurodymus 5.2. skyriuje.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendrusius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendrusius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Bendrujų naudojimo nurodymų nėra. Žiūrėti specifinius naudojimo nurodymus.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

TIESIOGINIS IR NETIESIOGINIS POVEIKIS:

Atsižvelgiant į mūsų patirtį ir mums pateiktą informaciją, produktas neapsižymi jokia nepageidaujama poveikiu, jeigu naudojamas ir tvarkomas taip, kaip nurodyta.

- PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS:

Patekus į akis: Kruopščiai, mažiausiai 15 min plauti gausiu vandens kiekiu. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat nusivilkti visus užterštus drabužius ir nusiauti užterštą avalynę.

Prarijus: Išplauti burną vandeniu. Prarijus didelį kiekį ir (arba) pasireiškus bet kokiems simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą.

- NEATIDELIOTINOS APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS:

Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Užtvinkite. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Laikyti tinkamose uždarytose talpyklose paruoštą utilizuoti.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdoravimo, išmeskite nepanaudoto produkto likučius ir pakuotę, laikydamiesi vietinių galiojančių reikalavimų. Panaudotą produktą galima išpilti į kanalizaciją kartu su buitineis nuotekomis arba į srutų rezervuarą, atsižvelgiant į vietinius galiojančius reikalavimus. Neišpilti į atskirus nuotekų valymo įrenginius.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: laikyti vertikaliaje padėtyje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės nei 30 °C temperatūros ir užšalimo.

Tinkamumo laikas: 1 metai.

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Dipal RTU	Rinka: AT
Dipal RTU	Rinka: HR
Dipal RTU	Rinka: CY
Dipal RTU	Rinka: DK
Dipal RTU	Rinka: EE
Dipal RTU	Rinka: FI
Dipal RTU	Rinka: FR
Dipal RTU	Rinka: DE
Dipal RTU	Rinka: GR
Dipal RTU	Rinka: LT
Dipal RTU	Rinka: MT
Dipal RTU	Rinka: NL
Dipal RTU	Rinka: BE
Dipal RTU	Rinka: PT
Dipal RTU	Rinka: SI
Dipal RTU	Rinka: ES

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Dipal RTU	Rinka: SE
Dipal RTU	Rinka: NO
LT-0023878-0006 1-3	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,15
Alkoholio etoksilat		Kita sudedamoji dalis	68439-46-3		1,25
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,065

1. Meta SPC administravimo informacija**1.1. meta SPC identifikatorius**

meta PCS 4. Metagrūpė 4

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-4

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,15 - 0,15
Alkoholio etoksilatas		Kita sudedamoji dalis	68439-46-3		1,5 - 1,5
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,11 - 0,11

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, mirkant rankiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p>Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų</p> <p>Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų</p> <p>Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, pamerkiant į jį spenius rankiniu būdu, naudojant mirkymo indą.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičius ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas yra paruoštas naudoti, jo nereikia skiesti.

Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Melžiant ir dezinfekuojant spenius rekomenduojama mūvėti pirštines, kad apsaugotumėte savo rankų odą ir užtikrintumėte higieniškas melžimo sąlygas.

Naudojant rankiniu būdu, reikia naudoti švarų mirkymo indą.

Prieš naudojant, įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo kiekvieną spenį pamerkti į paruoštą naudoti produktą.

MIRKYMAS: pamerkti kiekvieną spenį į produktą. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti mirkymo indą;

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mirkant spenius rankiniu būdu po melžimo, naudoti akių ir (arba) veido apsaugos priemones. Žiūrėti nurodymus 5.2. skyriuje.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, purškiant rankiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, apipurškiant spenius rankiniu būdu, naudojant purkštuvą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Naudojant rankiniu būdu: reikia naudoti švarų spenių apipurškimo aplikatorių.

Prieš naudojimą įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo apipurkšti kiekvieną spenį paruoštu naudoti produktu:

1) RANKINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti purkštuvo talpyklą;

2) AUTOMATINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę.

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojuojant spenius po melžimo purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagų produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas) ir akių bei veido apsaugos priemones. Žiūrėti bendruosius nurodymus pateikti 5.2. skyriuje.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai mirkant arba purškiant automatiškai būdu

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Spenių dezinfekantas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Virusai
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais.

Išsamus aprašymas:

Po melžimo, melžimo aparatas, produktu padengia spenius automatiškai būdu su integruota mirkymo arba apipurškimo įranga.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai

Skiedimas (%): 0 %

Taikymo skaičius ir laikas:

Naudoti po melžimo, 3 kartus per dieną. Produktą galima naudoti išstisus metus laktacijos laikotarpiu.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 5 l

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 60 l
DTPE statinė, 200 l
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mirkant arba apipurškiant spenius automatinio būdu po melžimo, naudoti akių ir (arba) veido apsaugos priemonės. Žiūrėti nurodymus 5.2. skyriuje.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Bendrųjų naudojimo nurodymų nėra. Žiūrėti specifinius naudojimo nurodymus.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

TIESIOGINIS IR NETIESIOGINIS POVEIKIS:

Atsižvelgiant į mūsų patirtį ir mums pateiktą informaciją, produktas neapsižymi jokia nepageidaujama poveikiu, jeigu naudojamas ir tvarkomas taip, kaip nurodyta.

- PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS:

Patekus į akis: Kruopščiai, mažiausiai 15 min plauti gausiu vandens kiekiu. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat nusivilkti visus užterštus drabužius ir nusiauti užterštą avalynę.

Prarijus: Išplauti burną vandeniu. Prarijus didelį kiekį ir (arba) pasireiškus bet kokiems simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą.

- NEATIDĖLIOTINOS APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS:

Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Užtvinkite.

Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Laikyti tinkamose uždarytose talpyklose paruoštą utilizuoti.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdoravimo, išmeskite nepanaudoto produkto likučius ir pakuotę, laikydamiesi vietinių galiojančių reikalavimų. Panaudotą produktą galima išpilti į kanalizaciją kartu su buitinėmis nuotekomis arba į sruvų rezervuarą, atsižvelgiant į vietinius galiojančius

reikalavimus. Neišpilti į atskirus nuotekų valymo įrenginius.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: laikyti vertikaliaje padėtyje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės nei 30 °C temperatūros ir užšalimo.

Tinkamumo laikas: 1 metai.

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslūs sudėtis

Prekinis pavadinimas

Dipal Plus

Rinka: NL

Dipal Plus

Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

LT-0023878-0007 1-4

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,15
Alkoholio etoksilatas		Kita sudedamoji dalis	68439-46-3		1,5
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,11

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS 5. Metagrupė 5

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-5

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,75 - 0,75
Alkoholio etoksilatas		Kita sudedamoji dalis	68439-46-3		6,34 - 6,34
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,33 - 0,33

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Gali pakenkti organams skyd liaukė jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai per burną.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Mūvēti naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Koncentruoti produktai spenių dezinfekcijai, mirkant rankiniu būdu

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Spenių dezinfekantas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Virusai
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo atskiestais koncentruotais produktais.
Išsamus aprašymas:
Produktą naudoti po melžimo, pamerkiant į jį spenius rankiniu būdu, naudojant mirkymo indą.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai
Skiedimas (%): 20 %: jodo koncentracija: 0.15 %.
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Skirta naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Gaminius galima naudoti ištisus metus visą laktacijos laikotarpį.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE butelis, 1l

DTPE talpykla, 5 l

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 60 l

DTPE statinė, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudojimo nurodymai:

Melžiant ir dezinfekuojant spenius rekomenduojama mūvėti pirštines, kad apsaugotumėte savo rankų odą ir užtikrintumėte higieniškas melžimo sąlygas.

Paruošti 20 % tirpalą su švariu vandeniu. 200 ml koncentruoto produkto išmaišyti 1 l vandens, kad gautųsi 0,15 % jodo koncentracija.

Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Ruošiant tirpalą jis gali putoti. Tokiu atveju, griežtai rekomenduojama apdorojimą pradėti tik tada, kai putų kiekis pakankamai sumažėja.

Naudojant rankiniu būdu, reikia naudoti švarų mirkymo indą.

Prieš naudojant, įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo kiekvieną spenį pamerkti į atskiestą produktą.

MIRKYMAS: pamerkti kiekvieną spenį į produktą. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti mirkymo indą.

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mirkant spenius rankiniu būdu po melžimo, naudoti akių ir (arba) veido apsaugos priemones. Žiūrėti nurodymus 5.2. skyriuje.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Koncentruoti produktai spenių dezinfekcijai, purškiant rankiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo atskiestais koncentruotais produktais Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, apipurškiant spenius rankiniu būdu, naudojant purkštuvą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 20 %: jodo koncentracija: 0.15 %. Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE butelis, 1l

DTPE talpykla, 5 l

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 60 l

DTPE statinė, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudojimo nurodymai:

Paruošti 20 % tirpalą su švariu vandeniu. 200 ml koncentruoto produkto išmaišyti 1 l vandens, kad gautųsi 0,15 % jodo koncentracija.

Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Ruošiant tirpalą jis gali putoti. Tokiu atveju, griežtai rekomenduojama apdorojimą pradėti tik tada, kai putų kiekis pakankamai sumažėja.

Naudojant rankiniu būdu: reikia naudoti švarų spenių apipurškimo aplikatorių.

Prieš naudojimą įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo apipurkšti kiekvieną spenį atskiestu produktu:

1) RANKINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti purkštuvo talpyklą;

2) AUTOMATINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę.

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant spenius po melžimo purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas) ir akių bei veido apsaugos priemones. Žiūrėti bendruosius nurodymus pateikti 5.2. skyriuje.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Koncentruoti produktai spenių dezinfekcijai, mirkant arba purškiant automatinio būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo atskiestais koncentruotais produktais.</p> <p>Išsamus aprašymas: Po melžimo, melžimo aparatas, produktu padengia spenius automatinio būdu su integruota mirkymo arba apipurškimo įranga.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai</p> <p>Skiedimas (%): 20 %: jodo koncentracija: 0,15 %.</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo, 3 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE butelis, 1l DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Naudojimo nurodymai</p> <p>Paruošti 20 % tirpalą su švariu vandeniu. 200 ml koncentruoto produkto išmaišyti 1 l vandens, kad gautųsi 0,15 % jodo koncentracija.</p> <p>Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.</p> <p>Ruošiant tirpalą jis gali putoti. Tokiu atveju, griežtai rekomenduojama apdorojimą pradėti tik tada, kai putų kiekis pakankamai sumažėja.</p>
--

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mirkant arba apipurškiant spenius automatiškai būdu po melžimo, naudoti akių ir (arba) veido apsaugos priemonės. Žiūrėti nurodymus 5.2. skyriuje.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Bendrujų naudojimo nurodymų nėra. Žiūrėti specifinius naudojimo nurodymus.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

TIESIOGINIS IR NETIESIOGINIS POVEIKIS:

Atsižvelgiant į mūsų patirtį ir mums pateiktą informaciją, produktas neapsižymi jokia nepageidaujama poveikiu, jeigu naudojamas ir tvarkomas taip, kaip nurodyta.

- PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS:

Patekus į akis: Kruopščiai, mažiausiai 15 min plauti gausiu vandens kiekiu. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat nusivilkti visus užterštus drabužius ir nusiauti užterštą avalynę.

Prarijus: Išplauti burną vandeniu. Prarijus didelį kiekį ir (arba) pasireiškus bet kokiems simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą.

- NEATIDĒLIOTINOS APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS:

Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Užtvinkite. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Laikyti tinkamose uždarytose talpyklose paruoštą utilizuoti.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdoravimo, išmeskite nepanaudoto produkto likučius ir pakuotę, laikydamiesi vietinių galiojančių reikalavimų. Panaudotą produktą galima išpilti į kanalizaciją kartu su buitinėmis nuotekomis arba į sрутų rezervuarą, atsižvelgiant į vietinius galiojančius reikalavimus. Neišpilti į atskirus nuotekų valymo įrenginius.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: laikyti vertikaliaje padėtyje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės nei 30 °C temperatūros ir užšalimo.

Tinkamumo laikas: 1 metai.

6. Kita informacija

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Iobac Conc	Rinka: BE
Dipal Conc	Rinka: BG

Dipal Conc	Rinka: HR
Dipal Conc	Rinka: CY
Dipal Conc	Rinka: CZ
Dipal Conc	Rinka: DK
Dipal Conc	Rinka: EE
Dipal Conc	Rinka: FI
Dipal Conc	Rinka: FR
Dipal Conc	Rinka: HU
Dipal Conc	Rinka: LV
Dipal Conc	Rinka: LT
Dipal Conc	Rinka: LU
Dipal Conc	Rinka: PL
Dipal Conc	Rinka: RO
Dipal Conc	Rinka: SE
Dipal Conc	Rinka: NO
Dipal Conc	Rinka: IS

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0023878-0008 1-5

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,75
Alkoholio etoksilatas		Kita sudedamoji dalis	68439-46-3		6,34
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,33

1. Meta SPC administravimo informacija**1.1. meta SPC identifikatorius**

meta PCS 6. Metagrupė 6

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-6

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis**2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,15 - 0,15
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,07 - 0,07

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, mirkant rankiniu būdu

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Spenių dezinfekantas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas:
Bendrinis pavadinimas: Virusai
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais.</p> <p>Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, pamerkiant į jį spenius rankiniu būdu, naudojant mirkymo indą.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai</p> <p>Skiedimas (%): 0 %</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Produktas yra paruoštas naudoti, jo nereikia skiesti.</p> <p>Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.</p> <p>Naudojimo nurodymai:</p> <p>Melžiant ir dezinfekuojant spenius rekomenduojama mūvėti pirštines, kad apsaugotumėte savo rankų odą ir užtikrintumėte higieniškas melžimo sąlygas.</p> <p>Naudojant rankiniu būdu, reikia naudoti švarų mirkymo indą.</p> <p>Prieš naudojant, įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo kiekvieną spenį pamerkti į paruoštą naudoti produktą.</p>

MIRKYMAS: pamerkti kiekvieną spenį į produktą. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti mirkymo indą;

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.2. skyriuje.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, purškiant rankiniu būdu

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Spenių dezinfekantas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrasis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: nėra duomenų

	<p>Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų</p> <p>Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, apipurškiant spenius rankiniu būdu, naudojant purkštuvą.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičius ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištisus metus laktacijos laikotarpiu.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Naudojant rankiniu būdu: reikia naudoti švarų spenių apipurškimo aplikatorių.

Prieš naudojimą įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo apipurkšti kiekvieną spenį paruoštu naudoti produktu:

1) RANKINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti purkštuvo talpyklą;

2) AUTOMATINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę.

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant spenius po melžimo purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas). Žiūrėti bendruosius nurodymus pateikti 5.2. skyriuje.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai mirkant arba purškiant automatiu būdu

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Spenių dezinfekantas

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijos)**

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Virusai
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais.

Išsamus aprašymas:

Po melžimo, melžimo aparatas, produktu padengia spenius automatinio būdu su integruota mirkymo arba apipurškimo įranga.

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai

Skiedimas (%): 0 %

Taikymo skaičius ir laikas:

Naudoti po melžimo, 3 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

DTPE talpykla, 5 l

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 60 l

DTPE statinė, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.2. skyriuje.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Bendrujų naudojimo nurodymų nėra. Žiūrėti specifinius naudojimo nurodymus.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

TIESIOGINIS IR NETIESIOGINIS POVEIKIS:

Atsižvelgiant į mūsų patirtį ir mums pateiktą informaciją, produktas neapsižymi jokių nepageidaujamo poveikio, jeigu naudojamas ir tvarkomas taip, kaip nurodyta.

- PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS:

Patekus į akis: Kruopščiai, mažiausiai 15 min plauti gausiu vandens kiekiu. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat nusivilkti visus užterštus drabužius ir nusiauti užterštą avalynę.

Prarijus: Išplauti burną vandeniu. Prarijus didelį kiekį ir (arba) pasireiškus bet kokiems simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą.

- NEATIDĖLIOTINOS APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS:

Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Užtvinkite. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Laikyti tinkamose uždarytose talpyklose paruoštą utilizuoti.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdoravimo, išmeskite nepanaudoto produkto likučius ir pakuotę, laikydamiesi vietinių galiojančių reikalavimų. Panaudotą produktą galima išpilti į kanalizaciją kartu su buitėmis nuotekomis arba į sрутų rezervuarą, atsižvelgiant į vietinius galiojančius reikalavimus. Neišpilti į atskirus nuotekų valymo įrenginius.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: laikyti vertikaliaje padėtyje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės nei 30 °C temperatūros ir užšalimo.

Tinkamumo laikas: 1 metai.

6. Kita informacija

--

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslus sudėtis

Prekinis pavadinimas

Proactive Plus	Rinka: DK
Proactive Plus	Rinka: FI
Proactive Plus	Rinka: SE
Proactive Plus	Rinka: NO

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0023878-0009 1-6

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,15

Natrio jodidas	Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,07
----------------	-----------------------	-----------	-----------	------

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS 7. Metagrupė 7

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-7

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,15 - 0,15
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,06 - 0,06

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	Sudėtyje yra Natrio jodatas. Gali sukelti alerginę reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Gali ėsdinti metalus.
Pavojingumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, mirkant rankiniu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas gatavais (paruoštais naudoti) gaminiams po melžimo išsamus aprašymas: Produktą naudoti po melžimo, pamerkiant į jį spenius rankiniu būdu, naudojant mirkymo indą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 5 l

DTPE talpykla, 10 l

DTPE talpykla, 20 l

DTPE talpykla, 60 l

DTPE statinė, 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas yra paruoštas naudoti, jo nereikia skiesti.

Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Melžiant ir dezinfekuojant spenius rekomenduojama mūvėti pirštines, kad apsaugotumėte savo rankų odą ir užtikrintumėte higieniškas melžimo sąlygas.

Naudojant rankiniu būdu, reikia naudoti švarų mirkymo indą.

Prieš naudojant, įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo kiekvieną spenį pamerkti į paruoštą naudoti produktą.

MIRKYMAS: pamerkti kiekvieną spenį į produktą. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti mirkymo indą;

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.2. skyriuje.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai, purškiant rankiniu būdu

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Spenių dezinfekantas

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Virusai
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo.
Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais.
Išsamus aprašymas:
Produktą naudoti po melžimo, apipurškiant spenius rankiniu būdu, naudojant purkštuvą.

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai
Skiedimas (%): 0 %
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Naudoti po melžimo, 2 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištisus metus
laktacijos laikotarpiu.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

DTPE talpykla, 5 l
DTPE talpykla, 10 l
DTPE talpykla, 20 l
DTPE talpykla, 60 l
DTPE statinė, 200 l
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Naudojimo nurodymai:

Naudojant rankiniu būdu: reikia naudoti švarų spenių apipurškimo aplikatorių.

Prieš naudojimą įsitikinti, kad speniai yra švarūs. Iškart po melžimo apipurkšti kiekvieną spenį paruoštu naudoti produktu:

1) RANKINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę. Užtikrinti, kad pasidengtų bent trys ketvirčiai spenio ilgio. Prireikus, vėl pripildyti purkštuvo talpyklą;

2) AUTOMATINIS PURKŠTUVAS: purkšti produktu kiekvieną spenį 1 sekundę.

Po naudojimo leisti speniams išdžiūti mažiausiai 5 minutes. Gyvuliai šį laiką turi stovėti.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant spenius po melžimo purškiant rankiniu būdu, mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).
Žiūrėti bendruosius nurodymus pateikti 5.2. skyriuje.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Paruošti naudoti produktai spenių dezinfekcijai mirkant arba purškiant automatiu būdu

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Spenių dezinfekantas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Produktas yra skirtas speniams dezinfekuoti po melžimo. Produktą naudoti iškart po melžimo tiesiai ant melžiamų gyvulių spenių.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Spenių dezinfekavimas po melžimo paruoštais naudoti produktais. Išsamus aprašymas: Po melžimo, melžimo aparatas, produktu padengia spenius automatiu būdu su integruota mirkymo arba apipurškimo įranga.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: apie 5 ml vienai karvei; apie 2,5 ml – aviai ar ožkai Skiedimas (%): 0 % Taikymo skaičius ir laikas: Naudoti po melžimo, 3 kartus per dieną. Produktą galima naudoti ištikus metus laktacijos laikotarpiu.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpykla, 5 l DTPE talpykla, 10 l DTPE talpykla, 20 l DTPE talpykla, 60 l DTPE statinė, 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Tai paruoštas naudojimui produktas, kurio nereikia skiesti. Prieš naudojant, produktą reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Specifinių rizikos valdymo priemonių nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.2. skyriuje.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.3. skyriuje.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Specifinių naudojimo instrukcijų nėra. Žiūrėti bendruosius naudojimo nurodymus 5.4. skyriuje.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Bendrujų naudojimo nurodymų nėra. Žiūrėti specifinius naudojimo nurodymus.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

TIESIOGINIS IR NETIESIOGINIS POVEIKIS:

Atsižvelgiant į mūsų patirtį ir mums pateiktą informaciją, produktas neapsižymi jokia nepageidaujama poveikiu, jeigu naudojamas ir tvarkomas taip, kaip nurodyta.

- PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS:

Patekus į akis: Kruopščiai, mažiausiai 15 min plauti gausiu vandens kiekiu. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat nusivilkti visus užterštus drabužius ir nusiauti užterštą avalynę.

Prarijus: Išplauti burną vandeniu. Prarijus didelį kiekį ir (arba) pasireiškus bet kokiems simptomams, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą.

- NEATIDĖLIOTINOS APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS:

Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Užtvinkite. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Laikyti tinkamose uždarytose talpyklose paruoštą utilizuoti.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdoravimo, išmeskite nepanaudoto produkto likučius ir pakuotę, laikydamiesi vietinių galiojančių reikalavimų. Panaudotą produktą galima išpilti į kanalizaciją kartu su buitinėmis nuotekomis arba į sрутų rezervuarą, atsižvelgiant į vietinius galiojančius reikalavimus. Neišpilti į atskirus nuotekų valymo įrenginius.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: laikyti vertikaliaje padėtyje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės nei 30 °C temperatūros ir užšalimo.

Tinkamumo laikas: 1 metai.

6. Kita informacija

--

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslis sudėtis

Prekinis pavadinimas	Iobac RTU	Rinka: BE
	Proactive	Rinka: IT
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	LT-0023878-0010 1-7	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,15
Natrio jodidas		Kita sudedamoji dalis	7681-82-5	231-679-3	0,06