

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: NEO BIOLEN BAIT OAT

Τύπος(οι) προϊόντος: PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0135

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0020158-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	3
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	4
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	4
2.2. Είδος τυποποίησης	4
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	4
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	4
4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	6
4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	6
4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	6
4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	6
4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	6
4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	7
4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	7
4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	7
4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	8
4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	8
4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	9
4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	9
4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	9
4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	9
4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	9
4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	10
4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	11

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	11
4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	11
4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	11
4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση	12
4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση	12
4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση	12
4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση	12
4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση	12
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	12
5.1. Οδηγίες χρήσης	13
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	15
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	17
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	17
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	17
6. Άλλες πληροφορίες	17

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

NEO BIOLEN BAIT OAT
NEO BRODIRAC OAT
FAX (ΦΑΞ) OAT
RATICINO OAT

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	C. ZARACOVITIS & CO
	Διεύθυνση	EL. VENIZELOU 158A 16341 ATHENS Ελλάδα
Αριθμός άδειας	ΤΠ14-0135	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0020158-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	28/03/2018	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	11/02/2024	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	K. ZAPAKOΒITHΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., AGGRESS ,
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Αρμα, 32200 Θήβα Ελλάδα
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Αρμα, 32200 Θήβα Ελλάδα

Όνομα του παρασκευαστή	SOFAR
Διεύθυνση του παρασκευαστή	BP 02 29190 PLEYBEN Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	BP 02 29190 PLEYBEN Γαλλία

Όνομα του παρασκευαστή	HDA
Διεύθυνση του παρασκευαστή	ZA LA CHARME MENETROL 63200 RIOM Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	ZA LA CHARME MENETROL 63200 RIOM Γαλλία

Όνομα του παρασκευαστή	IRIS
Διεύθυνση του παρασκευαστή	1126A, AVENUE DU MOULINAS, ROUTE DE SAINT-PRIVAT 30340 SALINDRES Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	1126A, AVENUE DU MOULINAS, ROUTE DE SAINT-PRIVAT 30340 SALINDRES Γαλλία

Όνομα του παρασκευαστή	FARMAVIT OOD
Διεύθυνση του παρασκευαστή	BUL TSAR III, N° 63, OFFICE 1 1612 SOFIA Βουλγαρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	INDUSTRIALNA 2 STR, PLEVEN DISTRICT 5960 GULIANTSI Βουλγαρία

Όνομα του παρασκευαστή	NOXIMA
Διεύθυνση του παρασκευαστή	CARREFOUR JEAN MONNET - LACROIX ST-OUEN 60201 COMPIEGNE Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	CARREFOUR JEAN MONNET - LACROIX ST-OUEN 60201 COMPIEGNE Γαλλία

Όνομα του παρασκευαστή	INDUSTRIAL CHIMICA SRL
Διεύθυνση του παρασκευαστή	VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE Ιταλία

Όνομα του παρασκευαστή	AEDES PROTECTA,
Διεύθυνση του παρασκευαστή	75rue d' Orgemont, 95210 Saint-Gratien, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	75rue d' Orgemont, 95210 Saint-Gratien, Γαλλία

Όνομα του παρασκευαστή	SAS RATOUCY
Διεύθυνση του παρασκευαστή	29 RUE DE LA FORET BP 145 89303 JOIGNY CEDEX Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	29 RUE DE LA FORET BP 145 89303 JOIGNY CEDEX Γαλλία

Όνομα του παρασκευαστή	FHS
Διεύθυνση του παρασκευαστή	RUE DE LA TETE A LOUP ZAC DE GRANDCHAMP, 77440 OCQUERRE Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	RUE DE LA TETE A LOUP ZAC DE GRANDCHAMP, 77440 OCQUERRE Γαλλία

Όνομα του παρασκευαστή	FARMA-CHEM SA
Διεύθυνση του παρασκευαστή	INDUSTRIAL AREA OF SINDOS P.O. BOX 1026, BLOCK 53 ZONE C 57022 THESSALONIKI Ελλάδα
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	INDUSTRIAL AREA OF SINDOS P.O. BOX 1026, BLOCK 53 ZONE C 57022 THESSALONIKI Ελλάδα

Όνομα του παρασκευαστή	AGROLOGY SA
Διεύθυνση του παρασκευαστή	P.O. BOX 1089, INDUSTRIAL AREA OF THESSALONIKI, 57022 THESSALONIKI Ελλάδα
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	P.O. BOX 1089, INDUSTRIAL AREA OF THESSALONIKI, 57022 THESSALONIKI Ελλάδα

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	11 - Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Όνομα του παρασκευαστή	ACTIVA/TEZZA
Διεύθυνση του παρασκευαστή	VIA FELTRE 32 20132 MILAN Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	VIA TRE PONTI 22 37050 S. MARIA DI ZEVIO Ιταλία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Ενεργός Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0.001
Monopropylene glycol	propane-1,2-diol		57-55-6	200-338-0	2.4836
Triethanolamine	2,2',2''-nitrilotriethanol		102-71-6	203-049-8	0.0172

2.2. Είδος τυποποίησης

Δόλωμα σε σπόρους σιτηρών (βρώμη)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Δηλώσεις προφύλαξης

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση #1 Κατά των ποντικών και αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Rattus norvegicus-Brown rat-Νεαρά Π.χ. τρωκτικά Rattus norvegicus-Brown rat-Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Rattus rattus-House rat-Νεαρά Π.χ. τρωκτικά Rattus rattus-House rat-Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Mus musculus-House mouse-Νεαρά Π.χ. τρωκτικά Mus musculus-House mouse-Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Εφαρμογή δολωμάτων εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ποντικοί: 30γρ έως 40γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1 έως 2 μέτρα. Αρουραίοι: 100 γρ έως 200 γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα. - 0 - Ποντικοί: 30γρ έως 40γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1 έως 2 μέτρα. Αρουραίοι: 100 γρ έως 200 γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Τα τρωκτικοκτόνα δολώματα περιέχονται είτε χύδην είτε συσκευασμένα σε σακουλάκια από PE των 20 έως 100 γραμμαρίων. Το ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας είναι 3 kg Υλικό συσκευασίας: PE/ αλουμίνιο/ πολυεστέρας.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση #2 Κατά των ποντικών και αρουραίων σε εξωτερικούς χώρους και περιμετρικά των κτηρίων από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

-

Rattus norvegicus-Brown rat-Νεαρά |Π.χ. τρωκτικά

Rattus norvegicus-Brown rat-Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

Rattus rattus-House rat-Νεαρά |Π.χ. τρωκτικά

Rattus rattus-House rat-Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

Mus musculus-House mouse-Νεαρά |Π.χ. τρωκτικά

Mus musculus-House mouse-Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί χώροι (περιμετρικά κτηρίων)
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Εφαρμογή δολωμάτων εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ποντικοί: 30γρ έως 40γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1 έως 2 μέτρα. Αρουραίοι: 100 γρ έως 200 γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα. - 0 - Ποντικοί: 30γρ έως 40γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1 έως 2 μέτρα. Αρουραίοι: 100 γρ έως 200 γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Τα τρωκτικοκτόνα δολώματα περιέχονται είτε χύδην είτε συσκευασμένα σε σακουλάκια από PE των 20 έως 100 γραμμαρίων. Το ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας είναι 3 kg Υλικό συσκευασίας: PE/ αλουμίνιο/ πολυεστέρας.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Χρήση #3 Κατά των ποντικών και αρουραίων σε εξωτερικούς χώρους (χωματερές) από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Rattus norvegicus-Brown rat-Νεαρά Π.χ. τρωκτικά Rattus norvegicus-Brown rat-Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Rattus rattus-House rat-Νεαρά Π.χ. τρωκτικά Rattus rattus-House rat-Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Mus musculus-House mouse-Νεαρά Π.χ. τρωκτικά Mus musculus-House mouse-Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)
Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί χώροι (χωματερές)
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Εφαρμογή δολωμάτων εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ποντικοί: 30γρ έως 40γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1 έως 2 μέτρα. Αρουραίοι: 100 γρ έως 200 γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα. - 0 - Ποντικοί: 30γρ έως 40γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1 έως 2 μέτρα. Αρουραίοι: 100 γρ έως 200 γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Τα τρωκτικοκτόνα δολώματα περιέχονται είτε χύδην είτε συσκευασμένα σε σακουλάκια από PE των 20 έως 100 γραμμαρίων.

Το ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας είναι 3 kg

Υλικό συσκευασίας: PE/ αλουμίνιο/ πολυεστέρας.

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Χρήση #4 Κατά των ποντικών ή και αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από το ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Rattus norvegicus-Brown rat-Νεαρά Π.χ. τρωκτικά Rattus norvegicus-Brown rat-Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Rattus rattus-House rat-Νεαρά Π.χ. τρωκτικά Rattus rattus-House rat-Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Mus musculus-House mouse-Νεαρά Π.χ. τρωκτικά Mus musculus-House mouse-Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Εφαρμογή δολωμάτων εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ποντικοί: 30γρ έως 40γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1 έως 2 μέτρα. Αρουραίοι: 100 γρ έως 200 γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα. - 0 - Ποντικοί: 30γρ έως 40γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1 έως 2 μέτρα. Αρουραίοι: 100 γρ έως 200 γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέχρι 150γρ (τα δολώματα θα περιέχονται σε σακουλάκια από PE των 10 έως 100γρ). Το μέγιστο μέγεθος συσκευασίας για συσκευασίες που προορίζονται για αποκλειστική χρήση κατά των ποντικών θα είναι 50γρ. Υλικό συσκευασίας PE/αλουμίνιο / πολυεστερικό

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.5 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 5 - Χρήση #5 Κατά των αρουραίων περιμετρικά των κτιρίων από το ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Rattus norvegicus-Brown rat-Νεαρά Π.χ. τρωκτικά Rattus norvegicus-Brown rat-Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Rattus rattus-House rat-Νεαρά Π.χ. τρωκτικά Rattus rattus-House rat-Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)
Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτηρίων
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Εφαρμογή δολωμάτων εντός δολωματικών σταθμών ανθεκτικών στην παραβίαση

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

100 γρ έως 200 γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης. Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα. - 0 -
100 γρ έως 200 γρ δολώματος, ανά σημείο δόλωσης.
Η απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 έως 10 μέτρα.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Μέχρι 150γρ (τα δολώματα θα περιέχονται σε σακουλάκια από PE των 10 έως 100γρ).
Υλικό συσκευασίας PE/αλουμίνιο / πολυεστερικό

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Γενικές οδηγίες χρήσης

Επαγγελματική χρήση:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν από κάθε χρήση.
- Επιθεωρήστε τον χώρο πριν την εφαρμογή των δολωμάτων και πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, ο τόπος δραστηριότητάς τους με σκοπό να προσδιορισθεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) κατά την κατά την πρώτη εφαρμογή και ανά εβδομαδιαία διαστήματα στις επόμενες εφαρμογές, ώστε να ελέγχεται η κατανάλωση του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται εάν κριθεί απαραίτητο.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου.
- Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βούλωμα τρυπών, απομάκρυνση πιθανών εστιών τροφής και πόσιμου νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επαναπροσβολής.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γεινίαση με μέρη όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, φωλιές, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατάλληλες κατασκευές.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνο και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής του θα πρέπει να σημαίνονται καθ' όλη την περίοδο χρήσης (παρουσίας) του στο χώρο με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τις α' βοήθειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από τον δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε την μετεγκατάσταση των σταθμών δόλωσης σε διαφορετικές θέσεις και την πιθανότητα αλλαγής δολώματος.
- Εάν μετά από μια περίοδο θεραπείας 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να καθοριστεί η πιθανή αιτία. Στην περίπτωση όπου έχουν εξαιρεθεί άλλες αιτίες μειωμένης αποτελεσματικότητας, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά. Σε αυτήν την περίπτωση συστήνεται η χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, η χρήση παγίδων θα πρέπει να εξεταστεί ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.
- Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται στους δολωματικούς σταθμούς με τη χρήση δοσομετρητή.
- Τα δολώματα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κλπ.). Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές που δεν πλημμυρίζουν.

Χρήση από το ευρύ κοινό:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν από κάθε χρήση.
- Πριν από κάθε χρήση τρωκτικοκτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γεινίαση με μέρη όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως

δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, φωλιές, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).

- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατάλληλες κατασκευές.
- Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.
- Τα δολώματα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κλπ.). Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές που δεν πλημμυρίζουν.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Γενικά Μέτρα Μετριασμού Κινδύνων

Για επαγγελματική χρήση:

- Μη το χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους για την εφαρμογή καταπολέμησης τρωκτικών.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τις 35 ημέρες χωρίς να προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της μόλυνσης και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω:
 - Μη μετακινείτε ή ανοίγετε.
 - Περιέχει το τρωκτικοκτόνο "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης "," δραστική ουσία (-εσ) "
 - Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777.
 - Επικίνδυνο για την άγρια φύση.
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαιρεθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος.
- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό, στην περίπτωση που οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε αποχετευτικά δίκτυα.
- Όταν τοποθετούνται οι δολωματικοί σταθμοί κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, εγκαταστάσεις ποτίσματος κλπ) ή αποχετευτικά δίκτυα, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφευχθεί κάθε επαφή των δολωμάτων με το νερό.
- Μην πλένετε τους σταθμούς δολωμάτων με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας στις στοές των τρωκτικών
- Μην εφαρμόζετε την τεχνική της τακτικής δόλωσης (pulsed baiting) όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
- Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα

Για χρήση από το ευρύ κοινό:

- Μη το χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βούλωμα τρυπών, απομάκρυνση πιθανών εστιών τροφής και πόσιμου νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επαναπροσβολής.
- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών).
- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό, στην περίπτωση που οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε αποχετευτικά δίκτυα.
- Όταν τοποθετούνται οι δολωματικοί σταθμοί κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, εγκαταστάσεις ποτίσματος κλπ) ή αποχετευτικά δίκτυα, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφευχθεί κάθε επαφή των δολωμάτων με το νερό.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω:
 - Μη μετακινείτε ή ανοίγετε.
 - Περιέχει το τρωκτικοκτόνο "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης "," δραστική ουσία (-εσ) "

- Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777.
- Επικίνδυνο για την άγρια φύση.

- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) πρέπει να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει τον προμηθευτή του προϊόντος και να αποταθεί σε αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μμοκτονιών.

- Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι σταθμοί δόλωσης.

- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

- Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας στις στοές των τρωκτικών

- Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και ματωμένα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

Πρώτες βοήθειες

- Δερματική έκθεση: Ξέπλυμα του δέρματος με νερό και στη συνέχεια πλύσιμο με νερό και σαπούνι.

- Έκθεση οφθαλμών: Ξεβγάλτε τα μάτια με υγρό έκπλυσης των οφθαλμών ή νερό και κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Έκθεση από το στόμα: Ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό.

- Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από ένα κατοικίδιο ζώο.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε φαγωμένα δολώματα και τη συσκευασία τους σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής.
- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση τους από τα τρωκτικά.

- Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απομάκρυνση τους.

- Το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική.

