

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: Protect Revolution

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0016509-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0016509-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	18
5.1. Pokyny pro používání	18
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	20
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	22
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	22
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	22
6. Další informace	23

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

Protect Revolution

1.2. Držitel povolení

**Jméno (název) a adresa
držitele povolení**

Jméno (název)	Bábolna Bioenvironmental Centre Private Limited Company
Adresa	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Maďarsko
Číslo povolení	CZ-0016509-0000
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0016509-0000
Datum udělení povolení	11/06/2013
Datum skončení platnosti povolení	01/07/2024

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce

Babolna Bio Ltd
Szállás utca 6 1107 Budapest Maďarsko
Köves János utca 1-3. 2943 Bábolna Maďarsko

Adresa výrobce

Umístění výrobních závodů

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

12 - Bromadiolon

Název výrobce

Babolna Bio Limited (Member of the Bromadiolone Task Force)

Adresa výrobce

Dr Tezza S.r.l. - Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Itálie

Umístění výrobních závodů

PM Tezza S.r.l. - Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Itálie

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	účinná látka	28772-56-7	249-205-9	0,0027

2.2. Typ složení přípravku

RB - Nástraha k přímému použití

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty
o nebezpečnosti

Může způsobit poškození orgánů krev při prodloužené nebo opakované expozici .

Pokyny pro bezpečné
zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

PŘI expozici nebo podezření na ni:Vyhledejte lékařskou

Skladujte uzamčené.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - myš domácí, krysa a potkan - široká veřejnost - ve vnitřních prostorách

Typ přípravku

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní pro rodenticidy

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: *Mus musculus*
Obecný název: House mouse
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Latinský název: *Rattus norvegicus*
Obecný název: Brown rat
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Latinský název: *Rattus rattus*
Obecný název: Roof rat
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Oblast použití

Vnitřní

Ve vnitřních prostorách

Metoda(y) aplikace

Metoda: Použití ve formě návnady
Podrobný popis:

Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: myš domácí: 1 tácek obsahující 75, 90g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů. granulí v sáčku z filtračního papíru nebo plastový sáček, : 100g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů. krysa a potkan: Miska: 1 miska s obsahem 150g návnady nebo 2 miska s obsahem 75, 90, 125g nástrahy na jednu deratizační staničku Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 7 metrů – Vysoká míra zamoření a 10 metrů. granulí v sáčku z filtračního papíru nebo plastový sáček, : 150g nástrahy na jednu deratizační staničku Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 7 metrů – Vysoká míra zamoření a 10 metrů
Ředění (%): -
Počet a načasování aplikace:
-

Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Nejvýše 150g

- 1 tácek obsahující 75, 90, 125, 150 g deratizační nástrahy ve formě granulí (1-2 tácků / krabici)

-1 tácek obsahující 75, 90 g deratizační nástrahy ve formě granulí + 50 g atraktivního gelu, (1-2 tácků / krabici)

- 10, 20, 25 or 50 g deratizační nástrahy ve formě granulí v sáčku z filtračního papíru v papírové krabici

- 2x 20, 25 g deratizační nástrahy ve formě granulí v sáčku z filtračního papíru v plastový krabici, 1-2 plastový krabici v papírové krabici

-100, 150g deratizační nástrahy ve formě granulí v plastový sáček, v papírové krabici

-100, 150g deratizační nástrahy ve formě granulí v plastový sáček

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

myš domácí: Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně jednou za 2 až 3 dny na zahájení deratizace

krysa a potkan: Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace.

Následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

viz kapitola 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

4.2 Popis použití

Použití 2 - krysa a potkan – široká veřejnost – venkovní prostory kolem budov

Typ přípravku	Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Není relevantní pro rodenticidy
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Rattus norvegicus Obecný název: Brown rat Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci Latinský název: Rattus rattus Obecný název: Roof rat Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci
Oblast použití	Venkovní Venkovní prostory kolem budov
Metoda(y) aplikace	Metoda: Použití ve formě návnady Podrobný popis: Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: Potkan: Miska: 1 miska s obsahem 150g návnady nebo 2 miska s obsahem 75, 90, 125g nástrahy na jednu deratizační staničku Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 7 metrů – Vysoká míra zamoření a 10 metrů. granulí v sáčku z filtračního papíru nebo plastový sáček, : 150g nástrahy na jednu deratizační staničku Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 7 metrů – Vysoká míra zamoření a 10 metrů Ředění (%): - Počet a načasování aplikace: -
Kategorie uživatelů	Široká veřejnost (neprofesionál)
Velikost balení a obalový materiál	Nejvýše 150 g. 1.) 1 tácek obsahující 75, 90, 125, 150 g deratizační nástrahy ve formě granulí (1-2 tácky / krabici).

- 2.) 1 tácek obsahující 75, 90 g deratizační nástrahy ve formě granulí + 50 g atraktivního gelu, (1-2 tácky / krabici).
- 3.) 10, 20, 25 nebo 50 g deratizační nástrahy ve formě granulí v sáčku z filtračního papíru, v papírové krabici.
- 4.) 2x 20, 25 g deratizační nástrahy ve formě granulí v sáčku z filtračního papíru v plastové krabici, 1-2 plastové sáčky v papírové krabici.
- 5.) 100, 150 g deratizační nástrahy ve formě granulí v plastovém sáčku, v papírové krabici.
- 6.) 100, 150 g deratizační nástrahy ve formě granulí v plastovém sáčku, v papírové krabici.

4.2.1 Návod k danému způsobu použití

Umístěte deratizační staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy.
Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.
Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

-viz kapitola 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

4.3 Popis použití

Použití 3 - myš domácí – profesionální uživatelé – ve vnitřních prostorách

Typ přípravku	Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Není relevantní pro rodenticidy
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Mus musculus Obecný název: House mouse Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci
Oblast použití	Vnitřní Ve vnitřních prostorách
Metoda(y) aplikace	Metoda: Použití ve formě návnady Podrobný popis: Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: myš domácí: množství: 100g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů. 1 tácek obsahující 75, 90g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů. granulí v sáčku z filtračního papíru nebo plastový sáček, : 100g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů. Ředění (%): - Počet a načasování aplikace: -
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	- 1 tácek obsahující 75, 90, 125, 150, 175 g deratizační nástrahy ve formě granulí (Nejvýše 20kg) -1 tácek obsahující 75, 90 g deratizační nástrahy ve formě granulí + 50 g atraktivního gelu, (Nejvýše 20kg) - 20, 25 or 50 g deratizační nástrahy ve formě granulí v sáčku z filtračního papíru v papírové krabici (Nejvýše 20kg) . množství v plastovém kbelíku nejvýše 20kg (vnitřní balení 10 kg)

- . množství v papírovém barelu nejvýše 30kg (vnitřní balení 10 kg)
- . množství v plastovém pytli v kartonové krabici nejvýše 25kg (vnitřní balení 10 kg)
- . množství v papírovém pytli nejvýše 25kg (vnitřní balení 10 kg)

4.3.1 Návod k danému způsobu použití

Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně jednou za 2 až 3 dny v počáteční fázi deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

4.3.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

-viz kapitola 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

4.3.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Při umísťování deratizačních staniček v blízkosti drenážních systémů zajistěte, aby se nástraha nedostala do styku s vodou

4.3.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

4.3.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

4.4 Popis použití

Použití 4 - krysa a potkan – profesionální uživatelé – ve vnitřních prostorech

Typ přípravku

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní pro rodenticidy

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: *Rattus norvegicus*
Obecný název: Brown rat
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Latinský název: *Rattus rattus*
Obecný název: Roof rat
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Oblast použití

Vnitřní

Ve vnitřních prostorech

Metoda(y) aplikace

Metoda: Použití ve formě návnady
Podrobný popis:

Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: krysa a potkan: množství: 250g nástrahy na jednu deratizační staničku
Miska: 1 miska s obsahem 150g, 175g návnady nebo 2 miska s obsahem 75, 90, 125g nástrahy na jednu deratizační staničku Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 7 metrů – Vysoká míra zamoření a 10 metrů. granulí v sáčku z filtračního papíru nebo plastový sáček, : 250g nástrahy na jednu deratizační staničku Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 7 metrů – Vysoká míra zamoření a 10 metrů
Ředění (%): -
Počet a načasování aplikace: -

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

- 1 tácek obsahující 75, 90, 125, 150, g deratizační nástrahy ve formě granulí (Nejvýše 20kg)
-1 tácek obsahující 75, 90 g deratizační nástrahy ve formě granulí + 50 g atraktivního gelu, (Nejvýše 20kg)
- 20, 25 or 50 g deratizační nástrahy ve formě granulí v sáčku z filtračního papíru v papírové krabici (Nejvýše 20kg)
- množství v plastovém kbelíku nejvýše 20kg (vnitřní balení 10 kg)
- množství v papírovém barelu nejvýše 30kg (vnitřní balení 10 kg)
- množství v plastovém pytli v kartonové krabici nejvýše 25kg (vnitřní balení 10 kg)
- množství v papírovém pytli nejvýše 25kg (vnitřní balení 10 kg)

4.4.1 Návod k danému způsobu použití

Deratizační staničky je nutno kontrolovat alespoň každých 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

4.4.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

-viz kapitola 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

4.4.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Při umístování deratizačních staniček v blízkosti drenážních systémů zajistěte, aby se nástraha nedostala do styku s vodou

4.4.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

4.4.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

4.5 Popis použití

Použití 5 - myš domácí a krysa a potkan – profesionální uživatelé – ve venkovních prostorách kolem budov

Typ přípravku

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní pro rodenticidy

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Rattus norvegicus
Obecný název: Brown rat
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Latinský název: Mus musculus
Obecný název: House mouse
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Latinský název: Rattus rattus
Obecný název: Roof rat
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Oblast použití

Venkovní

Venkovní prostory kolem budov

Metoda(y) aplikace

Metoda: Použití ve formě návnady
Podrobný popis:

Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: myš domácí: množství: 100g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů. 1 tácek obsahující 75, 90g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů. granulí v sáčku z filtračního papíru nebo plastový sáček, : 100g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů. krysa a potkan: množství: 250g nástrahy na jednu deratizační staničku Miska: 1 miska s obsahem 150g, 175g návnady nebo 2 miska s obsahem 75, 90, 125g nástrahy na jednu deratizační staničku Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 7 metrů – Vysoká míra zamoření a 10 metrů. granulí v sáčku z filtračního papíru nebo plastový sáček, : 250g nástrahy na jednu deratizační staničku Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 7 metrů – Vysoká míra zamoření a 10 metrů
Ředění (%): -
Počet a načasování aplikace:
-

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

- 1 tácek obsahující 75, 90, 125, 150, nebo 175 g deratizační nástrahy ve formě granulí (Nejvýše 20kg)
-1 tácek obsahující 75, 90 g deratizační nástrahy ve formě granulí + 50 g atraktivního gelu, (Nejvýše 20kg)
- 20, 25 or 50 g deratizační nástrahy ve formě granulí v sáčku z filtračního papíru v papírové krabici (Nejvýše 20kg)
. množství v plastovém kbelíku nejvýše 20kg (vnitřní balení 10 kg)
. množství v papírovém barelu nejvýše 30kg (vnitřní balení 10 kg)
. množství v plastovém pytli v kartonové krabici nejvýše 25kg (vnitřní balení 10 kg)
. množství v papírovém pytli nejvýše 25kg (vnitřní balení 10 kg)

4.5.1 Návod k danému způsobu použití

Chraňte nástrahu před povětrnostními podmínkami (např. deštěm, sněhem atd.). Umístěte deratizační staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy.

Deratizační staničky je nutno kontrolovat [u myší – nejméně každé 2 až 3 dny] [u krys a potkanů – nejdříve 5 až 7 dnů po] zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.

Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

4.5.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Tento přípravek neaplikujte přímo do nor.

4.5.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Při umísťování deratizačních staniček v blízkosti povrchových vod (např. řek, rybníků, vodních kanálů, hrází, zavlažovacích nádrží) nebo drenážních systémů zajistěte, aby nedocházelo ke styku nástrahy s vodou.

4.5.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

4.5.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

4.6 Popis použití

Použití 6 - myš domácí a krysa či potkan – odborně způsobilé osoby – ve vnitřních prostorech

Typ přípravku

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní pro rodenticidy

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: *Rattus norvegicus*
Obecný název: Brown rat
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Latinský název: *Mus musculus*
Obecný název: House mouse
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Latinský název: *Rattus rattus*
Obecný název: Roof rat
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Oblast použití

Vnitřní

Ve vnitřních prostorech

Metoda(y) aplikaceMetoda: Použití ve formě návnady
Podrobný popis:

Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření nebo být povoleny k použití v krytých a chráněných nástrahových místech, poskytují-li stejnou úroveň ochrany pro necílové druhy a pro člověka jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření.

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: myš domácí: množství: 100g nástrahy na místo položení nástrahy. 1 tácek obsahující 75, 90g nástrahy na místo položení nástrahy. granulí v sáčku z filtračního papíru nebo plastový sáček, : 100g nástrahy na místo položení nástrahy. krysa a potkan: množství: 250g nástrahy na místo položení nástrahy Miska: 1 miska s obsahem 150g, 175g návnady nebo 2 miska s obsahem 75, 90, 125g nástrahy na místo položení nástrahy granulí v sáčku z filtračního papíru nebo plastový sáček, : 250g nástrahy na místo položení nástrahy Strategie stálého: 250g nástrahy na místo položení nástrahy
Ředění (%): -
Počet a načasování aplikace:
-

Kategorie uživatelů

Vyškolený profesionál

Velikost balení a obalový materiál

- 1 tácek obsahující 75, 90, 125, 150, 175g g deratizační nástrahy ve formě granulí (Nejvýše 20kg)

-1 tácek obsahující 75, 90 g deratizační nástrahy ve formě granulí + 50 g atraktivního gelu, (Nejvýše 20kg)

- 20, 25 or 50 g deratizační nástrahy ve formě granulí v sáčku z filtračního papíru v papírové krabici (Nejvýše 20kg)

. množství v plastovém kbelíku nejvýše 20kg (vnitřní balení 10 kg)

. množství v papírovém barelu nejvýše 30kg (vnitřní balení 10 kg)

. množství v plastovém pytli v kartonové krabici nejvýše 25kg (vnitřní balení 10 kg)

. množství v papírovém pytli nejvýše 25kg (vnitřní balení 10 kg)

4.6.1 Návod k danému způsobu použití

Na konci období deratizace odstraňte zbytek přípravku.

Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

trvalé aplikace nástrahy

– Pokud je to možné, doporučuje se deratizovanou oblast kontrolovat nejméně každé 4 týdny s cílem předejít vytvoření rezistentní populace.

4.6.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace případné osoby, které se vyskytnou v blízkosti (například uživatele deratizované oblasti a jejího okolí) o deratizaci hlodavců (Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.).

Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

– Aby se snížilo riziko sekundární otravy, provádějte v průběhu deratizace v častých intervalech vyhledávání a odstraňování uhynulých hlodavců v souladu s doporučeními stanovenými v příslušném kodexu osvědčených postupů.

– Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou pulzní aplikace nástrahy.

Přípravky mohou být povoleny k použití při hubení pomocí trvalé aplikace nástrahy pouze na místech s vysokým potenciálem opětovné invaze, pokud se ostatní metody regulace ukázaly jako nedostatečné.

trvalé aplikace nástrahy:

– Stálé umístění nástrah je striktně omezeno na místa s vysokým potenciálem opětovného zamoření v případě, že se jiné metody regulace ukázaly jako nedostatečné

– Strategie stálého umístění nástrah musí být pravidelně přezkoumávána v kontextu integrované ochrany proti škůdcům a posouzení rizika opětovného zamoření.

4.6.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Při umísťování deratizačních staniček v blízkosti drenážních systémů zajistěte, aby se nástraha nedostala do styku s vodou.

4.6.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

4.6.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

4.7 Popis použití

Použití 7 - myš domácí a krysa a potkan – odborně způsobilé osoby – ve venkovních prostorách kolem budov

Typ přípravku

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní pro rodenticidy

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Rattus norvegicus
Obecný název: Brown rat
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Latinský název: Mus musculus
Obecný název: House mouse
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Latinský název: Rattus rattus
Obecný název: Roof rat
Vývojové stadium: Mláďata / Dospělci

Oblast použití

Venkovní

Venkovní prostory kolem budov

Metoda(y) aplikace

Metoda: Použití ve formě návnady
Podrobný popis:

Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření nebo být povoleny k použití v krytých a chráněných nástrahových místech, poskytují-li stejnou úroveň ochrany pro necílové druhy a pro člověka jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření.

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: myš domácí: množství: 100g nástrahy na místo položení nástrahy. 1 tácek obsahující 75, 90g nástrahy na místo položení nástrahy. granulí v sáčku z filtračního papíru nebo plastový sáček, : 100g nástrahy na místo položení nástrahy. krysa a potkan: množství: 250g nástrahy na místo položení nástrahy Miska: 1 miska s obsahem 150g, 175g návnady nebo 2 miska s obsahem 75, 90, 125g nástrahy na místo položení nástrahy granulí v sáčku z filtračního papíru nebo plastový sáček, : 250g nástrahy na místo položení nástrahy Strategie stálého: 250g nástrahy na místo položení nástrahy
Ředění (%): -
Počet a načasování aplikace:
-

Kategorie uživatelů

Vyškolení profesionál

Velikost balení a obalový materiál

- 1 tácek obsahující 75, 90, 125, 150 g, 175 deratizační nástrahy ve formě granulí (Nejvýše 20kg)
- 1 tácek obsahující 75, 90 g deratizační nástrahy ve formě granulí + 50 g atraktivního gelu, (Nejvýše 20kg)
- 20, 25 or 50 g deratizační nástrahy ve formě granulí v sáčku z filtračního papíru v papírové krabici (Nejvýše 20kg)
- . množství v plastovém kbelíku nejvýše 20kg (vnitřní balení 10 kg)
- . množství v papírovém barelu nejvýše 30kg (vnitřní balení 10 kg)
- . množství v plastovém pytli v kartonové krabici nejvýše 25kg (vnitřní balení 10 kg)
- . množství v papírovém pytli nejvýše 25kg (vnitřní balení 10 kg)

4.7.1 Návod k danému způsobu použití

- Chraňte nástrahu před vlivem povětrnostních podmínek. Nástrahu pokládejte v prostorách, kde nehrozí záplavy.
- Vyměňte nástrahu na místech, kde byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.

Na konci období deratizace odstraňte zbytek přípravku

trvalé aplikace nástrahy

– Pokud je to možné, doporučuje se deratizovanou oblast kontrolovat nejméně každé 4 týdny s cílem předejít vytvoření rezistentní populace.

Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

použití v krytých a chráněných nástrahových místech:

- Pro venkovní použití musí být návnady zakryty a umístěny na strategických místech, aby se minimalizovalo vystavení necílových druhů.

- Postupujte podle případných dalších pokynů uvedených v příslušném kodexu osvědčených postupů

4.7.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

– Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace případné osoby, které se vyskytují v blízkosti (například uživatele

deratizované oblasti a jejího okolí)

Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace případné osoby, které se vyskytují v blízkosti (například uživatele deratizované oblasti a jejího okolí) o deratizaci hlodavců (Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.).

Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku

a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

– Aby se snížilo riziko sekundární otravy, provádějte v průběhu deratizace v častých intervalech vyhledávání a odstraňování

uhynulých hlodavců v souladu s doporučeními stanovenými v příslušném kodexu osvědčených postupů.

– Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou pulzní aplikace nástrahy.

Přípravky mohou být povoleny k použití při hubení pomocí trvalé aplikace nástrahy pouze na místech s vysokým potenciálem

opětovné invaze, pokud se ostatní metody regulace ukázaly jako nedostatečné.

trvalé aplikace nástrahy:

– Stálé umístění nástrah je striktně omezeno na místa s vysokým potenciálem opětovného zamoření v případě, že se jiné metody

regulace ukázaly jako nedostatečné.

– Strategie stálého umístění nástrah musí být pravidelně přezkoumávána v kontextu integrované ochrany proti škůdcům a posouzení rizika opětovného zamoření.

4.7.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Při umísťování deratizačních stanic v blízkosti povrchových vod (např. řek, rybníků, vodních kanálů, hrází, zavlažovacích nádrží) nebo drenážních systémů zajistěte, aby nedocházelo ke styku nástrahy s vodou.

4.7.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

4.7.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-viz kapitola 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

Široká veřejnost

- Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi.
- Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace (např. pasti).
- Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad).
- Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy.
- Deratizační staničky je třeba umístit v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory atd.)
- Pokud je to možné, musí být deratizační staničky připevněny k zemi nebo k jiným konstrukcím.
- Umístěte deratizační staničky mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných nečlověkových zvířat.
- Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu.
- Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou.
- Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.
- Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku.
- Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky."

Profesionální uživatelé:

- "– Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi.
- Před položením nástrahy proveďte průzkum zamořené oblasti a posouzení na místě a určete druh hlodavců, místa jejich aktivity a stanovte pravděpodobnou příčinu a rozsah zamoření.
- Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad).
- Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy.
- Přípravek by měl být používán pouze jako součást systému integrované ochrany proti škůdcům, který zahrnuje například hygienická opatření, a pokud je to možné, i fyzikální metody regulace.
- Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.
- Deratizační staničky by měly být umístěny v bezprostřední blízkosti míst, kde byla již dříve zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory atd.)
- Pokud je to možné, musí být deratizační staničky připevněny k zemi nebo k jiným konstrukcím.
- Deratizační staničky musí být zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticidy a že nesmí být přemísťovány ani otevírány (informace, které mají být uvedeny na etiketě, viz oddíl 5.3).
- [...] Je-li přípravek používán ve veřejných prostorách, měly by být ošetřené plochy po dobu deratizace označeny a poblíž nástrah musí být umístěno upozornění vysvětlující riziko primární nebo sekundární otravy antikoagulantem společně s uvedením opatření první pomoci v případě otravy.
- Nástrahu je třeba zajistit tak, aby ji nebylo možné z deratizační staničky odtáhnout.
- Umístěte přípravek mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných nečlověkových zvířat.
- Neumísťujte přípravek v blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu.
- [Pokud je to nezbytné na základě hodnocení rizik:
- Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku).
- V případě potřeby uveďte jakékoli jiné osobní ochranné pracovní prostředky (například ochranné brýle nebo masku), které jsou při manipulaci s přípravkem nutné.]
- Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.
- Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku.
- Pokud je požer nástrahy vzhledem ke zjevnému rozsahu zamoření nízký, zvažte přenesení deratizačních staniček na jiné místo a možnost přechodu na jinou formu nástrahy.
- Pokud po 35 dnech deratizace dochází i nadále k požívání nástrah a nezaznamenáte žádný pokles aktivity hlodavců, je nutné stanovit pravděpodobnou příčinu.
- Po vyloučení jiných možností je pravděpodobné, že hlodavci jsou rezistentní, zvažte tedy použití jiného než antikoagulačního rodenticidu, pokud je k dispozici, případně silnějšího antikoagulačního rodenticidu.
- Zvažte rovněž alternativní regulaci hlodavců pomocí pastí.
- Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky.

Odborně způsobilé osoby:

- "– Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi.
- Před položením nástrahy proveďte průzkum zamořené oblasti a posouzení na místě a určete druh hlodavců, místa jejich aktivity a stanovte pravděpodobnou příčinu a rozsah zamoření.
- Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad).
- Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy.

– Přípravek by měl být používán pouze jako součást systému integrované ochrany proti škůdcům, který zahrnuje například hygienická opatření, a pokud je to možné, i fyzikální metody regulace.

Přípravek je třeba rozmístit v bezprostřední blízkosti míst, kde byla již dříve zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezek, hnízdišť, výkrmů, děr, nor atd.)

– Pokud je to možné, musí být deratizační staničky připevněny k zemi nebo k jiným konstrukcím.

– Deratizační staničky musí být zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticidy a že nesmí být přemísťovány ani otevírány (informace, které mají být uvedeny na etiketě, viz oddíl 5.3).

[...] Je-li přípravek používán ve veřejných prostorách, měly by být ošetřené plochy po dobu deratizace označeny a poblíž nástrah musí být umístěno upozornění vysvětlující riziko primární nebo sekundární otravy antikoagulantem společně s uvedením opatření první pomoci v případě otravy.

– Nástrahu je třeba zajistit tak, aby ji nebylo možné z deratizační staničky odtáhnout.

– Umístěte přípravek mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat.

– Neumísťujte přípravek v blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu.

[Pokud je to nezbytné na základě hodnocení rizik:

Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku).

V případě potřeby uveďte jakékoli jiné osobní ochranné pracovní prostředky (například ochranné brýle nebo masku), které jsou při manipulaci s přípravkem nutné.]

Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku.

Četnost návštěv deratizované oblasti je na uvážení pracovníka, který by měl zohlednit průzkum provedený na začátku deratizace.

Tato frekvence by měla být v souladu s doporučeními stanovenými v příslušném metodickém pokynu pro provádění ochranné deratizace vydaném podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

– Pokud je požer nástrahy vzhledem ke zjevnému rozsahu zamoření nízký, zvažte přenesení deratizačních staniček na jiné místo a možnost přechodu na jinou formu nástrahy.

Pokud po 35 dnech deratizace dochází i nadále k požírání nástrah a nezaznamenáte žádný pokles aktivity hlodavců, je nutné stanovit pravděpodobnou příčinu.

Po vyloučení jiných možností je pravděpodobné, že hlodavci jsou rezistentní, zvažte tedy použití jiného než antikoagulačního rodenticidu, pokud je k dispozici, případně silnějšího antikoagulačního rodenticidu.

Zvažte rovněž alternativní regulaci hlodavců pomocí pastí.

Pokyny k použití, které jsou „specifické pro návnadu“:

Návnada v sáčcích z filtračního papíru: Neotvírejte sáčky obsahující návnadu.

Návnada v zásobnících či papírových krabicích: Neotevírejte kryt zásobníků a papírových krabic, které obsahují návnadu.

Podnosy s atraktivním gelem: Před aplikací odstraňte šedou hliníkovou fólii, přičemž bílou fólii nechte na podnose bez jejího otevření. Bílá fólie je aroma propustná, umožňuje hlodavcům najít rodenticid. Také zvyšuje bezpečnost aplikace, protože nedochází k expozici rodenticidům. Pokud by atraktivní gel vyschl, nalijte na něj cca. 50 ml vody. Když je voda absorbována, gel obnovuje svou původní konzistenci. Dávejte pozor, aby se granule nedostaly do vody. Gel se rehydratuje pouze v případě, že pelety, které chrání film jsou neporušené.

Atraktivní gel je směs, která není nebezpečná, podle výrobce a v souladu s nařízením č. 1272/2008 / ES.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Široká veřejnost

-Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

– Nepoužívejte antikoagulační rodenticidy jako stálé nástrahy (např. k prevenci zamoření hlodavci nebo k odhalení aktivity hlodavců).

Z informací o přípravku (tj. z etikety a/nebo příbalové informace) musí jasně vyplývat, že:

– přípravek je nutno používat v deratizačních staničkách přiměřeně odolných proti násilnému otevření (např. „určeno k použití pouze v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření“).

– uživatelé musí deratizační staničky řádně označit informacemi uvedenými v oddíle 5.3 souhrnu údajů o přípravku (například „označujte deratizační staničky v souladu s doporučeními uvedenými u přípravku“).

Při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení hlodavců do 35 dnů.

Informace o přípravku (tj. etiketa a/nebo příbalová informace) musí jasně doporučovat, aby si uživatel v případě, že má na konci deratizace podezření na nedostatečnou účinnost přípravku (tj. pokud stále pozoruje aktivitu hlodavců), vyžádal radu dodavatele přípravku nebo se obrátil na deratizační službu.

– V průběhu deratizace vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce, a to nejméně se stejnou frekvencí, s jakou kontrolujete deratizační staničky.

Uhynulé hlodavce likvidujte v souladu s místními požadavky .

Profesionální uživatelé:

"Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace případné osoby, které se vyskytují v blízkosti (například uživatele deratizované oblasti a jejího okolí) o deratizaci hlodavců

Tato frekvence by měla být v souladu s doporučeními stanovenými v příslušném metodickém pokynu pro provádění ochranné deratizace vydaném podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Aby se snížilo riziko sekundární otravy, v průběhu deratizace v častých intervalech (např. nejméně dvakrát týdně) vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce. [...].

– Přípravky se nesmí používat déle než 35 dnů bez vyhodnocení stavu zamoření a účinnosti deratizace.

– Nepoužívejte nástrahy obsahující antikoagulační účinné látky jako stálé nástrahy za účelem prevence zamoření hlodavci nebo sledování aktivity hlodavců.

Z informací o přípravku (tj. z etikety a/nebo příbalové informace) musí jasně vyplývat, že:

přípravek nesmí být dodáván široké veřejnosti (např. označení „pouze pro odborníky“).

– přípravek je nutno používat v deratizačních staničkách přiměřeně odolných proti násilnému otevření (např. „určeno k použití pouze v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření“).

– uživatelé musí deratizační staničky řádně označit informacemi uvedenými v oddíle 5.3 souhrnu údajů o přípravku (například „označujte deratizační staničky v souladu s doporučeními uvedenými u přípravku“).

Při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení hlodavců do 35 dnů.

Informace o přípravku (tj. etiketa a/nebo příbalová informace) musí jasně doporučovat, aby si uživatel v případě, že má na konci deratizace podezření na nedostatečnou účinnost přípravku (tj. pokud stále pozoruje aktivitu hlodavců), vyžádal radu dodavatele přípravku nebo se obrátil na deratizační službu.

– Mezi jednotlivými použitími neomývejte deratizační staničky vodou.

Uhynulé hlodavce likvidujte v souladu s místními požadavky [...]."

Odborně způsobilé osoby:

Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace případné osoby, které se vyskytují v blízkosti o deratizaci hlodavců [Tato frekvence by měla být v souladu s doporučeními stanovenými v příslušném metodickém pokynu pro provádění ochranné deratizace vydaném podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Informace o přípravku (tj. etiketa a/nebo příbalová informace) musí jasně uvádět, že přípravek se dodává pouze vyškoleným odborníkům, kteří vlastní osvědčení o splnění příslušných požadavků na vyškolení (např. „pouze pro odborně způsobilé osoby“).
- Nepoužívejte v místech, kde existuje podezření na rezistenci vůči účinné látce.
- Přípravky se nesmí používat déle než 35 dnů bez vyhodnocení stavu zamoření a účinnosti deratizace [...].
- Nepoužívejte střídavě různé antikoagulanty se srovnatelnou nebo slabší účinností, aby se nevytvořila rezistence.
- Při prostřídávání přípravků použijte rodenticidy, které nejsou antikoagulační, nebo silnější antikoagulant.
- Mezi jednotlivými aplikacemi neumývejte vodou deratizační staničky ani náčiní použité v zakrytých a chráněných místech s nástrahou.
- Uhynulé hlodavce likvidujte v souladu s místními požadavky [...].

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

- Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku.
- Při jeho požití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi něž může patřit krvácení z nosu a z dásní.
- V závažných případech se mohou vyskytnout i krevní výrony a ve stolici a moči se může objevit krev.
- Antidotum: Vitamin K1 podávaný pouze zdravotnickými / veterinárními pracovníky.
- V případě:
 - potřísnění pokožky omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem.
 - zasažení očí vypláchněte oči roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udrzte víčka otevřená po dobu nejméně 10 minut.
- Při orální expozici vypláchněte ústa pečlivě vodou.
- Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.
- Nevyvolávejte zvracení.
- V případě polknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte obal nebo etiketu přípravku .
- V případě požití domácím zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře .
- Deratizační staničky musí být označeny těmito informacemi: „nepřemísťujte a neotvírejte“; „obsahuje přípravek na hubení hlodavců“; „název přípravku nebo číslo povolení“; „účinná látka (účinné látky)“ a „v případě nehody zavolejte toxikologické středisko “.
- V případě potřeby kontaktujte:
 - Toxikologické informační středisko (TIS)
 - Klinika nemocí z povolání
 - Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
 - Telefon: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575, 24 hod. denně
 - e-mail: tis@.cesnet.cz
- Nebezpečný pro volně žijící zvířata.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci deratizace zlikvidujte nespotřebovanou nástrahu i obal v souladu s místními požadavky
Doporučuje se používat rukavice.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

-Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chraňte před přímým slunečním světlem.
– Skladujte na místech mimo dosah dětí, ptáků a domácích a hospodářských zvířat.
– Doba použitelnosti: 24 měsíců

6. Další informace

Vzhledem k jejich opožděnému působení jsou antikoagulační rodenticidy účinné 4 až 10 dnů po požití nástrahy.

Hlodavci mohou přenášet onemocnění.

Nedotýkejte se uhynulých hlodavců holýma rukama, při jejich likvidaci používejte rukavice nebo nástroje, jako jsou například kleště.

– Tento přípravek obsahuje hořkou látku a barvivo.