

# Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

**Nome do produto:** FANGA BLOC PMRA25

**Tipo(s) do produto:** TP 14 - Rodenticidas

TP 14 - Rodenticidas

TP 14 - Rodenticidas

TP 14 - Rodenticidas

TP 14 - Rodenticidas

TP 14 - Rodenticidas

**Número da autorização:** PT/DGS bbp-155/2019 e PT/DGS bbp-156/2019

**Número de referência do ativo  
R4BP 3:** PT-0021163-0000

## Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	3
2. Composição e formulação do produto	4
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	4
2.2. Tipo de formulação	4
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	4
4. Utilização(ões) autorizada(s)	5
4.1.1 Instruções específicas de utilização	6
4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas	6
4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	6
4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem	6
4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	6
4.2.1 Instruções específicas de utilização	7
4.2.2 Medidas de mitigação do risco específicas	8
4.2.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	8
4.2.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem	8
4.2.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	8
4.3.1 Instruções específicas de utilização	9
4.3.2 Medidas de mitigação do risco específicas	9
4.3.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	10
4.3.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem	10
4.3.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	10
4.4.1 Instruções específicas de utilização	11
4.4.2 Medidas de mitigação do risco específicas	11

4.4.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	11
4.4.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem	11
4.4.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	11
4.5.1 Instruções específicas de utilização	12
4.5.2 Medidas de mitigação do risco específicas	13
4.5.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	13
4.5.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem	13
4.5.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	13
4.6.1 Instruções específicas de utilização	14
4.6.2 Medidas de mitigação do risco específicas	14
4.6.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	14
4.6.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem	15
4.6.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	15
5. Orientações gerais para a utilização	15
5.1. Instruções de utilização	15
5.2. Medidas de redução do risco	17
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	18
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	18
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	18
6. Outras informações	18

## Informação administrativa

### 1.1. Nome comercial do produto

FANGA BLOC PMRA25

### 1.2. Titular da Autorização

<b>Nome e endereço do titular da autorização</b>	Nome	TRIPLAN SA
	Endereço	BP 258 LA POSTE FRANCAISE AD500 ANDORRA LA VELLA França
<b>Número da autorização</b>	PT/DGS bbp-155/2019 e PT/DGS bbp-156/2019	
<b>Número de referência do ativo R4BP 3</b>	PT-0021163-0000	
<b>Data da autorização</b>	12/07/2019	
<b>Data de caducidade da autorização</b>	31/12/2022	

### 1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

<b>Nome do fabricante</b>	SOFAR FRANCE
<b>Endereço do fabricante</b>	ZA DU DREVERS BP 02 29190 PLEYBEN França
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	ZA DU DREVERS BP 02 29190 PLEYBEN França
<b>Nome do fabricante</b>	AEDES PROTECTA
<b>Endereço do fabricante</b>	75 rue d'Orgemont 95210 SAINT-GRATIEN França
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	LIEU DIT DOUILLAC 81310 PARISOT França

<b>Nome do fabricante</b>	IRIS
<b>Endereço do fabricante</b>	1126A, Avenue du Moulinas, Route de Saint-Privat 30340 SALINDRES França
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	1126A, Avenue du Moulinas, Route de Saint-Privat 30340 SALINDRES França

<b>Nome do fabricante</b>	HDA
<b>Endereço do fabricante</b>	ZA LA CHARME MENETROL 63200 RIOM França
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	ZA LA CHARME MENETROL 63200 RIOM França

<b>Nome do fabricante</b>	NOXIMA
<b>Endereço do fabricante</b>	CARREFOUR JEAN MONNET - LA CROIX-SAINT OUEN 60201 COMPIEGNE França
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	CARREFOUR JEAN MONNET - LA CROIX-SAINT OUEN 60201 COMPIEGNE França

<b>Nome do fabricante</b>	INDUSTRIALCHIMICA SRL
<b>Endereço do fabricante</b>	VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE (PD) Itália
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE (PD) Itália

<b>Nome do fabricante</b>	RATOUCY SAS
<b>Endereço do fabricante</b>	29 Rue de la Forêt LOOZE - BP 145 89303 JOIGNY CEDEX França
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	29 Rue de la Forêt 89303 LOOZE França

<b>Nome do fabricante</b>	FARMAVIT OOD
<b>Endereço do fabricante</b>	Bul Tsar Boris III, n°63, Office n°1 1612 SOFIA Bulgária
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Industrialna str 2. - Pleven District 5960 GULIANTSI Bulgária

<b>Nome do fabricante</b>	PROFARM SA
<b>Endereço do fabricante</b>	Industrial Area of Thessaloniki, Entrance A, O.T. 20, Buildings 30 and 53 57022 SINDOS Grécia
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Industrial Area of Thessaloniki, Entrance A, O.T. 20, Buildings 30 and 53 57022 SINDOS Grécia

<b>Nome do fabricante</b>	EDIALUX
<b>Endereço do fabricante</b>	ZA MACON EST 01750 REPLONGES França
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	EDIALUX BRETAGNE - ZA DE KERAMPAOU 29140 MELGVEN França

<b>Nome do fabricante</b>	FARMACHEM
<b>Endereço do fabricante</b>	Industrial Area of Sindos P.O. BOX 1026 Block 53 Zone C 57022 THESSALONIKI Grécia
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Industrial Area of Sindos P.O. BOX 1026 Block 53 Zone C 57022 THESSALONIKI Grécia

<b>Nome do fabricante</b>	AGGRESS
<b>Endereço do fabricante</b>	EL. VENIZELOU 158 A 16341 ATHENS Grécia
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	ARMA THEBES 32200 VOIOTIA Grécia

<b>Nome do fabricante</b>	AGROLOGY SA
<b>Endereço do fabricante</b>	P.O. BOX 1089 Industrial Area of Thessaloniki 57022 THESSALONIKI Grécia
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	P.O. BOX 1089 Industrial Area of Thessaloniki 57022 THESSALONIKI Grécia

#### 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

<b>Substância ativa</b>	11 - Brodifacume
<b>Nome do fabricante</b>	Activa S.r.l
<b>Endereço do fabricante</b>	via Feltre, 32 20132 Milano Itália
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Itália

## 2. Composição e formulação do produto

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Brodifacume	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Substância ativa	56073-10-0	259-980-5	0.0025

### 2.2. Tipo de formulação

RB - Isco (pronto a usar)
---------------------------

## 3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

<b>Advertências de perigo</b>	"Pode afectar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida ."
<b>Recomendações de prudência</b>	<p>Manter fora do alcance das crianças.</p> <p>EM CASO DE INGESTÃO:Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.</p> <p>EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição:Consulte um médico.</p> <p>Eliminar o conteúdo em acordo com os regulamentos nacionais.</p>

## 4. Utilização(ões) autorizada(s)

### 4.1 Descrição do uso

#### Utilização 1 - Ratos domésticos – profissionais – interior

<b>Tipo de produto</b>	TP 14 - Rodenticidas
<b>Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada</b>	Não relevante para rodenticidas
<b>Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)</b>	Mus musculus-House mouse-Juvenis por exemplo. roedores Mus musculus-House mouse-Adultos Insetos, mamíferos (por exemplo roedores)
<b>Campos de utilização</b>	Interior Interior
<b>Método(s) de aplicação</b>	Aplicação de isco - Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis
<b>Frequência de aplicação e dosagem</b>	20 g - 40 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros - 0,0025 -  20 g - 40 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros
<b>Categoria(s) de utilizadores</b>	Profissional
<b>Capacidade e material da embalagem</b>	Peso de pacote mínimo de 1,5 Kg com um peso máximo de 25Kg por saco (contendo isco rodenticida de 10-20g em blocos de cera)  Material de embalagem: PE/Alumino/Poliester



--

#### 4.1.1 Instruções específicas de utilização

As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

#### 4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

--

#### 4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- Ao colocar estações de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com a água.

#### 4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

--

#### 4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

--

#### 4.2 Descrição do uso

##### Utilização 2 - Ratazanas (ratos) – profissionais – interior

Tipo de produto

TP 14 - Rodenticidas

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Não relevante para rodenticidas

<b>Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)</b>	Rattus norvegicus-Brown rat-Juvenis por exemplo. roedores Rattus norvegicus-Brown rat-Adultos Insetos, mamíferos (por exemplo roedores)
<b>Campos de utilização</b>	Interior interior
<b>Método(s) de aplicação</b>	Aplicação de isco - Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis.
<b>Frequência de aplicação e dosagem</b>	100 g - 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros - 0,0025 - 100 g - 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros
<b>Categoria(s) de utilizadores</b>	Profissional
<b>Capacidade e material da embalagem</b>	Peso de pacote mínimo de 1,5 Kg com um peso máximo de 25Kg por saco  Peso de pacote mínimo de 1,5 Kg com um peso máximo de 25Kg por saco (contendo isco rodenticida de 10-20g em blocos de cera) Material de embalagem: PE/Alumino/Polie  Packaging material: PE/Aluminium/Polyester

#### 4.2.1 Instruções específicas de utilização

As estações de isco devem ser visitadas apenas 5 ou 7 dias após o início do tratamento e, posteriormente, pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

#### 4.2.2 Medidas de mitigação do risco específicas

--

#### 4.2.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ao colocar estações de isco nas imediações de sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com a água.

#### 4.2.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

--

#### 4.2.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

--

#### 4.3 Descrição do uso

##### Utilização 3 - Ratos domésticos e/ou ratazanas (ratos) – profissionais – exterior em redor de edifícios

<b>Tipo de produto</b>	TP 14 - Rodenticidas
<b>Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada</b>	Não relevante para rodenticidas
<b>Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)</b>	Mus musculus-House mouse-Juvenis por exemplo. roedores Mus musculus-House mouse-Adultos Insetos, mamíferos (por exemplo roedores) Rattus norvegicus-Brown rat-Juvenis por exemplo. roedores Rattus norvegicus-Brown rat-Adultos Insetos, mamíferos (por exemplo roedores)
<b>Campos de utilização</b>	Exterior  exterior em redor de edifícios
<b>Método(s) de aplicação</b>	Aplicação de isco - Isco pronto a utilizar em estações de isco invioláveis

**Frequência de aplicação e dosagem**

Mus musculus (ratos domésticos): 20 – 40 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros  
Rattus norvegicus (rato castanho): 100 g - 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros - 0,0025 -

Mus musculus (ratos domésticos): 20 – 40 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros

Rattus norvegicus (rato castanho): 100 g - 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros

**Categoria(s) de utilizadores**

Profissional

**Capacidade e material da embalagem**

Peso de pacote mínimo de 1,5 Kg com um peso máximo de 25Kg por saco (contendo isco rodenticida de 10-20g em blocos de cera)

Material de embalagem: PE/Alumino/Poliéster

**4.3.1 Instruções específicas de utilização**

- Proteger o isco das condições atmosféricas (por exemplo, chuva, neve, etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.

- As estações de isco devem ser visitadas [no caso de ratos - pelo menos, 2 a 3 dias no] [no caso de ratazanas - apenas 5 a 7 dias após o] início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar os corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

- Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

**4.3.2 Medidas de mitigação do risco específicas**

Não aplicar este produto diretamente nas tocas

### 4.3.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ao colocar estações de isco nas imediações de águas de superfície (por exemplo, rios, lagos, canais de água, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de águas, certificar-se de que é evitado o contacto do isco com água.

### 4.3.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

### 4.3.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

## 4.4 Descrição do uso

### Utilização 4 - Ratos domésticos – público em geral – interior

<b>Tipo de produto</b>	TP 14 - Rodenticidas
<b>Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada</b>	Não relevante para rodenticidas
<b>Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)</b>	Mus musculus-House mouse-Juvenis por exemplo. roedores Mus musculus-House mouse-Adultos Insetos, mamíferos (por exemplo roedores)
<b>Campos de utilização</b>	Interior Interior
<b>Método(s) de aplicação</b>	Aplicação de isco - Isco pronto a utilizar [em saquetas para isco solto] para utilização em estações de isco invioláveis.
<b>Frequência de aplicação e dosagem</b>	20 g - 40 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros - 0,0025 - 20 g - 40 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros

**Categoria(s) de utilizadores**

Público em geral (não profissional)

**Capacidade e material da embalagem**

Peso de pacote máximo de 300g (contendo isco rodenticida de 10-20g em blocos decera)Material de embalagem.

PE/Alumino/Poliester

#### **4.4.1 Instruções específicas de utilização**

As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário

#### **4.4.2 Medidas de mitigação do risco específicas**

#### **4.4.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

#### **4.4.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

#### **4.4.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

#### 4.5 Descrição do uso

##### Utilização 5 - Ratazanas (ratos) – público em geral – interior

<b>Tipo de produto</b>	TP 14 - Rodenticidas
<b>Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada</b>	Não relevante para rodenticidas
<b>Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)</b>	Rattus norvegicus-Brown rat-Juvenis por exemplo. roedores Rattus norvegicus-Brown rat-Adultos Insetos, mamíferos (por exemplo roedores)
<b>Campos de utilização</b>	Interior interior
<b>Método(s) de aplicação</b>	Aplicação de isco - Isco pronto a utilizar [em saquetas para isco solto] para utilização em estações de isco invioláveis.
<b>Frequência de aplicação e dosagem</b>	100 g - 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros. - 0,0025 - 100 g - 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros.
<b>Categoria(s) de utilizadores</b>	Público em geral (não profissional)
<b>Capacidade e material da embalagem</b>	Peso de pacote máximo de 300g (contendo isco rodenticida de 10-20g em blocos decera)Material de embalagem.  PE/Alumino/Poliester

#### 4.5.1 Instruções específicas de utilização

As estações de isco devem ser visitadas apenas 5 ou 7 dias após o início do tratamento e, posteriormente, pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceito, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.

#### 4.5.2 Medidas de mitigação do risco específicas

#### 4.5.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

#### 4.5.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

#### 4.5.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

#### 4.6 Descrição do uso

##### Utilização 6 - Ratazanas (ratos) – público em geral – exterior em redor de edifícios

<b>Tipo de produto</b>	TP 14 - Rodenticidas
<b>Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada</b>	Não relevante para rodenticidas
<b>Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)</b>	Rattus norvegicus-Brown rat-Juvenis por exemplo. roedores Rattus norvegicus-Brown rat-Adultos Insetos, mamíferos (por exemplo roedores)
<b>Campos de utilização</b>	Exterior  exterior em redor de edifícios
<b>Método(s) de aplicação</b>	Aplicação de isco - Isco pronto a utilizar [em saquetas para isco solto] para utilização em estações de isco invioláveis.



<b>Frequência de aplicação e dosagem</b>	100 g - 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros. - 0,0025 - 100 g - 200 g de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros.
<b>Categoria(s) de utilizadores</b>	Público em geral (não profissional)
<b>Capacidade e material da embalagem</b>	Peso de pacote máximo de 300g (contendo isco rodenticida de 10-20g em blocos decera)Material de embalagem.  PE/Alumino/Poliester

#### 4.6.1 Instruções específicas de utilização

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.</li> <li>- Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.</li> <li>- As estações de isco devem ser visitadas apenas 5 ou 7 dias após o início do tratamento e, posteriormente, pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para retirar corpos de roedores. Recarregar o isco quando necessário.</li> </ul>
--

#### 4.6.2 Medidas de mitigação do risco específicas

--

#### 4.6.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

--

**4.6.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

--

**4.6.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

--

## **5. Orientações gerais para a utilização**

### **5.1. Instruções de utilização**

#### Profissionais:

- Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda.
  - Efetuar uma inspeção preliminar da área infestada e uma avaliação no local a fim de identificar as espécies de roedores e os seus locais de atividade e determinar a causa provável e a dimensão da infestação.
  - Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares).
  - Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que tal apenas perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.
  - O produto deve ser utilizado apenas como parte de um sistema de gestão integrada de pragas, incluindo, nomeadamente, medidas de higiene e, se possível, métodos físicos de controlo.
  - Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.
  - As estações de isco devem ser colocadas na vizinhança imediata de locais onde tenha sido observada anteriormente atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.).
  - Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.
  - Os rótulos das estações de isco devem mostrar claramente que as estações contêm rodenticidas e que não devem ser movidas ou abertas.
  - Quando o produto for utilizado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve existir junto aos iscos um aviso explicativo do risco de envenenamento primário ou secundário através do anticoagulante, bem como a indicação das primeiras medidas a tomar em caso de envenenamento.
  - O isco deve ser protegido de modo a não poder ser arrastado da estação de isco.
  - Colocar o produto fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia e de criação e outros animais não visados.
  - Colocar o produto longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.
- [Quando exigido pela avaliação do risco:

- Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos durante a fase de manuseamento do produto (o material das luvas deve ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto)

- Se for caso disso, especificar qualquer outro equipamento de proteção individual (por exemplo, óculos ou máscara) exigido para o manuseamento do produto]

- Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar.
- Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto.
- Se a dosagem do isco for baixa relativamente à dimensão aparente da infestação, considerar a colocação de estações de isco em locais e a possibilidade de mudar para outra formulação de isco.
- Se, após um período de tratamento de 35 dias, os iscos continuarem a ser consumidos e não se registar um declínio na atividade dos roedores, a causa provável deve ser determinada.
- Nos casos em que tenham sido excluídos outros elementos, é provável que existam roedores resistentes, pelo que deve ser considerada a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se possível, ou de um rodenticida anticoagulante mais potente.
- Considerar ainda a utilização de ratoeiras como uma medida de controlo alternativa.
- Remover o isco restante ou as estações de isco no final do período de tratamento.

#### Público em geral

- Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda.
- Antes da utilização de produtos rodenticidas, deve ser tida em conta a utilização de métodos de controlo não químicos (por exemplo, ratoeiras).
- Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares).
- Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, uma vez que tal apenas perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.
- As estações de isco devem ser colocadas na vizinhança imediata de locais onde foi observada atividade de roedores (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, explorações de criação, buracos, tocas, etc.).
- Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.
- [Não abrir as saquetas que contêm o isco - quando relevante para a formulação do isco no produto].
- Colocar as estações de isco fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia, animais de criação e outros animais

não visados.

- Colocar as estações de isco longe de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.
- Não colocar as estações de isco na proximidade de sistemas de drenagem de águas onde possam entrar em contacto com água.
- Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar.
- Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto.
- Remover o isco restante ou as estações de isco no final do período de tratamento

## 5.2. Medidas de redução do risco

Profissionais:

- Sempre que possível, antes do tratamento, informar os possíveis transeuntes (por exemplo, utilizadores da área tratada e das suas mediações) sobre a campanha de controlo de roedores [em conformidade com o código de boas práticas aplicável, se existir].
- Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover roedores mortos a intervalos frequentes durante o tratamento (por exemplo, pelo menos, duas vezes por semana). [...].
- Os produtos não devem ser utilizados durante mais de 35 dias sem uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento.
- Não utilizar iscos que contenham substâncias ativas anticoagulantes como iscos permanentes para a prevenção de infestações de roedores ou para a monitorização de atividades de roedores.
- A informação do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem mostrar claramente que:
  - O produto não deve ser fornecido ao público em geral (por exemplo, «reservado a profissionais»).
  - O produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis adequadas (por exemplo, «utilizar apenas em estações de isco invioláveis»).
- Os utilizadores devem rotular adequadamente as estações de isco com as informações referidas na secção 5.3 do Resumo das Características do Produto (SPC) (por exemplo, «rotular as estações de isco em conformidade com as recomendações do produto»).
- Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias.
- As informações do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem recomendar claramente que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, ainda é observável atividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço de controlo de pragas.
- Não lavar as estações de isco com água entre as aplicações.
- Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais [...].

Público em geral

- Ponderar a aplicação de medidas de controlo preventivas (tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas, tanto quanto possível) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.
- Não utilizar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes (por exemplo, para prevenção de infestação ou para detetar atividade de roedores).
- A informação do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem mostrar claramente que:
  - O produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis adequadas (por exemplo, «utilizar apenas em estações de isco invioláveis»).
  - Os utilizadores devem rotular adequadamente as estações de isco com as informações referidas na secção 5.3 do Resumo das Características do Produto (SPC) (por exemplo, «rotular as estações de isco em conformidade com as recomendações do produto»).
- Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias.
- As informações do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem recomendar claramente que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, ainda é observável atividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço de controlo de pragas.
- Procurar e remover roedores mortos durante o tratamento, pelo menos, com a mesma frequência das inspeções às estações de isco.
- Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais [...].

### 5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- Este produto contém uma substância anticoagulante.
- Em caso de ingestão, os sintomas (que podem demorar a manifestar-se) podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas.
- Em casos graves, podem surgir hematomas e presença de sangue nas fezes ou na urina.
  
- Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário.
- Em caso de:
  - Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.
  - Exposição ocular, lavar os olhos com água ou solução para lavar os olhos, manter as pálpebras abertas durante, pelo menos, 10 minutos.
  - Exposição oral, lavar cuidadosamente a boca com água.
- Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
- Não provocar o vômito.
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar o recipiente ou o rótulo do produto [...].
- Contactar um cirurgião veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia [...].
- As estações de isco devem ser rotuladas com as informações seguintes: «não mover ou abrir»; «contém um rodenticida»; «nome do produto ou número de autorização»; «substância(s) ativa(s)» e «em caso de incidente, contactar um centro de informação antivenenos [...]».
- Perigoso para a vida selvagem.

### 5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

No final do tratamento, eliminar o isco não consumido e a embalagem, em conformidade com os requisitos locais [...]. Recomenda-se a utilização de luvas

### 5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

- Armazenar num local seco, fresco e bem ventilado. Manter o recipiente fechado e ao abrigo da luz solar direta.
- Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação.
- Prazo de validade: 2 ano

## 6. Outras informações

- Devido ao seu modo de ação retardado, os rodenticidas anticoagulantes demoram 4 a 10 dias a ser eficazes após o consumo do isco.
- Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar em roedores mortos com as mãos nuas, utilizar luvas ou utilizar ferramentas (por exemplo, pinças) ao eliminá-los.

- Este produto contém um agente amargo e um corante.[...] A embalagem do produto foi testada quanto à segurança para as crianças