

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: Klerat Wax Blocks

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

 Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

 Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

 Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

 Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Loa number: EE-NAMR2015-0055

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0009919-0000

Sisukord

Haldusteave	1
1.1. Toote kaubanduslikud nimetused	1
1.2. Loaomanik	1
1.3. Biotsiidide tootja(d)	1
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	1
2. Toote koostis ja olek	2
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed	2
2.2. Oleku kirjeldus	2
3. Ohu- ja hoiatuslaused	2
4. Lubatud kasutusala(d)	3
5. Üldised kasutamisharjutused	12
5.1. Kasutusjuhendid	12
5.2. Riskivähendamismeetmed	12
5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras	13
5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	13
5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	14
6. Muu teave	14

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

Klerat Vahaplokid
Talon Vahaplokid

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Syngenta Crop Protection AG
	Aadress	Rosentalstrasse 67 4058 Basel Šveits
Loa number	EE-NAMR2015-0055	
Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber	EE-0009919-0000	
Loa andmise kuupäev	08/05/2015	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	01/07/2024	

1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd
Tootja aadress	Szállás u.6 1107 Budapest Ungari
Tootmiskohtade asukoht	Dr. Köves János u. 3 2943 Bábolna Ungari

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine

11 - Brodifaakum

Tootja nimi

Syngenta Crop Protection AG

Tootja aadress

Rosentalstrasse 67 4058 Basel Šveits

Tootmiskohtade asukoht

Aurorium UK Ltd., Hale Bank WA8 8NS Widnes Ühendkuningriik

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Brodifaakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Toimeaine	56073-10-0	259-980-5	0,005

2.2. Oleku kirjeldus

RB - Sööt (kasutusvalmis)

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Võib kahjustada loodet.

Võib kahjustada elundeid (veri) pikaajalisel või korduval kokkupuutel .

Hoiatuslaused

Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist.

Kanda kaitsekindaid.

Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral:Pöörduda arsti poole.

Hoida lukustatult.

Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - Kasutusala 1 - Koduhiired ja/või rotid - Kutselised kasutajad - siseruumis

Tooteliik

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Ei kohaldu rodentitsiididele.

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus
Tavanimetus: Rändrott
Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid

Teaduslik nimetus: Rattus rattus
Tavanimetus: Must- ehk kodurott
Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid

Teaduslik nimetus: Mus musculus
Tavanimetus: Koduhiir
Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid

Kasutuskohat

Sisetingimustes

Siseruumis

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Kasutamine söödana
Üksikasjalik kirjeldus:
Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: Rotid: 1-3 plokki (20-60g) mürksööt söödamaja kohta; Koduhiired: 1 plokk (20g) mürksööt söödamaja kohta
Lahjendus (%):
Kasutamise arv ja ajastus:

Rotid

1-3 plokki (20-60g) mürksööt söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit näriliste kõrge arvukuse korral ja 10 meetrit madala arvukuse korral.

Hiiired

1 plokk (20g) mürksööt söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 2 meetrit näriliste kõrge arvukuse korral ja 5 meetrit madala arvukuse korral.

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Pakendi suurus 3 kg, 5 kg, 10 kg.
Lahtised vahaplokid pakendatud PP/PE tuubi või nõusse.

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata [hiirte puhul – vähemalt iga kahe-kolme päeva tagant] [rottide puhul – alles viie kuni seitsme päeva möödumisel] ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on kasutatud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürksööta.
- Mitte kasutada toodet pidevalt väljapandava mürksöödana näriliste leviku ennetamiseks või nende elutegevuse jälgimiseks.
- Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürksöödana.
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata punkti 5.2.

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette.

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata punkti 5.4.

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata punkti 5.5.

4.2 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 2 - Kasutusala 2 - Koduhiired ja/või rotid - Kutselised kasutajad - väliskeskkonnas hoonete ümber

Tooteliik

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei kohaldu rodentitsiididele.
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid Teaduslik nimetus: Rattus rattus Tavanimetus: Must- ehk kodurott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid
Kasutuskoh	Välitingimustes Väliskeskkonnas hoonete ümber
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas.
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: Rotid: 1-3 plokki (20-60g) mürksööta söödamaja kohta; Koduhiired: 1 plokk (20g) mürksööta söödamaja kohta Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus: Rotid 1-3 plokki (20-60g) mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit näriliste kõrge arvukuse korral ja 10 meetrit madala arvukuse korral. Hiiired 1 plokk (20g) mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 2 meetrit näriliste kõrge arvukuse korral ja 5 meetrit madala arvukuse korral.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Pakendi suurus 3 kg, 5 kg, 10 kg. Lahtised vahaplokid pakendatud PP/PE tuubi või nõusse.

4.2.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Kaitsta mürksööta ilmastikuolude (nt vihm, lumi jne) eest. Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust.
- Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata [hiirte puhul – vähemalt iga kahe-kolme päeva tagant] [rottide puhul – alles viie kuni seitsme päeva möödumisel] ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on kasutatud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürksööta.

- Vahetada söödamajas olev mürksööd välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu.
- Mitte kasutada toodet pidevalt väljapandava mürksöödana näriliste leviku ennetamiseks või nende elutegevuse jälgimiseks.
- Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürksöödana.
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.

4.2.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Mitte asetada toodet otse urgu.

4.2.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Söödamajade asetamisel veekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette.

4.2.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata punkti 5.4.

4.2.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata punkti 5.5

4.3 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 3 - Kasutusala 3 - Koduhiired ja/või rotid - Kutselised kahjulike organismide tõrjujad - siseruumis

Tooteliik

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Ei kohaldu rodentitsiididele.

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus
Tavanimetus: Rändrott
Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid

Teaduslik nimetus: Rattus rattus
Tavanimetus: Must- ehk kodurott
Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid

	Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid
Kasutuskoh	Sisetingimustes Siseruumis
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas. Kaetud ja kaitstud söödapunktid.
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: Rotid: 1-3 plokki (20-60g) mürksööta söödamaja kohta; Koduhiired: 1 plokk (20g) mürksööta söödamaja kohta Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus: Rotid 1-3 plokki (20-60g) mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit näriliste kõrge arvukuse korral ja 10 meetrit madala arvukuse korral. Hiired 1 plokk (20g) mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 2 meetrit näriliste kõrge arvukuse korral ja 5 meetrit madala arvukuse korral.
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Pakendi suurus 3 kg, 5 kg, 10 kg. Lahtised vahaplokkid pakendatud PE/PP tuubi või nõusse.

4.3.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Eemaldada kasutamata mürksööt tõrje lõpus.
- Asendada söödud mürksööt alles 3 päeva pärast ning edaspidi maksimaalselt 7 päevase intervalliga.
- Koguda sööda jäägid ja surnud närilised.
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.

4.3.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva hea tavaga, kui see on olemas].

- Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust.
- Teisese mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant kooskõlas asjaomase hea tava kohaste soovitusetega.
- Mitte kasutada toodet pidevalt väljapandava mürksöödana näriliste leviku ennetamiseks või nende elutegevuse jälgimiseks.

4.3.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette.

4.3.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata punkti 5.4.

4.3.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata punkti 5.5.

4.4 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 4 - Kasutusala 4 - Koduhiired ja/või rotid - Kutselised kahjulike organismide tõrjujad - väliskeskkonnas hoonete ümber

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei kohaldu rodentitsiididele.
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid Teaduslik nimetus: Rattus rattus Tavanimetus: Must- ehk kodurott Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid
Kasutuskohat	Välitingimustes Väliskeskkonnas hoonete ümber
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas. Kaetud ja kaitsud söödapunktid. Kasutusvalmis mürksööt otse urgu asetamiseks.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: Rotid: 1-3 plokki (20-60g) mürksööta söödamaja kohta; Koduhiired: 1 plokk (20g) mürksööta söödamaja kohta
Lahjendus (%):
Kasutamise arv ja ajastus:

Rotid

1-3 plokki (20-60g) mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit näriliste kõrge arvukuse korral ja 10 meetrit madala arvukuse korral.
1-3 plokki (20-60g) mürksööta uru kohta.

Hiired

1 plokk (20g) mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 2 meetrit näriliste kõrge arvukuse korral ja 5 meetrit madala arvukuse korral.

Kasutajarühm(ad)

Väljaõppe saanud kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Pakendi suurus 3 kg, 5 kg, 10 kg.
Lahtised vahaplokid pakendatud PE/PP tuubi või nõusse.

4.4.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Kaitsta mürksööta ilmastikuolude eest. Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust.
- Vahetada söödamajas olev mürksööt välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu.
- Eemaldada kasutamata mürksööt tõrje lõpus (va kui mürksööt on asetatud otse urgu).
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.
- Väliskeskkonnas kasutamisel katta ja asetada söödakohad strateegilistesse kohtadesse, et vähendada kokkupuudet mitesihtloomadega.
- Mürksööt paigutada selliselt, et vähendada kokkupuudet mitesihtloomade ja lastega. Katta või blokeerida mürksööda varustatud urgude sissekäigud, et vähendada mürksööda tarvitamata jätmise või laiali tassimise ohtu.
- Asendada söödud mürksööt alles 3 päeva pärast ning edaspidi maksimaalselt 7 päevase intervalliga. Koguda mürksööda jäägid ja surnud närilised.

4.4.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva hea tavaga, kui see on olemas].
- Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote taritamist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust.
- Teisese mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant kooskõlas asjaomase hea tava kohaste soovitusetega.
- Mitte kasutada toodet pidevalt väljapandava mürksöödana näriliste leviku ennetamiseks või nende elutegevuse jälgimiseks.

4.4.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Söödamajade asetamisel veekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette.

4.4.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata punkti 5.4.

4.4.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata punkti 5.5.

4.5 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 5 - Kasutusala 5 - Rotid - Kutselised kahjulike organismide tõrjujad - kanalisatsioon

Tooteliik

Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Ei kohaldu rodentitsiididele.

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus
Tavanimetus: Rändrott
Arengustaadium: Täiskasvanud ja noorukid

Kasutuskoh

Muu

Kanalisatsioon

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Kasutamine söödana
Üksikasjalik kirjeldus:
Kasutusvalmis mürksööt kinnitada või asetada söödamajadesse nii, et see ei puutuks reoveega kokku.
Kaetud ja kaitstud söödapunktid.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: Rotid: 1-10 plokki (20-200 g) kanalisatsioonikaevu kohta.
Lahjendus (%):
Kasutamise arv ja ajastus:

Rotid

1-10 plokki (20-200 g) kanalisatsioonikaevu kohta.

Kasutajarühm(ad)

Väljaõppe saanud kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Minimaalne lubatud müügipakend 3 kg. Pakendi suurus 3 kg, 5 kg, 10 kg. Lahtised vahaplokid pakendatud PE/PP tuubi või nõusse.

4.5.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Mürksööt paigutada nii, et see ei puutuks kokku veega ega seda uhutaks minema.
- Järgida asjaomase hea tava kohaseid lisajuhiseid.

4.5.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- [Kui riiklik seadusandlus seda nõuab] Asetada mürksööt ainult sellistesse kanalisatsioonisüsteemidesse, mis on ühendatud reoveepuhastiga.
- Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürksöödana.

4.5.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata punkti 5.3.

4.5.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata punkti 5.4.

4.5.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalses ladustamistingimustes.

Vaadata punkti 5.5.

5. Üldised kasutamishüpsid

5.1. Kasutusjuhendid

Kutselised kahjulike organismide tõrjujad

1. Enne kasutamist lugeda tooteinfot ja muud tootele lisatud või müügikohas antud teavet ning järgida seda.
 2. Enne kahjuritõrje alustamist uurida levikuala ja läbi viia kontroll, et määrata kindlaks näliliste liigid, nende elutegevuse kohad ning leviku tõenäoline põhjus ja ulatus.
 3. Eemaldada nälilistele kättesaadav toit (nt mahapudenenuv vili või toidujäätmel). Kui eelnev välja arvata, mitte puhastada levikuala vahetult enne tõrje tegemist, sest see häirib näliliste populatsiooni ja vähendab mürksööda atraktiivsust.
 4. Toodet tuleb kasutada ainult osana integreeritud kahjuritõrje programmist (IPM), kuhu kuuluvad muu hulgas hügieenimeetmed ja võimaluse korral füüsilised ohjemeetmed.
 5. Toode tuleb paigutada nende kohtade vahetuslähedusse, kus on märgatud näliliste elutegevust (nt liikumisteed, pesitsuskohad, söödaplatsid, augud, urud jne).
 6. Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinnale või konstruktsioonide külge.
 7. Söödamajad tuleb selgelt märgistada, et oleks selge, et need sisaldavad näliliste tõrjevahendit ning neid ei tohi liigutada ega avada (vt jaotis 5.3 etiketile märgitava teabe kohta).
 8. Kui toodet kasutatakse avalikes kohtades, tuleb tõrjealad märgistada ning mürksöödade juurde tuleb paigaldada teave antikoagulantist tingitud esmase või teisese mürgistuse ohu kohta ja kirjeldada mürgistuse korral võetavaid esmaabimeetmeid.
 9. Mürksööti kinnitada nii, et seda ei saaks söödamajast eemaldada.
 10. Asetada toode lastele, lindudele, lemmikloomadele, kodu- ja muudele mittesihthloomadele kättesaamatusse kohta.
 11. Asetada toode eemale toidust, joogist ja loomasöödast, samuti nendega kokkupuutuvatest nõudest või pindadest.
 12. Toote käitlemisel mitte süüa, juua ega suitsetada. Peale toote käitlemist pesta käed ja otseselt kokku puutunud nahapind.
 13. Tõrjealale mineku sageduse otsustab töötaja vastavalt tõrje alguses tehtud uurimisele. Kohti, kus mürksööti on asetatud urgudesse, tuleb kontrollida tihedamalt, kui neid kohti, kus on kasutatud muukimiskindlaid söödamaju. See sagedus peab vastama asjaomase hea tava kohastele soovitusetele.
 14. Kui mürksööti tarvitatakse vähe võrreldes arvukusega, kaaluda söödamajade ümberpaigutamist ja võimalust vahetada mürksööti teise koostisega mürksööda vastu.
 15. Kui pärast 35 päevase tõrje möödumist jätkub mürksööda tarvitamine ning näliliste tegevuse vähenemist ei ole märgata, tuleb kindlaks teha selle tõenäoline põhjus.
- Kui muud põhjused on välistatud, on tõenäoline, et nälilised on resistentsed, mistõttu tuleb kaaluda mitte-antikoagulantse rodentitsiidi või mõne teise antikoagulantse toimega rodentitsiidi kasutamist. Samuti kaaluda alternatiivse ohjemeetmena lõksude kasutamist.

Kutselised kasutajad

1. Enne kasutamist lugeda tooteinfot ja muud tootele lisatud või müügikohas antud teavet ning järgida seda.
2. Enne kahjuritõrje alustamist uurida levikuala ja läbi viia kontroll, et määrata kindlaks näliliste liigid, nende elutegevuse kohad ning leviku tõenäoline põhjus ja ulatus.
3. Eemaldada nälilistele kättesaadav toit (nt mahapudenenuv vili või toidujäätmel). Kui eelnev välja arvata, mitte puhastada levikuala vahetult enne tõrje tegemist, sest see häirib näliliste populatsiooni ja vähendab mürksööda atraktiivsust.
4. Toodet tuleb kasutada ainult osana integreeritud kahjuritõrje programmist (IPM), kuhu kuuluvad muu hulgas hügieenimeetmed ja võimaluse korral füüsilised ohjemeetmed.
5. Võtta kasutusele ennetavad tõrjemeetmed (sulgeda avad, eemaldada kättesaadav toit ja jook võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada sissetungi kordumise tõenäosust.
6. Söödamajad tuleb paigutada nende kohtade vahetuslähedusse, kus on märgatud näliliste elutegevust (nt liikumisteed, pesitsuskohad, söödaplatsid, augud, urud jne).
7. Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinnale või konstruktsioonide külge.
8. Söödamajad tuleb selgelt märgistada, et oleks selge, et need sisaldavad näliliste tõrjevahendit ning neid ei tohi liigutada ega avada (vt jaotis 5.3 etiketile märgitava teabe kohta).
9. Kui toodet kasutatakse avalikes kohtades, tuleb tõrjealad tõrjeks märgistada ning mürksöödade juurde tuleb paigaldada teave antikoagulantist tingitud esmase või teisese mürgistuse ohu kohta ja kirjeldada mürgistuse korral võetavaid esmaabimeetmeid.
10. Mürksööti tuleb kinnitada nii, et seda ei saaks söödamajast eemaldada.
11. Asetada toode lastele, lindudele, lemmikloomadele, kodu- ja muudele mittesihthloomadele kättesaamatusse kohta.
12. Asetada toode eemale toidust, joogist ja loomasöödast, samuti nendega kokkupuutuvatest nõudest või pindadest.
13. Toote käitlemisel mitte süüa, juua ega suitsetada. Peale toote käitlemist pesta käed ja otseselt kokku puutunud nahapind.
14. Kui mürksööti tarvitatakse vähe võrreldes näliliste arvukusega, kaaluda söödamajade ümberpaigutamist ja võimalust vahetada mürksööti teise koostisega mürksööda vastu.
15. Kui pärast 35 päevase tõrje möödumist jätkub mürksööda kasutamine ning näliliste tegevuse vähenemist ei ole märgata, tuleb kindlaks teha selle tõenäoline põhjus. Kui muud põhjused on välistatud, on tõenäoline, et nälilised on resistentsed, mistõttu tuleb kaaluda mitte-antikoagulantse rodentitsiidi või mõne teise antikoagulantse toimega rodentitsiidi kasutamist. Samuti kaaluda alternatiivse ohjemeetmena lõksude kasutamist.
16. Eemaldada tõrje lõppemisel kasutamata mürksööti või söödamajad.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Kutselised kahjulike organismide tõrjujad

1. Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva hea tavaga, kui see on olemas].
2. Tooteinfos (st etiketil ja/või pakendi infolehel) peab olema selgelt kirjas, et toodet tohib tarnida ainult kutselistele kahjulike organismide tõrjujatele, kellel on nõuetekohane kutsetunnistus (nt „ainult kutselistele kahjulike organismide tõrjujatele“).
3. Mitte kasutada kohtades, kus võib kahtlustada resistentsust toimeaine suhtes.
4. Mitte kasutada tooteid üle 35 päeva ilma leviku olukorda ja tõrje tõhusust hindamata.
5. Mitte kasutada vaheldumisi samase või nõrgema toimega erinevaid antikoagulante, et vältida resistentsuse teket. Vajaduse korral kasutada mitte-antikoagulantset rodentitsiidi või võimalusel tugevama toimega antikoagulantset rodentitsiidi.
6. Söödamajasid või kaetud ja kaitsitud söödakohtades kasutatud nõusid enne uuesti mürksööda lisamist veega mitte pesta.
7. Kõrvaldada surnud närilised vastavalt kohalikele eeskirjadele. Mürgitatud närilised käidelda vastava loaga jäätmekäitluskohas.

Kutselised kasutajad

1. Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva hea tavaga, kui see on olemas].
2. Teisese mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant (nt vähemalt kaks korda nädalas).
3. Mitte kasutada tooteid üle 35 päeva ilma leviku olukorda ja tõrje tõhusust hindamata.
4. Mitte kasutada antikoagulantset toimeainet sisaldavat mürksööda pidevalt väljapandava mürksöödana näriliste leviku ennetamiseks või nende elutegevuse jälgimiseks.
5. Tooteinfos (st etiketil ja/või pakendi infolehel) peab olema selgelt kirjas, et: toodet ei tarnita tavatarbijale (nt „ainult kutselistele kasutajatele“); toodet tuleb kasutada selleks ettenähtud muukimiskindlates söödamajades (nt „kasutada ainult muukimiskindlas söödamajas“); kasutajad peavad söödamaja märgistama nõuetekohaselt toote omaduste kokkuvõtte jaotises 5.3 toodud teabega (nt „märgistada söödamajad vastavalt tootel olevatele soovitudele“).
6. Selle toote kasutamine peaks närilised kõrvaldama 35 päeva jooksul. Tooteinfo (st etikett ja/või pakendi infoleht) peab andma selge soovitusel, et kui tõrje lõppedes on kahtlus tõhususe suhtes (st näriliste elutegevust on veel märgata), peab kasutaja pöörduma nõu saamiseks toote tarnija või kutselise kahjulike organismide tõrjuja poole.
7. Söödamajasid enne uuesti mürksööda lisamist veega mitte pesta.
8. Kõrvaldada surnud närilised vastavalt kohalikele eeskirjadele. Mürgitatud närilised käidelda vastava loaga jäätmekäitluskohas.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

See toode sisaldab antikoagulanti. Allaneelamisel võivad sümptomid, milleks on ninaverejooks ja igemete veritsus, avalduda hiljem. Raskematel juhtudel võivad tekkida verevalumid ja roogas või uriinis võib esineda verd.

Vastumürk: K1-vitamiin, mida tohib manustada ainult arst/veterinaararst.

Toote:

- nahale sattumisel, pesta nahka veega ning seejärel vee ja seebiga.
- silma sattumisel, hoida silmalauge avatuna ja loputada silmi füsioloogilise lahuse või veega vähemalt 10 minutit.
- allaneelamisel, loputada suud hoolikalt veega. Mitte manustada teadvuseta inimesele midagi suukaudselt. Mitte esile kutsuda oksendamist. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

Kui lemmikloom on toodet alla neelanud, pöörduda veterinaararsti poole.

Söödamajad tuleb märgistada järgneva infoga: „mitte liigutada ega avada“; „sisaldab näriliste tõrjevahendit“; „tootenimi või loa number“; „toimeaine(d)“ ja „õnnetusjuhtumi korral helistada mürgistusteabekeskusesse 16662“.

Ohtlik metsloomadele.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Kõrvaldada tõrje lõppemisel kasutamata mürksööt ja pakend vastavalt kohalikele eeskirjadele. Mürksööt ja määrdunud pakendid käidelda ohtliku jäätmena.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida mahutit suletuna ja kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoida lastele, lindudele, lemmikloomadele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

Säilivusaeg: 2 aastat.

6. Muu teave

Antikoagulantsed näriliste tõrjevahendid mõjuvad viibega saavutades tõhususe 4–10 päeva jooksul pärast mürksööda tarvitamist.

Närilised võivad olla haiguskandjad. Mitte puutuda surnud närilisi paljaste kätega, vaid kasutada nende kõrvaldamiseks kindaid või abivahendeid nagu tangid.

Toode sisaldab mõruainet ja värvainet.

Märgistuse piktogramm ja tunnusõna vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 CLP:

Tunnusõna: Ettevaatust

Piktogramm: GHS08

Eesti Mürgistusteabekeskus: 16662