

# Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

**Grupės pavadinimas:** OxyPharm H2O2

**Produkto tipas (-ai):** PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

**Autorizacijos liudijimo numeris:** EU-0029752-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris:** EU-0029752-0000

## Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	2
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	2
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Oxy'Pharm H2O2 6%</b>	3
2. Meta SPC sudėtis	3
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	4
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	6
6. Kita informacija	8
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	8
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Oxy'Pharm H2O2 12%</b>	10
2. Meta SPC sudėtis	10
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	11
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	11
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	14
6. Kita informacija	15
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	15
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Oxy'Pharm H2O2 7.9%</b>	17
2. Meta SPC sudėtis	18
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	18
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	18
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	24
6. Kita informacija	25
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	25

# I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

## 1. Administracinė informacija

### 1.1. Grupės pavadinimas

Oxy'Pharm H2O2

### 1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

### 1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

**Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas**

Pavadinimas	OXY'PHARM
Adresas	rue Marcel Paul 829 94500 Champigny-sur-Marne Prancūzija

**Autorizacijos liudijimo numeris**

EU-0029752-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris**

EU-0029752-0000

**Autorizacijos liudijimo data**

03/10/2023

**Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data**

30/09/2032

### 1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

**Gamintojo pavadinimas**

OXY'PHARM

**Gamintojo adresas**

Rue Marcel Paul, 829 94500 Champigny-sur-Marne Prancūzija

**Gamybos vieta**

Rue Marcel Paul, 829 94500 Champigny-sur-Marne Prancūzija

### 1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1315 - Vandenilio peroksidas
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Evonik Resource Efficiency GmbH
<b>Gamintojo adresas</b>	Rellinghauser Straße 1—11 45128 Essen Vokietija
<b>Gamybos vieta</b>	Evonik Industries AG / BL Active Oxygens, Untere Kanalstrasse 3 79618 Rheinfelden Vokietija

## 2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	6 - 12
Sidabras		Kita sudedamoji dalis	7440-22-4	231-131-3	0 - 0,0017

### 2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

AL - Bet koks kitas skystis
-----------------------------

## II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

# 1. Meta SPC administravimo informacija

## 1.1. meta SPC identifikatorius

Oxy'Pharm H2O2 6%

## 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

## 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

# 2. Meta SPC sudėtis

## 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veikloji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	6 - 6
Sidabras		Kita sudedamoji dalis	7440-22-4	231-131-3	0,0017 - 0,0017

## 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

# 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Mūvēti naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

turinį išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo punktuose pagal nacionalinius teisės aktus.

talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo punktuose pagal nacionalinius teisės aktus.

## 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - 1.1 naudojimas: Kietų paviršių dezinfekavimas dezinfekcijai garinamu vandenilio peroksidu 6% (FHP)

##### Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

##### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

##### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrasis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrasis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrasis pavadinimas: Tuberculosis bacilli  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrasis pavadinimas: Virusai  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrasis pavadinimas: Grybai  
Vystymo stadija: -

##### Naudojimo sritis

vidaus

Patalpų, kurių tūris yra 4–150 m<sup>3</sup>, dezinfekcijai garinamu vandenilio peroksidu (FHP). Apima patalpoje esančios įrangos ir medžiagų (išskyrus medicinos prietaisus) kietų neaktyviųjų paviršių dezinfekciją: - ligoninės ir sveikatos priežiūros įstaigos, - tyrimų ir analizės laboratorijos (įskaitant P3 laboratorijas ir sterilias patalpas), - sveikatos priežiūros transporto priemonės, - farmacijos pramonė, - pramoninės skalbyklos, - dantų chirurgijos ir implantologijos centrai, - viešbučiai, - mokyklos, - lopšeliai-darželiai.

**Naudojimo metodas (-ai)**

Metodas: Garinimas  
Išsamus aprašymas:  
Produktas yra paruoštas naudoti, jis dedamas į garinimo aparatą. Aparatas automatiškai garina biocidinį produktą uždaroje dezinfekuojamoje patalpoje, kurioje nėra naudotojo ar pašalinių asmenų.

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Naudojimo kiekis: - Baktericidinis, mielicidinis, fungicidinis, tuberkulicidinis ir virucidinis poveikis: 5 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. Antra dezinfekcija: 5 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. Antrą kartą dezinfekuoti iš karto po pirmo. Abu dezinfekavimus galima užprogramuoti, kad jie būtų atlikti iš eilės. Lašelių dydis: 1-15 μm  
Skiedimas (%): -  
Taikymo skaičiaus ir laikas:  
Dezinfekuoti patalpas ir įrangą galima taip dažnai, kaip reikia pagal taikomas higienos normas.

**Vartotojų kategorija (-os)**

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

- 1) Didelio tankio polietilenas HDPE baltas (neskaidrus) 1 litras butelis su užsukamu nudujinimo dangteliu.
- 2) HDPE pilkas (neskaidrus) vienkartinis 2 litrai butelis.
- 3) HDPE baltas (neskaidrus) 5 litrai kanistras (daugkartiniam naudojimui).
- 4) HDPE baltas (neskaidrus) 20 litrai kanistras.

**4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

Prieš dezinfekciją paviršius nuvalyti. Produktas paruoštas naudoti neskiedžiant. Produktas skirtas naudoti su tokia įranga: Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax, Nocomax Easy, Glosair. Prieš naudojimą perskaityti instrukciją. Naudoti laikantis šių nurodymų:

- Baktericidinis, mielicidinis, fungicidinis, tuberkulicidinis ir virucidinis poveikis: 5 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. Antra dezinfekcija: 5 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė.

Antrą kartą dezinfekuoti iš karto po pirmo. Abu dezinfekavimus galima užprogramuoti, kad jie būtų atlikti iš eilės.

Lašelių dydis: 1-15 μm

Santykinis drėgnis: 25% - 75%

Temperatūra: kambario temperatūra

Laikytis nurodytos sąlyčio trukmės. Sąlytis prasideda patalpoje esant nurodytam produkto kiekiui.

Dezinfekuojamoje patalpoje (arba, jei taikoma, tinkamoje „standartinėje patalpoje“) naudotojas visuomet privalo atlikti dezinfekcijos mikrobiologinę patikrą naudodamas garinimo aparatus, kurie bus naudojami. Tada galima parengti ir naudoti dezinfekavimo protokolą.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

##### Pirmoji pagalba

PRARIJUS: Nedelsiant skalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali nuryti, duoti kažko atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PATEKUS Į AKIS: Nuskalauti vandeniu. Atsiradus simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PATEKUS Į AKIS: Nuskalauti vandeniu. Išsiimti (išimti) kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Atsiradus simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

##### Galimas tiesioginis ar netiesioginis poveikis

Sukelia smarkų akių dirginimą.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus .

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus.

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

-



## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Garinimo metu patalpa turi būti uždaryta ir į ją negalima eiti. Dezinfekciją atlikti nesant patalpoje žmonių ar gyvūnų.

Visos angos patalpoje (pvz., aplink langų rėmus), pro kurias rūkas gali išeiti, turi būti iš anksto užsandarintos. Viso dezinfekcijos proceso metu niekam neleisti patekti į patalpą naudojant įspėjamąjį ženklą.

Į apdorotą patalpą galima patekti tik vandenilio peroksido koncentracijai sumažėjus iki  $\leq 0,9$  ppm ( $1,25 \text{ mg/m}^3$ ) arba žemesnės nacionalinės referencinės reikšmės.

Skubiu atveju profesionalus naudotojas gali įeiti į patalpą tik vandenilio peroksido koncentracijai sumažėjus žemiau 36 ppm ( $50 \text{ mg/m}^3$ ) ir naudodamas šias privalomas asmenines apsaugos priemones (AAP): kvėpavimo takų apsaugos priemonės (KTAP) pagal EN 14387 ar lygiavertį standartą su priskirtu apsaugos veiksniu (APF) 40 (KTAP tipą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti gaminio informacijoje) ir tinkamas apsaugos priemonės (pirštines pagal EN 374 ar lygiavertį standartą, akių apsaugas pagal EN ISO 16321 ar lygiavertį standartą, kombinezoną). Pirštinių ir kombinezono medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti gaminio informacijoje. EN standartų pavadinimai nurodyti 6 skirsnyje. Matavimo prietaisu būtina nustatyti, ar vandenilio peroksido koncentracija nukrito žemiau  $0,9$  ppm arba žemesnės nacionalinės referencinės reikšmės.

Gyvūnai ir žmonės be apsaugos priemonių gali patekti į apdorotą patalpą tik vandenilio peroksido koncentracijai ore sumažėjus žemiau  $1,25 \text{ mg/m}^3$  ( $0,9$  ppm) arba žemesnės nacionalinės referencinės reikšmės.

Asmeninės apsaugos priemonės:

Produkto maišymo ir įkrovimo į talpyklą, kuri tiesiogiai naudojama garinimo prietaise (pvz., Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax arba Nocomax Easy) metu akių apsaugai naudokite cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius akinius pagal EN ISO 16321 ar lygiavertį standartą.

## 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

-

## 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus dezinfekuoti produkto likutį ir jo pakuotę šalinti laikantis vietos reikalavimų. Produkto likutį galima išpilti į miesto nuotekų tinklą arba gyvulių mėšlą pagal vietos reikalavimus. Neišpilti į individualią nuotekų valymo sistemą.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikymo trukmė: 2 metai.

## 6. Kita informacija

Toliau išvardinti 5.2 skirsnyje minimų EN standartų pavadinimai:  
EN 374 – Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų  
EN ISO 16321 – Akių ir veido apsauga profesiniam naudojimui  
EN 14387 – Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų filtrai ir sudėtiniai filtrai. Reikalavimai, bandymai, ženklavimas

## 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

### 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

<b>Prekinis pavadinimas</b>	Nocolyse	Rinka: EU
	Glosair 400	Rinka: EU
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b> <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0029752-0001 1-1	

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	6
Sidabras		Kita sudedamoji dalis	7440-22-4	231-131-3	0,0017

### Prekinis pavadinimas

Nocolyse menthe

Rinka: EU

**Autorizacijos liudijimo numeris**

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Glosair 400 menthe	Rinka: EU
EU-0029752-0002 1-1	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	6
Sidabras		Kita sudedamoji dalis	7440-22-4	231-131-3	0,0017

**Prekinis pavadinimas****Autorizacijos liudijimo numeris**

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Nocolyse nocodor	Rinka: EU
Glosair 400 nocodor	Rinka: EU
EU-0029752-0003 1-1	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	6
Sidabras		Kita sudedamoji dalis	7440-22-4	231-131-3	0,0017

---

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Oxy'Pharm H2O2 12%

### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-2

### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	12 - 12
Sidabras		Kita sudedamoji dalis	7440-22-4	231-131-3	0,0017 - 0,0017

### 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

### 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

<b>Pavojingumo kategorijos</b>	<p>Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.</p> <p>Smarkiai pažeidžia akis.</p> <p>Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p>
<b>Pavojingumo frazės</b>	<p>Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.</p> <p>Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degių medžiagų.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.</p> <p>Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.</p> <p>turinį išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo punktuose pagal nacionalinius teisės aktus.</p> <p>talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo punktuose pagal nacionalinius teisės aktus.</p>

### 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - 2.1 naudojimas: Kietų paviršių dezinfekavimas dezinfekcijai garinamu vandenilio peroksidu 12% (FHP)

<b>Produkto tipas</b>	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	-
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	<p>Mokslinis pavadinimas: - Bendrasis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: -</p> <p>Mokslinis pavadinimas: - Bendrasis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: -</p> <p>Mokslinis pavadinimas: - Bendrasis pavadinimas: Bakterijų sporos Vystymo stadija: -</p>

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Tuberculosis bacilli  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Virusai  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Grybai  
Vystymo stadija: -

#### Naudojimo sritis

vidaus

Patalpų, kurių tūris yra 4–150 m<sup>3</sup>, dezinfekcijai garinamu vandenilio peroksidu (FHP). Apima patalpoje esančios įrangos ir medžiagų (išskyrus medicinos prietaisus) kietų neaktyviųjų paviršių dezinfekciją: - ligoninės ir sveikatos priežiūros įstaigos, - tyrimų ir analizės laboratorijos (įskaitant P3 laboratorijas ir sterilius patalpas), - sveikatos priežiūros transporto priemonės, - farmacijos pramonė, - pramoninės skalbyklos, - dantų chirurgijos ir implantologijos centrai, - viešbučiai, - mokyklos, - lopšeliai-darželiai.

#### Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: garinimas  
Išsamus aprašymas:

Produktas yra paruoštas naudoti, jis dedamas į garinimo aparatą. Aparatas automatiškai garina biocidinį produktą uždaroje dezinfekuojamoje patalpoje, kurioje nėra naudotojo ar pašalinių asmenų.

#### Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: - Baktericidinis, mielicidinis, fungicidinis, sporicidinis ir virucidinis poveikis: 3 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. Antra dezinfekcija: 3 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. - Tuberkulicidinis poveikis: 5 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. Antra dezinfekcija: 3 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. Antrą kartą dezinfekuoti iš karto po pirmo. Abu dezinfekavimus galima užprogramuoti, kad jie būtų atlikti iš eilės. Lašelių dydis: 1-15 µm

Skiedimas (%): -

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Dezinfekuoti patalpas ir įrangą galima taip dažnai, kaip reikia pagal taikomas higienos normas.

#### Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

#### Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

- 1) HDPE baltas (neskaidrus) 1 litras butelis su užsukamu nudujinimo dangteliu.
- 2) HDPE pilkas (neskaidrus) vienkartinis 2 litrai butelis.
- 3) HDPE baltas (neskaidrus) 5 litrai kanistras (daugkartiniam naudojimui).
- 4) HDPE baltas (neskaidrus) 20 litrai kanistras.

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekciją paviršius nuvalyti. Produktas paruoštas naudoti neskiedžiant. Produktas skirtas naudoti su tokia įranga: Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax, Nocomax Easy, Glosair. Prieš naudojimą perskaityti instrukciją. Naudoti laikantis šių nurodymų:

- Baktericidinis, mielicidinis, fungicidinis, sporicidinis ir virucidinis poveikis: 3 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. Antra dezinfekcija: 3 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė.
- Tuberkulicidinis poveikis: 5 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. Antra dezinfekcija: 3 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė.

Antrą kartą dezinfekuoti iš karto po pirmo. Abu dezinfekavimus galima užprogramuoti, kad jie būtų atlikti iš eilės.

Lašelių dydis: 1-15 µm

Santykinis drėgnis: 25% - 75%

Temperatūra: kambario temperatūra

Laikytis nurodytos sąlyčio trukmės. Sąlytis prasideda patalpoje esant nurodytam produkto kiekiui.

Dezinfekuojamoje patalpoje (arba, jei taikoma, tinkamoje „standartinėje patalpoje“) naudotojas visuomet privalo atlikti dezinfekcijos mikrobiologinę patikrą naudodamas garinimo aparatus, kurie bus naudojami. Tada galima parengti ir naudoti dezinfekavimo protokolą.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Pirmoji pagalba

PRARIJUS: Nedelsiant skalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali nuryti, duoti kažko atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinkite 112 / greitajai pagalbai.

PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant plauti odą dideliu vandens kiekiu. Po naudojimo nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Toliau 15 minučių plauti odą vandeniu. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Atsiradus simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant plauti vandeniu kelias minutes. Išsiimti (išimti) kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau plauti bent 15 minučių. Skambinkite 112 / greitajai pagalbai.

Galimas tiesioginis ar netiesioginis poveikis  
Sukelia smarkų akių dirginimą.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus.

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

-

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Garinimo metu patalpa turi būti uždaryta ir į ją negalima eiti. Dezinfekciją atlikti nesant patalpoje žmonių ar gyvūnų. Visos angos patalpoje (pvz., aplink langų rėmus), pro kurias rūkas gali išeiti, turi būti iš anksto užsandarintos. Viso dezinfekcijos proceso metu niekam neleisti patekti į patalpą naudojant įspėjamąjį ženklą. Į apdorotą patalpą galima patekti tik vandenilio peroksido koncentracijai sumažėjus iki  $\leq 0,9$  ppm ( $1,25 \text{ mg/m}^3$ ) arba žemesnės nacionalinės referencinės reikšmės.

Skubiu atveju profesionalus naudotojas gali įeiti į patalpą tik vandenilio peroksido koncentracijai sumažėjus žemiau  $36 \text{ ppm}$  ( $50 \text{ mg/m}^3$ ) ir naudodamas šias privalomas asmenines apsaugos priemones (AAP): kvėpavimo takų apsaugos priemonės (KTAP) pagal EN 14387 ar lygiavertį standartą su priskirtu apsaugos veiksniu (APF) 40 (KTAP tipą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti gaminio informacijoje) ir tinkamas apsaugos priemones (pirštines pagal EN 374 ar lygiavertį standartą, akių apsaugus pagal EN ISO 16321 ar lygiavertį standartą, kombinezoną). Pirštinių ir kombinezono medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti gaminio informacijoje. EN standartų pavadinimai nurodyti 6 skirsnyje. Matavimo prietaisu būtina nustatyti, ar vandenilio peroksido koncentracija nukrito žemiau  $0,9 \text{ ppm}$  arba žemesnės nacionalinės referencinės reikšmės.

Gyvūnai ir žmonės be apsaugos priemonių gali patekti į apdorotą patalpą tik vandenilio peroksido koncentracijai ore sumažėjus žemiau  $1,25 \text{ mg/m}^3$  ( $0,9 \text{ ppm}$ ) arba žemesnės nacionalinės referencinės reikšmės.

Asmeninės apsaugos priemonės:



Produkto maišymo ir įkrovimo į talpyklą, kuri tiesiogiai naudojama garinimo prietaise (pvz., Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax arba Nocomax Easy) metu akių apsaugai naudokite cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius akinius pagal EN ISO 16321 ar lygiavertį standartą.

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

-

### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus dezinfekuoti produkto likutį ir jo pakuotę šalinti laikantis vietos reikalavimų. Produkto likutį galima išpilti į miesto nuotekų tinklą arba gyvulių mėšlą pagal vietos reikalavimus. Neišpilti į individualią nuotekų valymo sistemą.

### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikymo trukmė: 2 metai.

## 6. Kita informacija

Toliau išvardinti 5.2 skirsnyje minimų EN standartų pavadinimai:  
EN 374 – Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų  
EN ISO 16321 – Akių ir veido apsauga profesiniam naudojimui  
EN 14387 – Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų filtrai ir sudėtiniai filtrai. Reikalavimai, bandymai, ženklavimas

## 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

### 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

**Prekinis pavadinimas**

Nocolyse One Shot	Rinka: EU
Nocolyse +	Rinka: EU
Glosair 600	Rinka: EU

**Autorizacijos liudijimo numeris**

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0029752-0004 1-2

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	12
Sidabras		Kita sudedamoji dalis	7440-22-4	231-131-3	0,0017

**Prekinis pavadinimas**

Nocolyse One Shot menthe	Rinka: EU
Nocolyse + menthe	Rinka: EU
Glosair 600 menthe	Rinka: EU

**Autorizacijos liudijimo numeris**

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0029752-0005 1-2

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	12
Sidabras		Kita sudedamoji dalis	7440-22-4	231-131-3	0,0017

### Prekinis pavadinimas

Nocolyse One Shot nocodor	Rinka: EU
Nocolyse + nocodor	Rinka: EU
Glosair 600 nocodor	Rinka: EU
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b> EU-0029752-0006 1-2 <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	12
Sidabras		Kita sudedamoji dalis	7440-22-4	231-131-3	0,0017

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Oxy'Pharm H2O2 7.9%

## 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-3

## 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	7,9 - 7,9

### 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

## 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Pavojingumo frazės

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.

Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

## 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

#### **Naudojimas 1 - 3.1 naudojimas: Kietų paviršių dezinfekavimas dezinfekcijai garinamu vandenilio peroksidu 7,9% (FHP)**

##### **Produkto tipas**

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

##### **Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas**

-

##### **Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijų sporos  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Mikobakterijos  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Virusai  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Grybai  
Vystymo stadija: -

##### **Naudojimo sritis**

vidaus

Patalpų, kurių tūris yra 4–150 m<sup>3</sup>, dezinfekcijai garinamu vandenilio peroksidu (FHP).  
Apima patalpoje esančios įrangos ir medžiagų (išskyrus medicinos prietaisus) kietų neaktyvių paviršių dezinfekciją: - ligoninės ir sveikatos priežiūros įstaigos,  
- tyrimų ir analizės laboratorijos (įskaitant P3 laboratorijas ir sterilius patalpas),  
- sveikatos priežiūros transporto priemonės,  
- farmacijos pramonė,  
- pramoninės skalbyklos,  
- dantų chirurgijos ir implantologijos centrai,  
- transporto priemonės,  
- viešbučiai,  
- maitinimo įstaigos,  
- mokyklos,  
- lopšeliai-darželiai,  
- veterinarijos klinikos.

##### **Naudojimo metodas (-ai)**

Metodas: garinimas  
Išsamus aprašymas:  
Produktas yra paruoštas naudoti, jis dedamas į garinimo aparatą. Aparatas automatiškai garina biocidinį produktą uždaroje dezinfekuojamoje patalpoje, kurioje nėra naudotojo ar pašalinių asmenų.

##### **Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Naudojimo kiekis: - Baktericidinis, mielicidinis, fungicidinis, sporicidinis ir virucidinis poveikis: 5 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. - Mikobaktericidinis poveikis (≥ 4 log sumažėjimas): 7 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. Lašelių dydis: 1-15 µm  
Skiedimas (%): -

	<p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Dezinfekuoti patalpas ir įrangą galima taip dažnai, kaip reikia pagal taikomas higienos normas.</p>
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	<p>Profesionalas</p>
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<p>1) HDPE baltas (neskaidrus) 1 litras butelis su užsukamu nudujinimo dangteliu. 2) HDPE pilkas (neskaidrus) vienkartinis 2 litrai butelis. 3) HDPE baltas (neskaidrus) 5 litrai kanistras (daugkartiniam naudojimui). 4) HDPE baltas (neskaidrus) 20 litrai kanistras.</p>

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekciją paviršius nuvalyti. Produktas paruoštas naudoti neskiedžiant. Produktas skirtas naudoti su tokia įranga: Nocospray/Bio-sanitizer/Sanofog/Nocomax/Nocomax Easy/Glosair. Prieš naudojimą perskaityti instrukciją. Naudoti laikantis šių nurodymų:

- Baktericidinis, mielicidinis, fungicidinis, sporicidinis ir virucidinis poveikis: 5 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė.
- Mikobaktericidinis poveikis (≥ 4 log sumažėjimas): 7 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė.

Lašelių dydis: 1-15 μm

Santykinis drėgnis: 25% - 75%

Temperatūra: kambario temperatūra

Laikytis nurodytos sąlyčio trukmės. Sąlytis prasideda patalpoje esant nurodytam produkto kiekiui.

Dezinfekuojamoje patalpoje (arba, jei taikoma, tinkamoje „standartinėje patalpoje“) naudotojas visuomet privalo atlikti dezinfekcijos mikrobiologinę patikrą naudodamas garinimo aparatus, kurie bus naudojami. Tada galima parengti ir naudoti dezinfekavimo protokolą.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

##### Pirmoji pagalba

PRARIJUS: Nedelsiant skalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali nuryti, duoti kažko atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti odą vandeniu. Atsiradus simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PATEKUS Į AKIS: Nuskalauti vandeniu. Išsiimti (išimti) kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Atsiradus simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Galimas tiesioginis ar netiesioginis poveikis  
Sukelia smarkų akių dirginimą.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.2 Naudokite aprašymą

**Naudojimas 2 - 3.3 naudojimas: Kietų paviršių dezinfekavimas dezinfekcijai garinamu vandenilio peroksidu (FHP)**

##### Produkto tipas

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

##### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

##### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijų sporos  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Mikobakterijos  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Virusai  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: bakteriofagai  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Grybai  
Vystymo stadija: -

#### **Naudojimo sritis**

vidaus

4–150 m<sup>3</sup> patalpų ir jose esančių kietų neaktyvių įrangos ir medžiagų paviršių dezinfekciją FHP:

- maisto pramonė,
- pramoninės virtuvės,
- maitinimo įstaigos.

#### **Naudojimo metodas (-ai)**

Metodas: garinimas

Išsamus aprašymas:

Produktas yra paruoštas naudoti, jį dedamas į garinimo aparatą. Aparatas automatiškai garina biocidinį produktą uždaroje dezinfekuojamoje patalpoje, kurioje nėra naudotojo ar pašalinių asmenų.

#### **Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Naudojimo kiekis: - Baktericidinis, bakteriofagocidinis, mielicidinis, fungicidinis, sporicidinis ir virucidinis poveikis: 5 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. - Mikobaktericidinis poveikis: 7 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė. Lašelių dydis: 1-15 μm

Skiedimas (%): -

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Dezinfekuoti patalpas ir įrangą galima taip dažnai, kaip reikia pagal taikomas higienos normas.

#### **Vartotojų kategorija (-os)**

Profesionalas

#### **Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

- 1) HDPE baltas (neskaidrus) 1 litras butelis su užsukamu nudujinimo dangteliu.
- 2) HDPE pilkas (neskaidrus) vienkartinis 2 litrai butelis.
- 3) HDPE baltas (neskaidrus) 5 litrai kanistras (daugkartiniam naudojimui).
- 4) HDPE baltas (neskaidrus) 20 litrai kanistras.



#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekciją paviršius nuvalyti. Produktas paruoštas naudoti neskiedžiant. Produktas skirtas naudoti su tokia įranga: Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax, Nocomax Easy, Glosair. Prieš naudojimą perskaityti instrukciją. Naudoti laikantis šių nurodymų:

- Baktericidinis, bakteriofagocidinis, mielicidinis, fungicidinis, sporicidinis ir virucidinis poveikis: 5 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė.
  - Mikobaktericidinis poveikis: 7 ml produkto/m<sup>3</sup> ir 2 val. sąlyčio trukmė.
- Lašelių dydis: 1-15 µm

Santykinis drėgnis: 25% - 75%

Temperatūra: kambario temperatūra

Laikytis nurodytos sąlyčio trukmės. Sąlytis prasideda patalpoje esant nurodytam produkto kiekiui.

Dezinfekuojamoje patalpoje (arba, jei taikoma, tinkamoje „standartinėje patalpoje“) naudotojas visuomet privalo atlikti dezinfekcijos mikrobiologinę patikrą naudodamas garinimo aparatus, kurie bus naudojami. Tada galima parengti ir naudoti dezinfekavimo protokolą.

#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Pirmoji pagalba

PRARIJUS: Nedelsiant skalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali nuryti, duoti kažko atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti odą vandeniu. Atsiradus simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PATEKUS Į AKIS: Nuskalauti vandeniu. Išsiimti (išimti) kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Atsiradus simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Galimas tiesioginis ar netiesioginis poveikis

Sukelia smarkų akių dirginimą.

#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. šios produkto charakteristikų metasantraukos bendruosius naudojimo nurodymus.

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

-

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Garinimo metu patalpa turi būti uždaryta ir į ją negalima eiti. Dezinfekciją atlikti nesant patalpoje žmonių ar gyvūnų. Visos angos patalpoje (pvz., aplink langų rėmus), pro kurias rūkas gali išeiti, turi būti iš anksto užsandarintos. Viso dezinfekcijos proceso metu niekam neleisti patekti į patalpą naudojant įspėjamąjį ženklą. Į apdorotą patalpą galima patekti tik vandenilio peroksido koncentracijai sumažėjus iki  $\leq 0,9$  ppm ( $1,25 \text{ mg/m}^3$ ) arba žemesnės nacionalinės referencinės reikšmės.

Skubiu atveju profesionalus naudotojas gali įeiti į patalpą tik vandenilio peroksido koncentracijai sumažėjus žemiau  $36$  ppm ( $50 \text{ mg/m}^3$ ) ir naudodamas šias privalomas asmenines apsaugos priemones (AAP): kvėpavimo takų apsaugos priemones (KTAP) pagal EN 14387 ar lygiavertį standartą su priskirtu apsaugos veiksniu (APF) 40 (KTAP tipą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti gaminio informacijoje) ir tinkamas apsaugos priemones (pirštines pagal EN 374 ar lygiavertį standartą, akių apsaugas pagal EN ISO 16321 ar lygiavertį standartą, kombinezoną). Pirštinių ir kombinezono medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas turi nurodyti gaminio informacijoje. EN standartų pavadinimai nurodyti 6 skirsnyje. Matavimo prietaisu būtina nustatyti, ar vandenilio peroksido koncentracija nukrito žemiau  $0,9$  ppm arba žemesnės nacionalinės referencinės reikšmės.

Gyvūnai ir žmonės be apsaugos priemonių gali patekti į apdorotą patalpą tik vandenilio peroksido koncentracijai ore sumažėjus žemiau  $1,25 \text{ mg/m}^3$  ( $0,9$  ppm) arba žemesnės nacionalinės referencinės reikšmės.

Asmeninės apsaugos priemonės:

Produkto maišymo ir įkrovimo į talpyklą, kuri tiesiogiai naudojama garinimo prietaise (pvz., Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax arba Nocomax Easy) metu akių apsaugai naudokite cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius akinius pagal EN ISO 16321 ar lygiavertį standartą.

**5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

-

**5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigus dezinfekuoti produkto likutį ir jo pakuotę šalinti laikantis vietos reikalavimų. Produkto likutį galima išpilti į miesto nuotekų tinklą arba gyvulių mėšlą pagal vietos reikalavimus. Neišpilti į individualią nuotekų valymo sistemą.

**5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

- Laikymo trukmė: 2 metai.

**6. Kita informacija**

Toliau išvardinti 5.2 skirsnyje minimų EN standartų pavadinimai:  
EN 374 – Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų  
EN ISO 16321 – Akių ir veido apsauga profesiniam naudojimui  
EN 14387 – Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų filtrai ir sudėtiniai filtrai. Reikalavimai, bandymai, ženklavimas

**7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai**

**7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

<b>Prekinis pavadinimas</b>	Nocolyse Food	Rinka: EU
	Glosair 500	Rinka: EU

**Autorizacijos liudijimo numeris**

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0029752-0007 1-3

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	7,9