

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

Storm Ultra

Productsoort(en)

PT14: Rodenticiden

Toelatingsnummer: BE2018-0034

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0014708-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Storm Ultra Storm Ultra Secure Storm Ultra Block Baits (BB) Formulex Formulex Secure Ratik Blocs Ratik Secure Blocs Secuvia Secuvia Secure Veor Veor Secure Rasofloc Secure Canadien Ultra Secure Rodicum Ultra Secure Rodibloc Secure
----------------------	--

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	BASF Belgium Coordination Center,
	Adres	Scheldelaan 600 2040 Antwerpen België
Toelatingsnummer		BE2018-0034
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0014708-0000
Toelatingsdatum		07/12/2018
Vervaldatum		01/07/2025

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch
Adres van de fabrikant	Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ Zwitserland
Productielocaties	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch site 1 BASF plc, St. Michael's Industrial Estate WA8 8TJ Widnes, Cheshire Verenigd Koninkrijk van Groot- Brittannië en Noord-Ierland BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch site 2 Schirm GmbH, Dieselstraße 8 85107 Baar- Ebenhausen Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Flocumafen
Naam van de fabrikant	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch
Adres van de fabrikant	Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ Zwitserland
Productielocaties	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch site 1 Vertellus Specialties UK Ltd., Lower Road WA8 8 NS Halebank, Widnes, Cheshire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Flocumafen	4-hydroxy-3- [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 1,2,3,4- tetrahydro-3- [4-(4- trifluoromethylbenzyloxy) phenyl]-1- naphthyl]coumarin	werkzame stof	90035-08-8	421-960-0	0,0025

2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	
Veiligheidsaanbevelingen	

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Huismuizen - breed publiek - binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 15 -25 gram lokaas per lokaasdoos - Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 1-2 meter te zijn Aantal en timing van de toepassing: 15 -25 gram lokaas per lokaasdoos Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 1-2 meter te zijn
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Verpakkingsgrootte: 15-100 gram Lokaasblokjes (5g/25g) verder verpakt in: - Kant-en-klare manipulatiebestendige PP lokaasdozen in PET/PE hersluitbare container of hersluitbare kartonnen doos - PP of HDPE of PET of PE emmers met deksel en hersluitbare potten - PP of HDPE of PET of PE gelamineerde hersluitbare container zoals een pot, blik of een kartonnen doos. - Afgesloten blik met hersluitbare deksel (PP)

--	--

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 2 tot 3 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.
- Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen.
- Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.
- Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiters) dient duidelijk te vermelden dat: het product dient te worden gebruikt in manipulatiebestendige lokdozen (bijvoorbeeld "uitsluitend gebruiken in manipulatiebestendige lokdozen"); de gebruiker dient de lokdozen te etiketteren met de informatie die in rubriek 5.3 van dit document staat (bijvoorbeeld "etiketteer lokdozen conform de productaanbevelingen")
- Het gebruik van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdieren binnen 35 dagen. De productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiters) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoeden van gebrek aan werkzaamheid aan het einde van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.
- Zoek naar en verwijder dode knaagdieren gedurende de bestrijdingsperiode, ten minste elke keer als de lokaasdozen worden geïnspecteerd.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.3)

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.4)

4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.5)

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. Ratten - breed publiek - binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 50 - 75 gram lokaas per lokaasdoos - Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 5-10 meter te zijn Aantal en timing van de toepassing: 50 - 75 gram lokaas per lokaasdoos Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 5-10 meter te zijn
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Verpakkingsgrootte: 50-300 gram Lokaasblokjes (5g/25g) verder verpakt in:

-
- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Kant-en-klare manipulatiebestendige PP lokaasdozen in PET/PE hersluitbare container of hersluitbare kartonnen doos; of- PP of HDPE of PET of PE emmers met deksel en hersluitbare potten- PP of HDPE of PET of PE gelamineerde hersluitbare container zoals een pot, blik of een kartonnen doos.- Afgesloten blik met hersluitbare deksel (PP) |
|--|---|

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 5 tot 7 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.
- Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen.
- Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.
- Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.2.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat: - het product dient te worden gebruikt in manipulatiebestendige lokdozen (bijvoorbeeld "uitsluitend gebruiken in manipulatiebestendige lokdozen"); - de gebruiker dient de lokdozen te etiketteren met de informatie die in rubriek 5.3 van dit document staat (bijvoorbeeld "etiketteer lokdozen conform de productaanbevelingen")
- Het gebruik van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdieren binnen 35 dagen. De productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoeden van gebrek aan werkzaamheid aan het einde van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen
- Zoek naar en verwijder dode knaagdieren gedurende de bestrijdingsperiode, ten minste elke keer als de lokaasdozen worden geïnspecteerd.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.3)

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.4)

4.2.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.5)

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3. Ratten - breed publiek- buiten rond gebouwen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 50 - 75 gram lokaas per lokaasdoos - Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 5-10 meter te zijn Aantal en timing van de toepassing: 50 - 75 gram lokaas per lokaasdoos

	Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 5-10 meter te zijn
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Verpakkingsgrootte: 50-300 gram.</p> <p>Lokaasblokjes (5g/25g) verder verpakt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kant-en-klare manipulatiebestendige PP lokaasdozen in PET/PE hersluitbare container of hersluitbare kartonnen doos; of - PP of HDPE of PET of PE emmers met deksel en hersluitbare potten - PP of HDPE of PET of PE gelamineerde hersluitbare container zoals een pot, blik of een kartonnen doos. - Afgesloten blik met hersluitbare deksel (PP).

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm het lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaasdozen op plaatsen waar geen overstroming kan optreden.
- Vervang het lokaas in de lokaasdozen waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.
- Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 5 to 7 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.
- Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen.
- Wanneer lokaasdozen dicht bij oppervlaktewater (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssytemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.
- Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.3.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat: - het product dient te worden gebruikt in manipulatiebestendige lokdozen (bijvoorbeeld "uitsluitend gebruiken in manipulatiebestendige lokdozen"); - de gebruiker dient de lokdozen te etiketteren met de informatie die in rubriek 5.3 van dit document staat (bijvoorbeeld "etiketteer lokdozen conform de productaanbevelingen")
- Het gebruik van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdieren binnen 35 dagen. De productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoeden van gebrek aan werkzaamheid aan het einde van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.

- Zoek naar en verwijder dode knaagdieren gedurende de bestrijdingsperiode, ten minste elke keer als de lokaasdozen worden geïnspecteerd.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.3)

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.4)

4.3.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4. Huismuizen - professioneel- binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 15 – 25 gram per lokaasdoos - Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 1-2 meter te zijn.

	<p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>15 – 25 gram per lokaasdoos</p> <p>Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 1-2 meter te zijn.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Verpakkingsgrootte: 3 kg – 10 kg</p> <p>Lokaasblokjes (5g/25g) verder verpakt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP of HDPE of PET of PE emmers met deksel of hersluitbare potten - PP of HDPE of PET of PE gelamineerde hersluitbare container zoals een pot, blik of een kartonnen doos.

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 2 tot 3 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.

- *[Indien beschikbaar]* Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante code van beste praktijk staan.

- Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.4.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.2)

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.4)

4.4.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.5)

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5. Ratten – professioneel - binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: <i>Rattus novegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten Wetenschappelijke naam: <i>Rattus rattus</i> Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen Wetenschappelijke naam: <i>Rattus rattus</i> Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 50 -75 gram per lokaasdoos - Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 5-10 meter te zijn. Aantal en timing van de toepassing: 50 -75 gram per lokaasdoos

	Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 5-10 meter te zijn.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Verpakkingsgrootte: 3 kg – 10 kg Lokaasblokjes (5g/25g) verder verpakt in: - PP of HDPE of PET of PE emmers met deksel of hersluitbare potten - PP of HDPE of PET of PE gelamineerde hersluitbare container zoals een pot, blik of een kartonnen doos.

4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 5 tot 7 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.
- *[Indien beschikbaar]* Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante code van beste praktijk staan.
- Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.5.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.2)

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssysteem worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.4)

4.5.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.5)

4.6. Beschrijving van het gebruik

Tabel 6. Huismuizen en Ratten – professioneel - buiten rond gebouwen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen</p> <p>Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen</p> <p>Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: <i>Rattus rattus</i> Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen</p> <p>Wetenschappelijke naam: <i>Rattus rattus</i> Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten</p>
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Lokaas toepassing</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Muizen: 15 – 25 gram lokaas per lokaasdoos - Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 1-2 meter te zijn. Ratten: 50 -75 gramlokaas per lokaasdoos - Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 5-10 meter te zijn.</p>

	<p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Huimuizen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 – 25 gram lokaas per lokaasdoos - Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 1-2 meter te zijn. <p>Ratten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 -75 gramlokaas per lokaasdoos - Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen twee lokaasdozen 5-10 meter te zijn.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Verpakkingsgrootte: 3 kg – 10 kg</p> <p>Lokaasblokjes (5g/25g) verder verpakt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP of HDPE of PET of PE emmers met deksel of hersluitbare potten - PP of HDPE of PET of PE gelamineerde hersluitbare container zoals een pot, blik of een kartonnen doos.

4.6.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaasdozen op plaatsen waar geen overstroming kan optreden.
- Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere [2 tot 3 dagen voor huismuizen] [5 tot 7 dagen voor ratten] worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.
- Vervang lokaas in lokaasdozen waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.
- *[Indien beschikbaar]* Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante code van beste praktijk staan.
- Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

4.6.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.6.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Dit product niet direct in de holen toepassen.

4.6.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaasdozen dicht bij oppervlaktewater (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.6.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.4)

4.6.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.5)

4.7. Beschrijving van het gebruik

Tabel 7. Huismuizen en Ratten - gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid - binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuizen Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuizen Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten Wetenschappelijke naam: overig: Rattus novegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: overig: Zwarte rat

	Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: - Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen. - Bedekte en beschermde lokaasdozen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Pulsed baiting : Muizen: 15 – 25 gram lokaas per lokaasdoos. Ratten: 50 -75 gram lokaas per lokaasdoos. Aantal en timing van de toepassing: Pulsed baiting : - Muizen : 15 - 25 gram lokaas per lokaasdoos. - Ratten : 50 - 75 gram lokaas per lokaasdoos.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Verpakkingsgrootte: 3 kg – 10 kg Lokaasblokjes (5g/25g) verder verpakt in: - PP of HDPE of PET of PE emmers met deksel of hersluitbare potten - PP of HDPE of PET of PE gelamineerde hersluitbare container zoals een pot, blik of een kartonnen doos.

4.7.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Vervang opgegeten lokaas pas na drie dagen en dan met tussenpozen van maximaal zeven dagen. Verzamel eventueel gemorst lokaas en dode knaagdieren
- De frequentie van het bezoeken van de behandelde zone wordt bepaald door de professionele gebruiker zelf, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling. Deze frequentie moet overeenstemmen met de aanbevelingen in de relevante code van de beste praktijk.
- *[Indien beschikbaar]* Volg alle specifieke voorschriften zoals voorzien in de code van goede praktijk die van toepassing is op nationaal niveau.
- *[Indien beschikbaar]* Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante code van beste praktijk staan.
- Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

4.7.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.7.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele voorbijgangers (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke code van goede praktijk, indien beschikbaar].
- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende code van beste praktijk geeft.
- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

4.7.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.7.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.4)

4.7.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.5)

4.8. Beschrijving van het gebruik

Tabel 8. Muizen en Ratten - gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid- buiten rond gebouwen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuizen Ontwikkelingsstadia: overig: juvenilen</p> <p>Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuizen Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: overig: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen</p> <p>Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i></p>

	<p>Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenilen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: overig: Zwarte rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten</p>
Toepassingsgebied(en)	<p>gebruik buiten</p> <p>Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Lokaas toepassing</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: - Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen. - Bedekte en beschermde lokaasdozen - Directe toepassing van het kant-en-klaar lokaas in de holen</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Pulsed Baiting : Huismuizen: 15 – 25 gram lokaas per lokaasdoos; Ratten 50 -75 gram lokaas per lokaasdoos.</p> <p>Aantal en timing van de toepassing: Pulsed Baiting :</p> <p>- Muizen: 15 - 25 gram lokaas per lokaasdoos. - Ratten: 50 -75 gram lokaas per lokaasdoos. 50 -75 gram per hol.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Verpakkingsgrootte: 3 kg – 10 kg</p> <p>Lokaasblokjes (5g/25g) verder verpakt in: - PP of HDPE of PET of PE emmers met deksel of hersluitbare potten - PP of HDPE of PET of PE gelamineerde hersluitbare container zoals een pot, blik of een kartonnen doos.</p>

4.8.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Vervang opgegeten lokaas pas na drie dagen en dan met tussenpozen van maximaal zeven dagen. Verzamel eventueel gemorst lokaas en dode knaagdieren
- De frequentie van het bezoeken van de behandelde zone wordt bepaald door de professionele gebruiker zelf, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling. Deze frequentie moet overeenstemmen met de aanbevelingen in de relevante code van de beste praktijk.
- Voor gebruik buiten, moeten de lokaasdozen bedekt zijn en op strategische locaties gezet worden om de blootstelling van niet-doelsoorten tot een minimum te beperken.

-
- Lokaas moet zo worden geplaatst dat de blootstelling van niet-doelsoorten en kinderen tot een minimum wordt beperkt.
 - Bedek of blokkeer de ingangen van holen die van lokaas zijn voorzien om het risico te verminderen dat lokaas eruit gegooid en verspild wordt.
 - *[Indien beschikbaar]* Volg alle specifieke voorschriften zoals voorzien in de code van goede praktijk die van toepassing is op nationaal niveau.
 - Bescherm het lokaas tegen atmosferische omstandigheden. Plaats de lokaasdozen in gebieden waar geen overstroming kan optreden.
 - Vervang het lokaas in de lokaasdozen waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.
 - Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.
 - *[Indien beschikbaar]* Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.8.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.8.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele voorbijgangers (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke code van goede praktijk, indien beschikbaar].
 - Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
 - Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende code van beste praktijk geeft.
- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

4.8.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaasdozen dicht bij oppervlaktewater (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.8.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.4)

4.8.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Zie algemene gebruiksaanwijzing (rubriek 5.5)

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
- Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).
- Waar mogelijk moeten lokaasdozen aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.

Professioneel gebruiker en professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid :

- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen. __
-
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.
- Lokaasdozen moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).
- *[Indien het nationaal beleid of de nationale wetgeving dit vereist]* Wanneer het product op openbare plaatsen gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde zones tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.
- Men dient ervoor te zorgen dat het lokaas niet uit de lokaasdoos kan gehaald worden
- Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (materiaal van de handschoenen nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie)
- Als de inname van het lokaas relatief laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan om de lokaasdozen te verplaatsen en te opteren voor een andere lokaasformulering.
- Als het lokaas na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en er geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnend rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterker bloedverdunnend rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve bestrijdingsmaatregel.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

- Gebruik bloedverdünnende rodenticiden niet als permanent lokaas (bijv. ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te detecteren).

- Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

- Het gebruik van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdieren binnen 35 dagen. De productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiters) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoeden van gebrek aan werkzaamheid aan het einde van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.

- Zoek en verwijder de dode knaagdieren gedurende de behandeling, ten minste telkens wanneer de plaatsen met lokaas geïnspecteerd worden.

—

-

—

Professioneel gebruiker en professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid :

-

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele voorbijgangers (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke code van goede praktijk, indien beschikbaar]

- De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.

Uitsluitend voor professioneel gebruiker :

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen (bijv. ten minste twee keer per week) om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.

- De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiters) dient duidelijk te vermelden dat:

- het product niet mag geleverd worden aan het brede publiek (bijv. "uitsluitend voor professionelen");

- het product dient te worden gebruikt in daarvoor geschikte verzegelde lokaasdozen (bijv. "uitsluitend gebruiken in verzegelde lokaasdozen");

- de gebruikers de lokaasdozen passend dienen te voorzien van een etiket met de informatie uit rubriek 5.3 van dit document staat (bijv. "etiketter lokaasdozen conform de productaanbevelingen").

- Was de lokaasdozen niet met water tussen behandelingen door.

Uitsluitend voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

-

- In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiters) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de opleidingsvereisten voldoen (bijv. "enkel voor opgeleide professionele gebruikers").

- Niet gebruiken op plaatsen waar resistentie tegen de werkzame stof kan verwacht worden.

- Gebruik, met het oog op resistentie management, geen verschillende bloedverdünnende middelen met vergelijkbare of zwakkere werking door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdünnend rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdünnend middel.

- De lokaasdozen en het gereedschap gebruikt in de bedekte en beschermde lokaasdozen niet met water reinigen tussen de toepassingen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen met enige vertraging symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvles. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

- Tegengif: vitamine K1, uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

- In geval van:

Blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.

Blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden ten minste tien minuten open houden.

Blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloos persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na mogelijk doorslikken, zoek onmiddellijk medische hulp en laat de verpakking of het etiket zien. Neem contact op met een veearts indien een dier dit product doorslikt.

- Lokaasdozen moet voorzien zijn van de volgende informatie: “ niet verplaatsen of openen”; “ bevat een rodenticide”; "Storm Ultra BE2018-0034"; "Flocoumafen 0.0025%" en “bel in geval van een incident een antigifcentrum 070 245 245 ”.

- Gevaarlijk voor wilde dieren.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten [De verpakking en (ongegeten) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

- Het dragen van handschoenen is aanbevolen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. In gesloten verpakking en verwijderd van direct zonlicht bewaren.

- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.

- Houdbaarheid: 2 jaar.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Vanwege hun vertraagd werkingsmechanisme zijn bloedverdunnende rodenticiden pas werkzaam vanaf 4 tot 10 dagen na consumptie van het lokaas. Knaagdieren kunnen dragers zijn van ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang om ze te verwijderen. Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.