

# Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber

**Produktnavn:** calgodip D 3000

**Produkttype(r):** PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

**Godkendelsesnummer:** EU-0018724-0000

**Referencenummer på emne i R4BP 3:** EU-0018724-0011

## Indholdsfortegnelse

Administrative oplysninger	1
1.1. Produktets handelsnavn	1
1.2. Godkendelsesindehaver	1
1.3. Producent(er) af de biocidholdige produkter	1
1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)	2
2. Produktets sammensætning og formulering	3
2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af det biocidholdige produkt	3
2.2. Formuleringstype	3
3. Faresætninger og sikkerhedssætninger	3
4. Godkendt(e) anvendelse(r)	4
5. Generelle anvisninger til brug	16
5.1. Brugsanvisning	16
5.2. Risiko reducerende foranstaltninger	16
5.3. Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter	16
5.4. sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage	18
5.5. opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.	18
6. Andre oplysninger	18

## Administrative oplysninger

### 1.1. Produktets handelsnavn

calgodip D 3000
Jod-Dip S 30
Bestfarm Dip Premium
Jod 30 Universal (Iwetec)
Jod-Dipp 30 (Technolit)
Dip es SF 3000
Lerapur Jod SP 30

### 1.2. Godkendelsesindehaver

<b>Godkendelsesindehaverens navn og adresse</b>	Navn	CVAS Development GmbH
	Adresse	Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Tyskland
<b>Godkendelsesnummer</b>	EU-0018724-0000 1-9	
<b>Referencenummer på emne i R4BP 3</b>	EU-0018724-0011	
<b>Godkendelsesdato</b>	18/12/2018	
<b>Godkendelsens udløbsdato</b>	30/11/2028	

### 1.3. Producent(er) af de biocidholdige produkter

<b>Producentens navn</b>	Calvatis GmbH
<b>Adressen på fabrikanten</b>	Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Tyskland
<b>Placering af produktionsanlæg</b>	Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Tyskland

#### 1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

<b>Aktivstof</b>	1319 - Jod
<b>Producentens navn</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Adressen på fabrikanten</b>	Amunategui 178 not applicable Santiago Chile
<b>Placering af produktionsanlæg</b>	S.C.M. Cosayach Cala Cala not applicable Pozo Almonte Chile

<b>Aktivstof</b>	1319 - Jod
<b>Producentens navn</b>	ACF Minera S.A.
<b>Adressen på fabrikanten</b>	San Martin No 499 not applicable Iquique Chile
<b>Placering af produktionsanlæg</b>	Lagunas mine not applicable Pozo Almonte Chile

<b>Aktivstof</b>	1319 - Jod
<b>Producentens navn</b>	SQM S.A.
<b>Adressen på fabrikanten</b>	Los Militares 4290, Piso 4 not applicable Las Condes Chile
<b>Placering af produktionsanlæg</b>	Nueva Victoria plant not applicable Pedro de Valdivia plant Chile

<b>Aktivstof</b>	1319 - Jod
<b>Producentens navn</b>	Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd
<b>Adressen på fabrikanten</b>	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japan
<b>Placering af produktionsanlæg</b>	2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japan
<b>Aktivstof</b>	1319 - Jod
<b>Producentens navn</b>	Norkem Limited (manufacturer of PVP-iodine)
<b>Adressen på fabrikanten</b>	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannien
<b>Placering af produktionsanlæg</b>	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannien

## 2. Produktets sammensætning og formulering

### 2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af det biocidholdige produkt

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,34
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		0
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,26

### 2.2. Formuleringstype

AL - Opløsning til brug ufortyndet

## 3. Faresætninger og sikkerhedssætninger

### Faresætninger

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

## Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå udledning til miljøet.
Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.
beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

## 4. Godkendt(e) anvendelse(r)

### 4.1 brug beskrivelse

#### Anvendelse 1 - Brug #9.1 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel dypning

<b>Produkttype</b>	PT03 - Veterinærhygiejne
<b>Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse</b>	-
<b>Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)</b>	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: -  videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: -
<b>Anvendelsesområde</b>	indendørs  Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	Manuel dypning med dyppebæger - -
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	Køer: 5 ml pr. behandling - 0% - Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)
<b>Brugerkategori(er)</b>	professionel
<b>Pakningsstørrelser og emballagemateriale</b>	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg tønde (HDPE) : 60 – 200 kg mellestør beholder (HDPE) : 600 - 1000 kg

#### 4.1.1 Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.  
Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.  
Der skal anvendes 5 ml produkt pr. ko.  
Fyld beholderen med RTU-produktet, og skru dyppebægeret på. Undgå spild af overskydende væske.  
Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.  
Efter malkningen klemmes beholderen, og dyppebægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.  
Fyld bægeret på neddypningsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.  
Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.  
Efter desinfektionen tømmes beholderen. Beholderen og dyppebægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

#### 4.1.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.  
Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.  
Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.  
Bær beskyttelsestøj.  
Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

#### 4.1.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.1.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.1.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

## 4.2 brug beskrivelse

### Anvendelse 2 - Brug #9.2 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel skumpåføring

<b>Produkttype</b>	PT03 - Veterinærhygiejne
<b>Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse</b>	-
<b>Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)</b>	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadiet: -  videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadiet: -
<b>Anvendelsesområde</b>	indendørs  Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	Manuel skumpåføring med skumpåføringsbæger - -
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	Køer: 5 ml pr. behandling - -  Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)
<b>Brugerkategori(er)</b>	professionel
<b>Pakningsstørrelser og emballagemateriale</b>	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg tønde (HDPE) : 60 – 200 kg mellemløst beholder (HDPE) : 600 - 1000 kg

### 4.2.1 Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.  
Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.  
Der anvendes 5 ml produkt pr ko.  
Fyld beholderen med RTU-produktet, og skru skumpåføringsbægeret på. Undgå spild af overskydende væske.  
Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.  
Efter malkningen klemmes beholderen, og skumpåføringsbægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.  
Fyld bægeret på skumpåføringsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.



Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen. Efter desinfektionen tømmes beholderen. Beholderen og skumpåføringsbægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

#### 4.2.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.  
Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.  
Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.  
Bær beskyttelsestøj.  
Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

#### 4.2.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.2.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.2.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

### 4.3 brug beskrivelse

#### Anvendelse 3 - Brug #9.3 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med sprayflaske

##### Produkttype

PT03 - Veterinærhygiejne

##### Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

-

##### Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

videnskabeligt navn: Bakterier  
Almindeligt navn: Bakterier  
udviklingsstadiet: -

videnskabeligt navn: Gær  
Almindeligt navn: Gær  
udviklingsstadiet: -

<b>Anvendelsesområde</b>	indendørs  Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	Manuel sprøjtning med en sprayflaske - -
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	Køer: 5 ml pr. behandling - -  Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)
<b>Brugerkategori(er)</b>	professionel
<b>Pakningsstørrelser og emballagemateriale</b>	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg tønde (HDPE) : 60 – 200 kg mellemløst beholdere (HDPE) : 600 - 1000 kg

#### 4.3.1 Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.  
 Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.  
 Der anvendes 5 ml produkt pr ko.  
 Fyld beholderen med RTU-produktet, og skru den øverste del af sprøjteflasken på. Undgå spild af overskydende væske.  
 Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.  
 Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på patterne med sprayflasken. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pattekanalen er dækket med desinfektionsmiddel.  
 Fyld sprayflasken med frisk desinfektionsmiddel efter behov.  
 Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.  
 Efter desinfektionen tømmes beholderen. Beholderen og sprayflasken rengøres ved at skylle dem med vand.

#### 4.3.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug og følg alle anførte instruktioner.

Ved påføring med spray:

Der skal anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Der skal anvendes beskyttestøj. Materialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Der skal anvendes kemikalieresistente støvler.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

#### 4.3.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.3.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.3.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.4 brug beskrivelse

##### Anvendelse 4 - Brug #9.4 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med elektronisk sprayflaske

###### Produkttype

PT03 - Veterinærhygiejne

###### Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

-

###### Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

videnskabeligt navn: Bakterier  
Almindeligt navn: Bakterier  
udviklingsstadie: -

videnskabeligt navn: Gær  
Almindeligt navn: Gær  
udviklingsstadie: -

<b>Anvendelsesområde</b>	indendørs  Desinfektion af pletter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	Manuel sprøjtning med en elektronisk sprayflaske - -
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	Køer: 5 ml pr. behandling - -  Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)
<b>Brugerkategori(er)</b>	professionel
<b>Pakningsstørrelser og emballagemateriale</b>	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg tønde (HDPE) : 60 – 200 kg mellemstor beholder (HDPE) : 600 - 1000 kg

#### 4.4.1 Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.  
 Åbn en beholder med RTU-produktet, hvor der tages udgangspunkt i, at der anvendes 5 ml pr. ko, og læg en sugeslange fra den elektriske sprayflaske deri. Undgå spild af overskydende væske.  
 Rengør pletterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.  
 Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på pletterne med den elektroniske sprayflaske. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pattekanalen er dækket med desinfektionsmiddel.  
 Udskift den tomme beholder med en ny beholder med RTU-produktet efter behov.  
 Lad produktet sidde på pletterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.  
 Efter desinfektion lægges sugeslangesystemet i en spand vand, og skyl sprayflasken ved at pumpe vand igennem den.

#### 4.4.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug og følg alle anførte instruktioner.

Ved påføring med spray:

Der skal anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Der skal anvendes beskyttestøj. Materialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Der skal anvendes kemikalieresistente støvler.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller.

Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

--

**4.4.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet**

Se den generelle brugsanvisning.
----------------------------------

**4.4.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Se den generelle brugsanvisning.
----------------------------------

**4.4.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring**

Se den generelle brugsanvisning.
----------------------------------

**4.5 brug beskrivelse**

**Anvendelse 5 - Brug #9.5 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk dypning**

<b>Produkttype</b>	PT03 - Veterinærhygiejne
<b>Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse</b>	-
<b>Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)</b>	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: -  videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: -
<b>Anvendelsesområde</b>	indendørs  Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	Automatisk dypning - -
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	Køer: 5 ml pr. behandling - - Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

**Brugerkategori(er)**

professionel

**Pakningsstørrelser og emballagemateriale**

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg  
tønde (HDPE) : 60 – 200 kg  
mellemstor beholder (HDPE) : 600 - 1000 kg

**4.5.1 Brugsanvisning for brugere**

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en slange i fra det automatiske neddykningssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuumpet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af dypningen, når pattekoppen fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske dypningssystem grundigt med vand og blæses igennem med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og blæses igennem med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

**4.5.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger**

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskytteshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

**4.5.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet**

Se den generelle brugsanvisning.

**4.5.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.5.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.6 brug beskrivelse

##### Anvendelse 6 - Brug #9.6 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk skumpåføring

<b>Produkttype</b>	PT03 - Veterinærhygiejne
<b>Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse</b>	-
<b>Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)</b>	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: -  videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: -
<b>Anvendelsesområde</b>	indendørs  Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	Automatisk skumpåføring - -
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	Køer: 5 ml pr. behandling - -  Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)
<b>Brugerkategori(er)</b>	professionel
<b>Pakningsstørrelser og emballagemateriale</b>	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg tønde (HDPE) : 60 – 200 kg mellemløst beholder (HDPE) : 600 - 1000 kg

#### 4.6.1 Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.  
Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en sugeslange i fra det automatiske skumpåføringssystem. Undgå spild af overskydende væske.  
Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af skummet, når skumkoppen fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske skumpåføringssystem grundigt med vand og gennemblæses med trykluft.  
I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og gennemblæses igen med trykluft.  
Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.  
Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.  
Hele processen er automatisk.

#### 4.6.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.  
Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.  
Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.  
Bær beskyttelsestøj.  
Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

#### 4.6.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.6.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.6.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

#### 4.7 brug beskrivelse

**Anvendelse 7 - Brug #9.7 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk sprøjtning af robot**



<b>Produkttype</b>	PT03 - Veterinærhygiejne
<b>Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse</b>	-
<b>Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)</b>	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: -  videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: -
<b>Anvendelsesområde</b>	indendørs  Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	Automatisk sprøjtning af robot - -
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	Køer: 5 ml pr. behandling - -  Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)
<b>Brugerkategori(er)</b>	professionel
<b>Pakningsstørrelser og emballagemateriale</b>	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg tønde (HDPE) : 60 – 200 kg mellemstor beholder (HDPE) : 600 - 1000 kg

#### 4.7.1 Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.  
 Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en sugeslange i fra robotmalkemaskinen. Undgå spild af overskydende væske.  
 Patterne rengøres af robotten med automatiske børster.  
 Efter robotmalkningen sprøjtes desinfektionsmidlet automatisk på patterne fra en pattekop.  
 Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.  
 Sprøjtningen skylles automatisk.

#### 4.7.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.  
 Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.  
Bær beskyttelsestøj.  
Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.  
Vask huden grundigt efter brug.  
Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen

#### **4.7.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet**

Se den generelle brugsanvisning.

#### **4.7.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Se den generelle brugsanvisning.

#### **4.7.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring**

Se den generelle brugsanvisning.

## **5. Generelle anvisninger til brug**

### **5.1. Brugsanvisning**

Se den brugsspecifikke brugsanvisning

### **5.2. Risiko reducerende foranstaltninger**

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

### **5.3. Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Anført i sikkerhedsdatabladet

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding: Søg frisk luft. Søg lægehjælp i tilfælde af symptomer.

Hudkontakt: Skyl med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Skyl med åbnet øje under rindende vand i adskillige minutter. Søg derefter læge.

Indtagelse: Skyl munden, og drik derefter rigeligt vand. Søg omgående lægehjælp.

Stabilitet og reaktivitet

Risiko for farlige reaktioner: Reaktion med oxidationsmidler og reduktionsmidler.

Forhold, der skal undgås: Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.

Anført i sikkerhedsdatabladet

Tag forurenede tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag forurenede tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand, kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenede hud med rigeligt vand og sæbe. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes.

Kemisk stabilitet: Produktet er kemisk stabilt under normale forhold (omgivelsestemperatur).

Risiko for farlige reaktioner: Reagerer med oxiderende og reducerende produkter.

Forhold, der skal undgås: Ikke fastslået.

Materialer, der skal undgås: Ikke fastslået.

Farlige nedbrydningsprodukter: lod (ved opvarmning)

Forholdsregler i forhold til udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Bær beskyttelsespåklædning.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder på afstand – rygning forbudt.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: : Må ikke udledes til kloak, overflade- eller grundvand.

Metoder og materiale til inddæmning og rengøring: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindende midler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med lovgivningen.

#### 5.4. sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Anført i sikkerhedsdatabladet

Metoder til affaldsbehandling:

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand og evt. rengøringsmiddel.

#### 5.5. opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Holdbarhed: 24 måneder

Produkter skal beskyttes mod frost, opbevares ved temperaturer på højst 30 °C og væk fra direkte sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

#### 6. Andre oplysninger